

彰化縣彰化市主要死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	1,370	579.10	433.31*-	0.92*	100.0		所有死亡原因	818	694.80	561.26*-	0.90*	100.0		所有死亡原因	552	464.48	318.06	0.96	100.0
	十大主要死因	1,072	453.14	337.69	0.95	78.2		十大主要死因	646	548.70	441.74*-	0.91*	79.0		十大主要死因	428	360.14	245.14	0.99	77.5
1	惡性腫瘤	381	161.05	123.14*-	0.89*	27.8	1	惡性腫瘤	239	203.00	164.39*-	0.85*	29.2	1	惡性腫瘤	142	119.49	85.94	0.96	25.7
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	201	84.96	60.75	1.12	14.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	117	99.38	78.40	1.12	14.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	84	70.68	44.84	1.15	15.2
3	肺炎	95	40.16	27.24	1.12	6.9	3	肺炎	59	50.11	37.29	1.14	7.2	3	糖尿病	47	39.55	25.89	1.10	8.5
4	腦血管疾病	92	38.89	28.24	0.89	6.7	4	腦血管疾病	52	44.17	34.15	0.93	6.4	4	腦血管疾病	40	33.66	22.93	0.86	7.2
5	糖尿病	86	36.35	26.33	1.04	6.3	5	慢性下呼吸道疾病	42	35.67	27.65	0.84	5.1	5	肺炎	36	30.29	18.92	1.04	6.5
6	慢性下呼吸道疾病	55	23.25	16.43	0.89	4.0	6	糖尿病	39	33.13	26.63	0.99	4.8	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	23	19.35	13.27	1.06	4.2
7	事故傷害	54	22.83	21.03	0.74*	3.9	7	事故傷害	38	32.28	31.46	0.72*	4.6	7	事故傷害	16	13.46	10.82	0.83	2.9
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	40	16.91	12.20	0.98	2.9	8	蓄意自我傷害(自殺)	22	18.69	15.98	1.08	2.7	8	高血壓性疾病	15	12.62	8.53	0.71	2.7
9	高血壓性疾病	35	14.79	10.74	0.77	2.6	9	高血壓性疾病	20	16.99	13.28	0.83	2.4	9	慢性下呼吸道疾病	13	10.94	6.79	0.91	2.4
10	蓄意自我傷害(自殺)	33	13.95	11.59	1.11	2.4	10	慢性肝病及肝硬化	18	15.29	12.51*-	0.55*	2.2	10	慢性肝病及肝硬化	12	10.10	7.22	0.93	2.2
	其他非十大死因	298	125.96	95.61*-	0.84*	21.8		其他非十大死因	172	146.09	119.52	0.89	21.0		其他非十大死因	124	104.34	72.92*-	0.87	22.5
11	慢性肝病及肝硬化	30	12.68	9.81*-	0.64*	2.2	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	17	14.44	10.92	0.93	2.1	11	蓄意自我傷害(自殺)	11	9.26	7.43	1.25	2.0
12	敗血症	25	10.57	7.66	0.94	1.8	12	敗血症	15	12.74	10.19	0.98	1.8	12	敗血症	10	8.41	5.47	0.87	1.8
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	5.50	4.14	1.22	0.9	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	8	6.80	5.47	1.44	1.0	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	7	5.89	4.45	1.39	1.3
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	11	4.65	3.72	1.12	0.8	14	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	5	4.25	3.16	1.34	0.6	14	帕金森病	7	5.89	3.66	2.47	1.3
15	帕金森病	10	4.23	2.86	2.03	0.7	15	主動脈瘤及剝離	5	4.25	3.15	1.09	0.6	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	4.21	3.02	0.99	0.9

附 註：1. 彰化縣彰化市年中人口數 計236,574人 男性117,732人 女性118,843人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣鹿港鎮主要死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	527	617.10	459.95	0.96	100.0		所有死亡原因	316	722.12	605.20	0.97	100.0		所有死亡原因	211	506.72	330.41	0.95	100.0
	十大主要死因	424	496.49	363.06	1.03	80.5		十大主要死因	249	569.01	474.08	0.99	78.8		十大主要死因	178	427.47	268.45	1.09	84.4
1	惡性腫瘤	161	188.52	142.66	1.02	30.6	1	惡性腫瘤	100	228.52	189.84	0.97	31.6	1	惡性腫瘤	61	146.49	103.27	1.12	28.9
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	50	58.55	41.85*-	0.75*	9.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	26	59.41	47.22*-	0.70	8.2	2	衰老/老邁	29	69.64	35.09*+	5.06*	13.7
3	衰老/老邁	48	56.21	35.73*+	5.03*	9.1	3	事故傷害	22	50.27	48.55	1.12	7.0	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	24	57.64	35.17	0.82	11.4
4	腦血管疾病	43	50.35	35.49	1.12	8.2	4	腦血管疾病	21	47.99	39.93	1.04	6.6	4	腦血管疾病	22	52.83	31.25	1.20	10.4
5	糖尿病	28	32.79	22.41	0.90	5.3	5	衰老/老邁	19	43.42	36.22*+	4.97*	6.0	5	糖尿病	12	28.82	16.11	0.72	5.7
6	肺炎	28	32.79	21.66	0.88	5.3	6	肺炎	19	43.42	36.20	1.07	6.0	6	肺炎	9	21.61	11.05*-	0.64	4.3
7	事故傷害	27	31.62	30.52	1.01	5.1	7	糖尿病	16	36.56	29.00	1.12	5.1	7	敗血症	6	14.41	9.67	1.32	2.8
8	慢性肝病及肝硬化	16	18.74	14.33	0.94	3.0	8	慢性肝病及肝硬化	11	25.14	20.73	0.91	3.5	8	事故傷害	5	12.01	11.73	0.72	2.4
9	敗血症	12	14.05	10.18	1.22	2.3	9	蓄意自我傷害(自殺)	8	18.28	14.36	1.06	2.5	9	慢性肝病及肝硬化	5	12.01	8.46	1.03	2.4
10	慢性下呼吸道疾病	11	12.88	8.23*-	0.47*	2.1	10	慢性下呼吸道疾病	7	16.00	12.03*-	0.40*	2.2	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	12.01	6.65	0.58	2.4
	其他非十大死因	103	120.61	96.89*-	0.75*	19.5		其他非十大死因	67	153.11	131.12	0.91	21.2		其他非十大死因	33	79.25	61.96*-	0.55*	15.6
11	蓄意自我傷害(自殺)	9	10.54	8.39	0.84	1.7	11	敗血症	6	13.71	11.05	1.13	1.9	11	慢性下呼吸道疾病	4	9.61	4.72	0.68	1.9
12	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	9.37	6.15*-	0.52	1.5	12	結核病	5	11.43	8.75	2.31	1.6	12	源於周產期的特定病況	3	7.20	14.96	4.18	1.4
13	高血壓性疾病	7	8.20	5.49*-	0.41*	1.3	13	高血壓性疾病	5	11.43	8.45	0.59	1.6	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	4.80	3.34	1.07	0.9
14	源於周產期的特定病況	5	5.85	12.20	3.06	0.9	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	6.86	5.78	1.43	0.9	14	主動脈瘤及剝離	2	4.80	3.15	2.29	0.9
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	5.85	4.44	1.26	0.9	15	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	6.86	4.96*-	0.45	0.9	15	疝氣及腸阻塞	2	4.80	2.48	2.48	0.9

附 註：1. 彰化縣鹿港鎮年中人口數 計85,400人 男性43,760人 女性41,640人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣和美鎮主要死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	505	561.44	458.05	0.96	100.0		所有死亡原因	293	635.99	579.69	0.94	100.0		所有死亡原因	212	483.16	347.76	1.01	100.0
	十大主要死因	408	453.60	364.56	1.04	80.8		十大主要死因	242	525.29	468.79	0.98	82.6		十大主要死因	171	389.72	270.90	1.11	80.7
1	惡性腫瘤	143	158.98	128.66	0.93	28.3	1	惡性腫瘤	98	212.72	188.16	0.98	33.4	1	惡性腫瘤	45	102.56	79.53	0.85	21.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	51	56.70	44.99	0.82	10.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	27	58.61	51.16	0.76	9.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	24	54.70	38.13	0.89	11.3
3	腦血管疾病	42	46.69	38.16	1.16	8.3	3	腦血管疾病	24	52.09	48.39	1.26	8.2	3	肺炎	23	52.42	33.18*+	1.80*	10.8
4	肺炎	36	40.02	30.69	1.25	7.1	4	事故傷害	24	52.09	46.43	1.19	8.2	4	腦血管疾病	18	41.02	28.19	1.06	8.5
5	糖尿病	32	35.58	29.19	1.09	6.3	5	慢性下呼吸道疾病	18	39.07	35.37	1.15	6.1	5	糖尿病	16	36.46	25.29	1.02	7.5
6	事故傷害	29	32.24	28.14	1.07	5.7	6	糖尿病	16	34.73	31.00	1.18	5.5	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	14	31.91	20.11	1.77	6.6
7	慢性下呼吸道疾病	26	28.91	21.41	1.23	5.1	7	肺炎	13	28.22	25.79	0.81	4.4	7	衰老/老邁	11	25.07	15.53	2.19*	5.2
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	19	21.12	16.48	1.35	3.8	8	蓄意自我傷害(自殺)	9	19.54	17.53	1.14	3.1	8	慢性下呼吸道疾病	8	18.23	10.74	1.53	3.8
9	衰老/老邁	16	17.79	13.35	1.92*	3.2	9	慢性肝病及肝硬化	7	15.19	13.59	0.56	2.4	9	高血壓性疾病	7	15.95	9.51	0.92	3.3
10	蓄意自我傷害(自殺)	14	15.56	13.51	1.26	2.8	10	高血壓性疾病	6	13.02	11.35	0.77	2.0	10	蓄意自我傷害(自殺)	5	11.40	10.68	1.57	2.4
	其他非十大死因	97	107.84	93.48*-	0.73*	19.2		其他非十大死因	51	110.70	110.90	0.78	17.4		其他非十大死因	41	93.44	76.86	0.74	19.3
11	高血壓性疾病	13	14.45	10.55	0.84	2.6	11	衰老/老邁	5	10.85	11.96	1.52	1.7	11	事故傷害	5	11.40	10.08	0.73	2.4
12	慢性肝病及肝硬化	9	10.01	8.40*-	0.52*	1.8	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	10.85	10.03	0.81	1.7	12	敗血症	4	9.12	6.10	0.96	1.9
13	敗血症	8	8.89	7.03	0.88	1.6	13	敗血症	4	8.68	8.33	0.81	1.4	13	先天性畸形變形及染色體異常	2	4.56	9.13	5.44	0.9
14	主動脈瘤及剝離	3	3.34	2.61	1.23	0.6	14	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	2	4.34	4.44	9.02*	0.7	14	慢性肝病及肝硬化	2	4.56	3.20*-	0.43	0.9
15	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	1	2.28	1.81	6.66	0.2	15	主動脈瘤及剝離	2	4.34	3.53	1.24	0.7	15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	4.56	2.63	2.18	0.9

附 註：1. 彰化縣和美鎮年中人口數 計89,948人 男性46,070人 女性43,878人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣北斗鎮主要死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	215	642.79	453.19	0.93	100.0		所有死亡原因	134	790.37	636.39	0.98	100.0		所有死亡原因	81	491.12	273.71*-	0.86	100.0
	十大主要死因	164	490.31	333.93	0.94	76.3		十大主要死因	104	613.42	467.80	0.96	77.6		十大主要死因	62	375.92	209.82	0.87	76.5
1	惡性腫瘤	66	197.32	133.86	0.99	30.7	1	惡性腫瘤	45	265.42	199.24	1.04	33.6	1	惡性腫瘤	21	127.33	74.90	0.91	25.9
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	22	65.77	41.57	0.78	10.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	76.68	55.56	0.83	9.7	2	糖尿病	9	54.57	29.93	1.27	11.1
3	糖尿病	19	56.80	36.87	1.44	8.8	3	事故傷害	11	64.88	62.26	1.40	8.2	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	9	54.57	28.77	0.73	11.1
4	事故傷害	13	38.87	36.66	1.20	6.0	4	糖尿病	10	58.98	42.99	1.65	7.5	4	腦血管疾病	5	30.32	15.81	0.64	6.2
5	腦血管疾病	10	29.90	18.17*-	0.61	4.7	5	肺炎	6	35.39	25.53	0.80	4.5	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	24.25	13.57	1.09	4.9
6	肺炎	9	26.91	17.35	0.67	4.2	6	腦血管疾病	5	29.49	19.63*-	0.59	3.7	6	慢性肝病及肝硬化	3	18.19	9.80	1.45	3.7
7	慢性肝病及肝硬化	7	20.93	14.08	0.99	3.3	7	慢性肝病及肝硬化	4	23.59	18.13	0.81	3.0	7	高血壓性疾病	3	18.19	9.04	0.84	3.7
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	20.93	13.92	1.08	3.3	8	高血壓性疾病	4	23.59	16.93	1.12	3.0	8	肺炎	3	18.19	8.88	0.50	3.7
9	高血壓性疾病	7	20.93	12.60	0.98	3.3	9	蓄意自我傷害(自殺)	3	17.69	13.80	0.99	2.2	9	衰老/老邁	3	18.19	8.45	1.24	3.7
10	蓄意自我傷害(自殺)	4	11.96	8.84	0.92	1.9	10	慢性下呼吸道疾病	3	17.69	13.71*-	0.40	2.2	10	事故傷害	2	12.13	10.67	0.68	2.5
	其他非十大死因	51	152.48	119.26	0.88	23.7		其他非十大死因	30	176.95	168.59	1.05	22.4		其他非十大死因	19	115.20	63.89	0.81	23.5
11	慢性下呼吸道疾病	4	11.96	8.56*-	0.40	1.9	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	17.69	13.23	1.06	2.2	11	皮膚及皮下組織疾病	1	6.06	5.26	2.13	1.2
12	衰老/老邁	4	11.96	6.92	0.99	1.9	12	先天性畸形變形及染色體異常	2	11.80	28.24	9.21*	1.5	12	蓄意自我傷害(自殺)	1	6.06	3.62	0.78	1.2
13	先天性畸形變形及染色體異常	2	5.98	14.34	5.84	0.9	13	源於周產期的特定病況	1	5.90	14.12	3.22	0.7	13	慢性下呼吸道疾病	1	6.06	3.62	0.40	1.2
14	貧血	2	5.98	4.40	4.47	0.9	14	貧血	1	5.90	5.35	3.97	0.7	14	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	6.06	3.14	9.76	1.2
15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	5.98	3.68	2.08	0.9	15	敗血症	1	5.90	5.35	0.45	0.7	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	6.06	3.04	1.19	1.2

附 註：1. 彰化縣北斗鎮年中人口數 計33,448人 男性16,954人 女性16,493人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣員林市主要死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	760	606.50	463.54	0.99	100.0		所有死亡原因	428	679.82	574.63	0.93	100.0		所有死亡原因	332	532.46	361.37	1.08	100.0
	十大主要死因	591	471.63	355.81	0.99	77.8		十大主要死因	337	535.28	445.71	0.93	78.7		十大主要死因	259	415.38	281.56	1.13	78.0
1	惡性腫瘤	230	183.54	141.53	1.01	30.3	1	惡性腫瘤	143	227.14	185.89	0.97	33.4	1	惡性腫瘤	87	139.53	101.57	1.10	26.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	68	54.27	40.92*-	0.74*	8.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	36	57.18	48.19*-	0.69*	8.4	2	糖尿病	34	54.53	35.44	1.49*	10.2
3	糖尿病	54	43.09	31.31	1.25	7.1	3	慢性下呼吸道疾病	33	52.42	44.77	1.38	7.7	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	32	51.32	33.93	0.82	9.6
4	腦血管疾病	49	39.10	28.54	0.92	6.4	4	慢性肝病及肝硬化	28	44.47	37.14*+	1.61*	6.5	4	腦血管疾病	27	43.30	27.63	1.09	8.1
5	慢性下呼吸道疾病	38	30.32	22.44	1.21	5.0	5	腦血管疾病	22	34.94	29.12	0.77	5.1	5	高血壓性疾病	22	35.28	23.08*+	1.96*	6.6
6	高血壓性疾病	37	29.53	21.34*+	1.61*	4.9	6	糖尿病	20	31.77	25.87	0.98	4.7	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	17	27.26	17.58	1.46	5.1
7	慢性肝病及肝硬化	33	26.33	20.63	1.32	4.3	7	事故傷害	18	28.59	24.54*-	0.65	4.2	7	肺炎	16	25.66	15.96	0.87	4.8
8	肺炎	29	23.14	16.69*-	0.68*	3.8	8	高血壓性疾病	15	23.83	19.62	1.28	3.5	8	事故傷害	10	16.04	11.30	0.99	3.0
9	事故傷害	28	22.34	17.59*-	0.73	3.7	9	肺炎	13	20.65	17.89*-	0.54*	3.0	9	敗血症	9	14.43	9.42	1.47	2.7
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	25	19.95	14.83	1.19	3.3	10	蓄意自我傷害(自殺)	9	14.30	12.69	0.83	2.1	10	慢性肝病及肝硬化	5	8.02	5.66	0.73	1.5
	其他非十大死因	169	134.87	107.73	0.97	22.2		其他非十大死因	91	144.54	128.93	0.95	21.3		其他非十大死因	73	117.08	79.81	0.95	22.0
11	敗血症	14	11.17	8.23	1.04	1.8	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	12.71	10.54	0.86	1.9	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	8.02	5.34	1.87	1.5
12	蓄意自我傷害(自殺)	13	10.37	9.21	0.83	1.7	12	敗血症	5	7.94	6.45	0.68	1.2	12	慢性下呼吸道疾病	5	8.02	4.64	0.65	1.5
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	8	6.38	4.77	1.41	1.1	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	4.77	4.45	1.27	0.7	13	蓄意自我傷害(自殺)	4	6.42	5.62	0.87	1.2
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	7	5.59	4.47	1.38	0.9	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	4.77	4.06	1.01	0.7	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	6.42	4.09	1.50	1.2
15	疝氣及腸阻塞	5	3.99	2.89	2.34	0.7	15	疝氣及腸阻塞	3	4.77	4.04	2.79	0.7	15	膽結石及其他膽囊疾患	3	4.81	3.10	4.20	0.9

附 註：1.彰化縣員林市中人口數 計125,310人 男性62,958人 女性62,352人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣溪湖鎮主要死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	380	678.35	471.96	0.99	100.0		所有死亡原因	236	825.29	658.96	1.09	100.0		所有死亡原因	144	525.13	311.34	0.88	100.0
	十大主要死因	310	553.39	386.83	1.05	81.6		十大主要死因	195	681.91	544.67	1.14	82.6		十大主要死因	115	419.37	251.28	0.94	79.9
1	惡性腫瘤	124	221.36	162.15	1.16	32.6	1	惡性腫瘤	80	279.76	224.19	1.17	33.9	1	惡性腫瘤	44	160.46	106.91	1.16	30.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	56	99.97	67.90	1.19	14.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	37	129.39	102.22	1.48*	15.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	69.29	36.26	0.86	13.2
3	腦血管疾病	23	41.06	27.32	0.85	6.1	3	腦血管疾病	14	48.96	39.37	1.04	5.9	3	肺炎	9	32.82	16.97	0.83	6.3
4	肺炎	20	35.70	22.88	0.86	5.3	4	慢性下呼吸道疾病	13	45.46	34.28	1.09	5.5	4	腦血管疾病	9	32.82	15.74	0.66	6.3
5	糖尿病	19	33.92	21.77	0.88	5.0	5	慢性肝病及肝硬化	12	41.96	33.21	1.52	5.1	5	事故傷害	8	29.17	21.63	1.68	5.6
6	事故傷害	17	30.35	25.18	0.96	4.5	6	肺炎	11	38.47	31.92	0.91	4.7	6	糖尿病	8	29.17	14.53	0.66	5.6
7	慢性肝病及肝硬化	17	30.35	21.99	1.50	4.5	7	糖尿病	11	38.47	30.47	1.15	4.7	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	25.53	17.06	1.09	4.9
8	慢性下呼吸道疾病	17	30.35	17.38	1.01	4.5	8	事故傷害	9	31.47	29.01	0.70	3.8	8	慢性肝病及肝硬化	5	18.23	10.98	1.49	3.5
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	19.64	14.10	1.02	2.9	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	13.99	10.46	0.90	1.7	9	慢性下呼吸道疾病	4	14.59	7.44	0.89	2.8
10	高血壓性疾病	6	10.71	6.16*-	0.49	1.6	10	高血壓性疾病	4	13.99	9.53	0.70	1.7	10	高血壓性疾病	2	7.29	3.76*-	0.31	1.4
	其他非十大死因	70	124.96	85.13*-	0.80	18.4		其他非十大死因	41	143.38	114.29	0.88	17.4		其他非十大死因	29	105.75	60.06*-	0.71	20.1
11	結核病	4	7.14	4.28	1.90	1.1	11	結核病	3	10.49	7.47	2.04	1.3	11	敗血症	2	7.29	3.08	0.58	1.4
12	敗血症	4	7.14	4.20	0.57	1.1	12	主動脈瘤及剝離	2	6.99	6.00	1.80	0.8	12	衰老/老邁	2	7.29	2.78*-	0.44	1.4
13	衰老/老邁	3	5.36	2.87*-	0.42	0.8	13	蓄意自我傷害(自殺)	2	6.99	5.73*-	0.41	0.8	13	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	3.65	3.42	6.17	0.7
14	主動脈瘤及剝離	2	3.57	3.00	1.13	0.5	14	敗血症	2	6.99	5.55	0.56	0.8	14	胃及十二指腸潰瘍	1	3.65	3.42	1.49	0.7
15	蓄意自我傷害(自殺)	2	3.57	2.91*-	0.29	0.5	15	加害(他殺)	1	3.50	3.10	11.96	0.4	15	病毒性肝炎	1	3.65	2.93	12.37	0.7

附 註：1. 彰化縣溪湖鎮年中人口數 計56,018人 男性28,596人 女性27,422人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣田中鎮主要死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	432	985.00	529.20*+	1.13*	100.0		所有死亡原因	272	1,193.45	654.48	1.07	100.0		所有死亡原因	160	759.45	394.79	1.17	100.0
	十大主要死因	332	756.99	406.57	1.13*	76.9		十大主要死因	207	908.25	499.05	1.05	76.1		十大主要死因	127	602.81	316.93*+	1.23*	79.4
1	惡性腫瘤	97	221.17	135.93	0.94	22.5	1	惡性腫瘤	64	280.81	171.47	0.86	23.5	1	惡性腫瘤	33	156.64	97.99	1.01	20.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	45	102.60	52.31	0.93	10.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	28	122.86	66.83	0.93	10.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	17	80.69	37.56	0.93	10.6
3	肺炎	41	93.48	38.82*+	1.66*	9.5	3	肺炎	28	122.86	50.23	1.64*	10.3	3	糖尿病	16	75.94	37.61	1.53	10.0
4	腦血管疾病	38	86.64	42.77	1.37	8.8	4	腦血管疾病	24	105.30	51.79	1.46	8.8	4	腦血管疾病	14	66.45	32.73	1.23	8.8
5	糖尿病	27	61.56	33.37	1.22	6.3	5	慢性下呼吸道疾病	19	83.37	34.69	1.14	7.0	5	肺炎	13	61.70	25.83	1.46	8.1
6	慢性下呼吸道疾病	23	52.44	22.88	1.28	5.3	6	糖尿病	11	48.26	29.59	0.98	4.0	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	42.72	22.24	1.66	5.6
7	高血壓性疾病	19	43.32	20.80	1.48	4.4	7	高血壓性疾病	11	48.26	25.17	1.45	4.0	7	高血壓性疾病	8	37.97	16.97	1.50	5.0
8	事故傷害	14	31.92	21.69	0.89	3.2	8	事故傷害	8	35.10	26.21	0.66	2.9	8	慢性肝病及肝硬化	7	33.23	19.62	2.40	4.4
9	慢性肝病及肝硬化	14	31.92	20.16	1.36	3.2	9	蓄意自我傷害(自殺)	7	30.71	22.39	1.56	2.6	9	事故傷害	6	28.48	16.32	1.49	3.8
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	14	31.92	17.84	1.25	3.2	10	慢性肝病及肝硬化	7	30.71	20.69	0.95	2.6	10	慢性下呼吸道疾病	4	18.99	10.04	1.08	2.5
	其他非十大死因	100	228.01	122.63	1.14	23.1		其他非十大死因	65	285.20	155.42	1.15	23.9		其他非十大死因	33	156.64	77.86	0.97	20.6
11	蓄意自我傷害(自殺)	8	18.24	13.34	1.30	1.9	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	21.94	13.53	0.92	1.8	11	衰老/老邁	4	18.99	7.31	1.09	2.5
12	敗血症	7	15.96	7.10	0.96	1.6	12	敗血症	5	21.94	10.11	1.05	1.8	12	帕金森病	2	9.49	5.97	2.76	1.3
13	衰老/老邁	5	11.40	4.22	0.63	1.2	13	胃及十二指腸潰瘍	3	13.16	6.66	2.13	1.1	13	敗血症	2	9.49	3.63	0.70	1.3
14	胃及十二指腸潰瘍	4	9.12	4.34	2.25	0.9	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	8.78	3.78	1.36	0.7	14	蓄意自我傷害(自殺)	1	4.75	3.52	0.58	0.6
15	帕金森病	3	6.84	4.24	2.10	0.7	15	先天性畸形變形及染色體異常	1	4.39	11.36	3.74	0.4	15	病毒性肝炎	1	4.75	2.18	14.21	0.6

附 註：1. 彰化縣田中鎮年中人口數 計43,858人 男性22,791人 女性21,068人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣二林鎮主要死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	469	872.62	488.07	1.01	100.0		所有死亡原因	267	961.92	643.74	1.03	100.0		所有死亡原因	202	777.28	346.58	1.00	100.0
	十大主要死因	387	720.05	396.39	1.08	82.5		十大主要死因	227	817.81	538.30	1.11	85.0		十大主要死因	163	627.21	271.94	1.15	80.7
1	惡性腫瘤	145	269.79	154.26	1.14	30.9	1	惡性腫瘤	88	317.04	208.42	1.08	33.0	1	惡性腫瘤	57	219.33	104.43	1.26	28.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	99	184.20	97.09*+	1.71*	21.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	57	205.35	134.94*+	1.89*	21.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	42	161.61	65.72*+	1.51*	20.8
3	糖尿病	29	53.96	26.26	1.07	6.2	3	腦血管疾病	18	64.85	42.76	1.09	6.7	3	糖尿病	20	76.96	32.28	1.29	9.9
4	腦血管疾病	28	52.10	28.99	0.83	6.0	4	肺炎	17	61.25	37.30	1.13	6.4	4	事故傷害	11	42.33	25.00	2.01*	5.4
5	肺炎	24	44.65	22.41	0.82	5.1	5	慢性下呼吸道疾病	13	46.84	29.13	0.86	4.9	5	腦血管疾病	10	38.48	15.50	0.59	5.0
6	事故傷害	21	39.07	26.95	1.09	4.5	6	事故傷害	10	36.03	27.79	0.73	3.7	6	肺炎	7	26.94	10.51	0.51	3.5
7	慢性下呼吸道疾病	17	31.63	15.20	0.79	3.6	7	糖尿病	9	32.42	19.74	0.77	3.4	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	23.09	6.97	0.73	3.0
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	20.47	8.83	0.81	2.3	8	慢性肝病及肝硬化	6	21.62	17.30	0.69	2.2	8	慢性下呼吸道疾病	4	15.39	4.56	0.70	2.0
9	慢性肝病及肝硬化	8	14.88	11.71	0.63	1.7	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	18.01	11.37	0.91	1.9	9	血管性及未明示之癱瘓症	3	11.54	3.53	3.48	1.5
10	高血壓性疾病	5	9.30	4.69*-	0.33*	1.1	10	高血壓性疾病	4	14.41	9.54	0.57	1.5	10	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	11.54	3.44	1.67	1.5
	其他非十大死因	82	152.57	91.68	0.78*	17.5		其他非十大死因	40	144.11	105.44	0.73*	15.0		其他非十大死因	39	150.07	74.63	0.65*	19.3
11	敗血症	4	7.44	4.34	0.46	0.9	11	敗血症	3	10.81	7.38	0.69	1.1	11	慢性肝病及肝硬化	2	7.70	5.49	0.49	1.0
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	5.58	3.57	0.93	0.6	12	蓄意自我傷害(自殺)	2	7.21	7.48	0.38	0.7	12	皮膚及皮下組織疾病	2	7.70	3.75	1.94	1.0
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	5.58	2.26	0.97	0.6	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	7.21	4.46	1.20	0.7	13	結核病	2	7.70	2.41	2.76	1.0
14	血管性及未明示之癱瘓症	3	5.58	2.22	2.08	0.6	14	病毒性肝炎	1	3.60	2.64	1.36	0.4	14	源於周產期的特定病況	1	3.85	9.30	2.59	0.5
15	蓄意自我傷害(自殺)	2	3.72	4.00*-	0.27*	0.4	15	帕金森病	1	3.60	2.42	1.55	0.4	15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	3.85	3.28	1.08	0.5

附 註：1. 彰化縣二林鎮年中人口數 計53,746人 男性27,757人 女性25,988人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣線西鄉主要死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	128	749.94	516.77	1.10	100.0		所有死亡原因	70	796.90	600.84	1.01	100.0		所有死亡原因	58	700.14	446.47	1.23	100.0
	十大主要死因	98	574.17	390.94	1.13	76.6		十大主要死因	61	694.44	518.06	1.15	87.1		十大主要死因	40	482.86	304.39	1.17	69.0
1	惡性腫瘤	32	187.49	127.68	0.98	25.0	1	惡性腫瘤	18	204.92	152.20	0.83	25.7	1	惡性腫瘤	14	169.00	111.83	1.26	24.1
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	70.31	48.22	0.85	9.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	8	91.07	65.81	1.01	11.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	4	48.29	35.29	0.64	6.9
3	肺炎	11	64.45	40.18	1.60	8.6	3	肺炎	7	79.69	57.49	1.85	10.0	3	腦血管疾病	4	48.29	30.38	1.03	6.9
4	事故傷害	8	46.87	41.03	1.46	6.3	4	事故傷害	6	68.31	60.45	1.47	8.6	4	肺炎	4	48.29	25.26	1.30	6.9
5	慢性下呼吸道疾病	8	46.87	28.52	1.59	6.3	5	慢性下呼吸道疾病	6	68.31	46.17	1.59	8.6	5	高血壓性疾病	4	48.29	22.16	2.20	6.9
6	腦血管疾病	7	41.01	28.29	0.86	5.5	6	糖尿病	5	56.92	42.83	1.63	7.1	6	慢性肝病及肝硬化	2	24.14	18.81	1.99	3.4
7	糖尿病	7	41.01	26.45	1.06	5.5	7	敗血症	3	34.15	26.46	2.65	4.3	7	慢性下呼吸道疾病	2	24.14	17.34	1.56	3.4
8	敗血症	5	29.29	17.99	2.38	3.9	8	腦血管疾病	3	34.15	24.34	0.70	4.3	8	事故傷害	2	24.14	16.97	1.41	3.4
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	23.44	18.09	1.24	3.1	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	34.15	24.02	2.12	4.3	9	糖尿病	2	24.14	13.59	0.57	3.4
10	蓄意自我傷害(自殺)	4	23.44	14.48	1.83	3.1	10	蓄意自我傷害(自殺)	2	22.77	18.28	1.28	2.9	10	蓄意自我傷害(自殺)	2	24.14	12.74	3.20	3.4
	其他非十大死因	30	175.77	125.83	1.02	23.4		其他非十大死因	9	102.46	82.78*-	0.55	12.9		其他非十大死因	18	217.29	142.08	1.38	31.0
11	高血壓性疾病	4	23.44	13.26	1.11	3.1	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	22.77	16.20	4.44	2.9	11	敗血症	2	24.14	11.08	2.05	3.4
12	慢性肝病及肝硬化	3	17.58	13.41	0.85	2.3	12	主動脈瘤及剝離	1	11.38	10.26	2.82	1.4	12	衰老/老邁	2	24.14	10.04	1.57	3.4
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	11.72	7.99	2.42	1.6	13	慢性肝病及肝硬化	1	11.38	7.81	0.39	1.4	13	源於周產期的特定病況	1	12.07	24.66	6.88	1.7
14	衰老/老邁	2	11.72	6.74	0.96	1.6	14	膽結石及其他膽囊疾患	1	11.38	7.37	7.34	1.4	14	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	12.07	12.93	0.54	1.7
15	源於周產期的特定病況	1	5.86	11.58	2.89	0.8							15	腦膜炎	1	12.07	6.37	81.08*	1.7	

附 註：1. 彰化縣線西鄉年中人口數 計17,068人 男性8,784人 女性8,284人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣伸港鄉主要死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	244	678.27	531.96	1.11	100.0		所有死亡原因	154	833.60	740.04*+	1.22*	100.0		所有死亡原因	90	514.26	327.68	0.98	100.0
	十大主要死因	201	558.74	439.77*+	1.18*	82.4		十大主要死因	136	736.17	651.46*+	1.36*	88.3		十大主要死因	68	388.55	242.79	1.00	75.6
1	惡性腫瘤	70	194.58	156.70	1.11	28.7	1	惡性腫瘤	53	286.89	253.99	1.31	34.4	1	惡性腫瘤	17	97.14	71.82	0.77	18.9
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	28	77.83	59.85	1.06	11.5	2	事故傷害	18	97.43	87.42*+	2.23*	11.7	2	高血壓性疾病	11	62.85	41.86*+	3.16*	12.2
3	事故傷害	21	58.38	46.81	1.91*	8.6	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	17	92.02	79.67	1.18	11.0	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	11	62.85	34.99	0.91	12.2
4	高血壓性疾病	19	52.82	43.39*+	2.84*	7.8	4	腦血管疾病	11	59.54	52.15	1.42	7.1	4	腦血管疾病	8	45.71	26.61	1.06	8.9
5	腦血管疾病	19	52.82	40.79	1.24	7.8	5	高血壓性疾病	8	43.30	41.02	2.52*	5.2	5	糖尿病	6	34.28	18.53	0.86	6.7
6	糖尿病	12	33.36	24.94	0.97	4.9	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	37.89	31.65	2.76*	4.5	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	22.86	11.12	1.13	4.4
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	30.58	22.73	1.82	4.5	7	糖尿病	6	32.48	32.16	1.09	3.9	7	事故傷害	3	17.14	12.96	1.06	3.3
8	肺炎	8	22.24	15.42	0.64	3.3	8	慢性肝病及肝硬化	6	32.48	25.61	1.20	3.9	8	肺炎	3	17.14	10.27	0.51	3.3
9	慢性肝病及肝硬化	7	19.46	15.74	1.01	2.9	9	慢性下呼吸道疾病	5	27.07	24.53	0.77	3.2	9	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	17.14	8.90	3.66	3.3
10	慢性下呼吸道疾病	6	16.68	13.42	0.65	2.5	10	肺炎	5	27.07	23.24	0.77	3.2	10	衰老/老邁	2	11.43	5.73	0.84	2.2
	其他非十大死因	43	119.53	92.18	0.86	17.6		其他非十大死因	18	97.43	88.59*-	0.67	11.7		其他非十大死因	22	125.71	84.89	0.91	24.4
11	蓄意自我傷害(自殺)	4	11.12	9.85	0.91	1.6	11	蓄意自我傷害(自殺)	3	16.24	13.31	0.96	1.9	11	蓄意自我傷害(自殺)	1	5.71	6.04	0.77	1.1
12	衰老/老邁	3	8.34	6.01	0.81	1.2	12	血管性及未明示之癱瘓症	2	10.83	10.86	9.02*	1.3	12	慢性肝病及肝硬化	1	5.71	5.97	0.51	1.1
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	8.34	5.51	2.08	1.2	13	衰老/老邁	1	5.41	6.67	0.76	0.6	13	主動脈瘤及剝離	1	5.71	3.28	2.77	1.1
14	主動脈瘤及剝離	2	5.56	4.04	1.97	0.8	14	結核病	1	5.41	4.22	1.27	0.6	14	貧血	1	5.71	2.86	5.35	1.1
15	敗血症	2	5.56	3.85	0.51	0.8	15	敗血症	1	5.41	4.22	0.50	0.6	15	敗血症	1	5.71	2.86	0.53	1.1

附 註：1. 彰化縣伸港鄉年中人口數 計35,974人 男性18,474人 女性17,501人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣福興鄉主要死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	321	657.99	442.63	0.93	100.0		所有死亡原因	185	725.89	578.60	0.92	100.0		所有死亡原因	136	583.69	313.28	0.94	100.0
	十大主要死因	258	528.85	354.70	1.00	80.4		十大主要死因	148	580.71	460.83	1.04	80.0		十大主要死因	112	480.69	256.19	1.10	82.4
1	惡性腫瘤	99	202.93	148.57	1.04	30.8	1	惡性腫瘤	67	262.89	210.08	1.07	36.2	1	惡性腫瘤	32	137.34	89.05	0.97	23.5
2	衰老/老邁	42	86.09	46.84*+	6.42*	13.1	2	衰老/老邁	21	82.40	61.26*+	8.54*	11.4	2	衰老/老邁	21	90.13	37.83*+	5.16*	15.4
3	腦血管疾病	23	47.15	27.62	0.94	7.2	3	事故傷害	9	35.31	29.29	0.76	4.9	3	腦血管疾病	14	60.09	26.56	1.17	10.3
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	41.00	26.78*-	0.47*	6.2	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	9	35.31	28.54*-	0.39*	4.9	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	11	47.21	20.84*-	0.56	8.1
5	事故傷害	16	32.80	26.16	1.01	5.0	5	腦血管疾病	9	35.31	26.70	0.72	4.9	5	肺炎	10	42.92	17.92	1.04	7.4
6	肺炎	14	28.70	15.50*-	0.67	4.4	6	蓄意自我傷害(自殺)	8	31.39	29.52	1.78	4.3	6	糖尿病	8	34.33	20.45	0.74	5.9
7	糖尿病	13	26.65	17.51	0.67	4.0	7	慢性肝病及肝硬化	7	27.47	20.82	0.96	3.8	7	事故傷害	7	30.04	20.80	1.68	5.1
8	蓄意自我傷害(自殺)	11	22.55	19.79	1.76	3.4	8	慢性下呼吸道疾病	7	27.47	19.79	0.63	3.8	8	蓄意自我傷害(自殺)	3	12.88	9.05	1.66	2.2
9	慢性肝病及肝硬化	10	20.50	14.16	0.99	3.1	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	23.54	19.23	1.45	3.2	9	敗血症	3	12.88	7.51	0.98	2.2
10	慢性下呼吸道疾病	10	20.50	11.76	0.65	3.1	10	敗血症	5	19.62	15.61	1.50	2.7	10	慢性下呼吸道疾病	3	12.88	6.18	0.75	2.2
	其他非十大死因	63	129.14	87.93*-	0.72*	19.6		其他非十大死因	37	145.18	117.76*-	0.64*	20.0		其他非十大死因	24	103.00	57.09*-	0.57*	17.6
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	16.40	10.54	0.82	2.5	11	糖尿病	5	19.62	15.44	0.57	2.7	11	慢性肝病及肝硬化	3	12.88	5.72	1.01	2.2
12	敗血症	8	16.40	10.52	1.25	2.5	12	肺炎	4	15.69	11.31*-	0.36*	2.2	12	皮膚及皮下組織疾病	2	8.58	4.09	2.76	1.5
13	高血壓性疾病	5	10.25	5.81*-	0.45	1.6	13	高血壓性疾病	3	11.77	8.62	0.56	1.6	13	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	8.58	3.99*-	0.35	1.5
14	皮膚及皮下組織疾病	2	4.10	2.26	1.71	0.6	14	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	7.85	5.62	2.38	1.1	14	高血壓性疾病	2	8.58	3.06*-	0.35	1.5
15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	4.10	2.16	1.33	0.6	15	胃及十二指腸潰瘍	2	7.85	5.62	2.04	1.1	15	主動脈瘤及剝離	1	4.29	3.89	1.73	0.7

附 註：1. 彰化縣福興鄉年中人口數 計48,785人 男性25,486人 女性23,300人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣秀水鄉主要死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	253	645.44	454.30	0.99	100.0		所有死亡原因	151	744.03	605.85	1.00	100.0		所有死亡原因	102	539.63	315.44	0.96	100.0
	十大主要死因	188	479.62	337.58	0.96	74.3		十大主要死因	113	556.79	448.51	0.98	74.8		十大主要死因	76	402.07	238.24	0.98	74.5
1	惡性腫瘤	69	176.03	128.55	0.95	27.3	1	惡性腫瘤	47	231.58	184.02	1.00	31.1	1	惡性腫瘤	22	116.39	77.78	0.88	21.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	37	94.39	64.61	1.18	14.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	103.47	84.63	1.21	13.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	84.65	39.89	1.13	15.7
3	腦血管疾病	17	43.37	30.41	0.94	6.7	3	肺炎	11	54.20	42.70	1.34	7.3	3	腦血管疾病	10	52.90	31.02	1.14	9.8
4	肺炎	17	43.37	28.55	1.12	6.7	4	腦血管疾病	7	34.49	29.60	0.76	4.6	4	肺炎	6	31.74	20.83	0.87	5.9
5	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	25.51	16.28	1.40	4.0	5	事故傷害	5	24.64	19.64*-	0.55	3.3	5	糖尿病	5	26.45	13.81	0.62	4.9
6	事故傷害	9	22.96	18.79	0.73	3.6	6	慢性下呼吸道疾病	5	24.64	19.59	0.62	3.3	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	26.45	13.71	1.21	4.9
7	糖尿病	9	22.96	14.36*-	0.62	3.6	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	24.64	18.56	1.64	3.3	7	事故傷害	4	21.16	19.94	1.26	3.9
8	慢性下呼吸道疾病	8	20.41	13.36	0.72	3.2	8	蓄意自我傷害(自殺)	4	19.71	17.92	1.15	2.6	8	慢性下呼吸道疾病	3	15.87	8.66	1.06	2.9
9	高血壓性疾病	7	17.86	11.01	0.88	2.8	9	高血壓性疾病	4	19.71	17.08	1.02	2.6	9	高血壓性疾病	3	15.87	7.52	0.74	2.9
10	蓄意自我傷害(自殺)	5	12.76	11.65	1.03	2.0	10	慢性肝病及肝硬化	4	19.71	14.76	0.71	2.6	10	主動脈瘤及剝離	2	10.58	5.08	4.74	2.0
	其他非十大死因	65	165.82	116.72	1.05	25.7		其他非十大死因	38	187.24	157.34	1.08	25.2		其他非十大死因	26	137.55	77.20	0.92	25.5
11	慢性肝病及肝硬化	5	12.76	9.55	0.64	2.0	11	糖尿病	4	19.71	14.20	0.61	2.6	11	蓄意自我傷害(自殺)	1	5.29	4.53	0.71	1.0
12	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	4	10.20	6.05	3.65	1.6	12	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	14.78	12.12	4.93	2.0	12	敗血症	1	5.29	4.10	0.46	1.0
13	病毒性肝炎	2	5.10	4.74	4.00	0.8	13	病毒性肝炎	2	9.85	9.70	4.53	1.3	13	慢性肝病及肝硬化	1	5.29	3.58	0.45	1.0
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	5.10	3.46	1.10	0.8	14	先天性畸形變形及染色體異常	1	4.93	8.18	3.66	0.7	14	衰老/老邁	1	5.29	2.71	0.35	1.0
15	衰老/老邁	2	5.10	3.41	0.44	0.8	15	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	4.93	4.04	9.38	0.7	15	貧血	1	5.29	2.44	4.58	1.0

附 註：1. 彰化縣秀水鄉年中人口數 計39,198人 男性20,295人 女性18,902人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣花壇鄉主要死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	289	626.67	467.67	0.98	100.0		所有死亡原因	179	753.94	625.63	1.01	100.0		所有死亡原因	110	491.62	309.84	0.94	100.0
	十大主要死因	228	494.39	363.66	1.03	78.9		十大主要死因	146	614.94	501.07	1.05	81.6		十大主要死因	89	397.77	251.34	1.05	80.9
1	惡性腫瘤	80	173.47	131.56	0.95	27.7	1	惡性腫瘤	59	248.50	199.84	1.05	33.0	1	惡性腫瘤	21	93.85	65.18	0.73	19.1
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	34	73.73	53.28	0.95	11.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	17	71.60	57.79	0.83	9.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	17	75.98	46.65	1.11	15.5
3	腦血管疾病	19	41.20	28.27	0.93	6.6	3	事故傷害	13	54.76	45.56	1.20	7.3	3	糖尿病	10	44.69	32.88	1.15	9.1
4	糖尿病	18	39.03	31.34	1.10	6.2	4	慢性下呼吸道疾病	13	54.76	45.50	1.39	7.3	4	肺炎	9	40.22	20.32	1.21	8.2
5	慢性下呼吸道疾病	18	39.03	27.01	1.46	6.2	5	腦血管疾病	11	46.33	38.62	1.01	6.1	5	高血壓性疾病	8	35.75	23.40	1.80	7.3
6	肺炎	18	39.03	25.18	1.06	6.2	6	肺炎	9	37.91	31.02	0.94	5.0	6	腦血管疾病	8	35.75	19.80	0.83	7.3
7	事故傷害	16	34.69	27.19	1.11	5.5	7	糖尿病	8	33.70	28.17	1.03	4.5	7	慢性下呼吸道疾病	5	22.35	12.10	1.63	4.5
8	蓄意自我傷害(自殺)	9	19.52	15.25	1.53	3.1	8	慢性肝病及肝硬化	7	29.48	24.00	1.04	3.9	8	蓄意自我傷害(自殺)	4	17.88	12.62	2.41	3.6
9	高血壓性疾病	8	17.35	13.09	0.89	2.8	9	蓄意自我傷害(自殺)	5	21.06	17.04	1.18	2.8	9	敗血症	4	17.88	8.77	1.67	3.6
10	敗血症	8	17.35	11.50	1.52	2.8	10	敗血症	4	16.85	13.53	1.38	2.2	10	事故傷害	3	13.41	9.62	0.82	2.7
	其他非十大死因	61	132.27	104.00	0.83	21.1		其他非十大死因	33	138.99	124.56	0.84	18.4		其他非十大死因	21	93.85	58.50*-	0.65*	19.1
11	慢性肝病及肝硬化	7	15.18	12.36	0.75	2.4	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	16.85	12.61	1.11	2.2	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	13.41	8.01	0.66	2.7
12	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	15.18	10.35	0.86	2.4	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	12.64	10.56	2.63	1.7	12	胃及十二指腸潰瘍	1	4.47	2.77	2.04	0.9
13	主動脈瘤及剝離	3	6.51	5.01	2.19	1.0	13	主動脈瘤及剝離	3	12.64	9.84	3.28	1.7	13	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	4.47	2.12	1.94	0.9
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	6.51	4.55	1.42	1.0	14	源於周產期的特定病況	1	4.21	8.87	2.03	0.6	14	衰老/老邁	1	4.47	2.12*-	0.33	0.9
15	胃及十二指腸潰瘍	2	4.34	6.13	1.51	0.7	15	胃及十二指腸潰瘍	1	4.21	8.87	1.19	0.6							

附 註：1. 彰化縣花壇鄉年中人口數 計46,117人 男性23,742人 女性22,375人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣芬園鄉主要死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性							女 性						
順	死 亡 原 因	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	死 亡 原 因	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡	順	死 亡 原 因	死亡	每十萬	標準化	標準	死亡
位	(ICD-10分類)	人數	死亡率	死亡率	死亡比	%	位	(ICD-10分類)	人數	死亡率	死亡率	死亡比	%	位	(ICD-10分類)	人數	死亡率	死亡率	死亡比	%
	所有死亡原因	252	1,018.51	535.52	1.13	100.0		所有死亡原因	153	1,165.00	698.64	1.15	100.0		所有死亡原因	99	852.79	374.42	1.07	100.0
	十大主要死因	202	816.43	427.56*+	1.17*	80.2		十大主要死因	131	997.49	601.20*+	1.27*	85.6		十大主要死因	74	637.44	268.90	1.10	74.7
1	惡性腫瘤	76	307.17	185.68*+	1.26	30.2	1	惡性腫瘤	56	426.41	274.81*+	1.36*	36.6	1	惡性腫瘤	20	172.28	86.04	0.99	20.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	32	129.33	56.80	1.14	12.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	121.83	68.80	1.03	10.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	137.82	46.90	1.24	16.2
3	腦血管疾病	18	72.75	34.87	1.11	7.1	3	慢性下呼吸道疾病	12	91.37	51.12	1.50	7.8	3	腦血管疾病	10	86.14	36.76	1.27	10.1
4	慢性下呼吸道疾病	15	60.63	25.61	1.42	6.0	4	事故傷害	11	83.76	57.28	1.61	7.2	4	糖尿病	6	51.68	23.84	0.85	6.1
5	高血壓性疾病	15	60.63	25.24	2.01*	6.0	5	高血壓性疾病	10	76.14	39.59	2.69*	6.5	5	高血壓性疾病	5	43.07	16.91	1.32	5.1
6	事故傷害	12	48.50	33.15	1.32	4.8	6	腦血管疾病	8	60.92	31.08	0.94	5.2	6	慢性肝病及肝硬化	4	34.46	18.08	2.19	4.0
7	糖尿病	12	48.50	22.68	0.92	4.8	7	肺炎	6	45.69	27.56	0.75	3.9	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	34.46	12.70	1.06	4.0
8	肺炎	10	40.42	18.85	0.69	4.0	8	糖尿病	6	45.69	22.70	1.00	3.9	8	肺炎	4	34.46	12.70	0.62	4.0
9	慢性肝病及肝硬化	7	28.29	15.72	1.16	2.8	9	結核病	3	22.84	14.94	3.07	2.0	9	慢性下呼吸道疾病	3	25.84	7.89	1.12	3.0
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	20.21	8.96	0.76	2.0	10	慢性肝病及肝硬化	3	22.84	13.30	0.69	2.0	10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	17.23	7.09	2.88	2.0
	其他非十大死因	50	202.09	107.96	0.98	19.8		其他非十大死因	22	167.52	97.44*-	0.73	14.4		其他非十大死因	25	215.35	105.52	1.00	25.3
11	敗血症	4	16.17	6.58	0.94	1.6	11	敗血症	3	22.84	11.68	1.30	2.0	11	主動脈瘤及剝離	2	17.23	4.96	5.47	2.0
12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	12.13	7.15	2.00	1.2	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	15.23	10.54	2.96	1.3	12	先天性畸形變形及染色體異常	1	8.61	18.00	9.70	1.0
13	結核病	3	12.13	6.26	2.30	1.2	13	主動脈瘤及剝離	1	7.61	4.99	1.49	0.7	13	源於周產期的特定病況	1	8.61	18.00	5.03	1.0
14	主動脈瘤及剝離	3	12.13	5.70	2.95	1.2	14	蓄意自我傷害(自殺)	1	7.61	4.99	0.38	0.7	14	事故傷害	1	8.61	6.51	0.41	1.0
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	8.08	3.61	1.32	0.8	15	衰老/老邁	1	7.61	4.27	0.55	0.7	15	貧血	1	8.61	4.41	4.96	1.0

附 註：1. 彰化縣芬園鄉年中人口數 計24,742人 男性13,133人 女性11,609人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣大村鄉主要死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	255	697.39	493.13	1.04	100.0		所有死亡原因	142	745.25	587.50	0.97	100.0		所有死亡原因	113	645.35	401.21	1.13	100.0
	十大主要死因	199	544.24	383.88	1.05	78.0		十大主要死因	116	608.80	485.25	1.00	81.7		十大主要死因	90	513.99	309.82	1.22	79.6
1	惡性腫瘤	72	196.91	147.83	1.02	28.2	1	惡性腫瘤	49	257.16	203.27	1.06	34.5	1	惡性腫瘤	23	131.35	97.43	0.95	20.4
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	62.90	40.24	0.77	9.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	62.98	47.02	0.71	8.5	2	腦血管疾病	13	74.24	41.04	1.57	11.5
3	腦血管疾病	21	57.43	38.08	1.21	8.2	3	慢性下呼吸道疾病	10	52.48	40.20	1.28	7.0	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	11	62.82	32.02	0.84	9.7
4	慢性下呼吸道疾病	17	46.49	29.39	1.61	6.7	4	事故傷害	9	47.23	49.11	1.02	6.3	4	糖尿病	7	39.98	24.37	0.92	6.2
5	肺炎	14	38.29	22.92	0.98	5.5	5	腦血管疾病	8	41.99	32.08	0.89	5.6	5	慢性下呼吸道疾病	7	39.98	22.88	2.68*	6.2
6	事故傷害	11	30.08	28.52	0.93	4.3	6	肺炎	7	36.74	27.84	0.88	4.9	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	39.98	19.72	1.82	6.2
7	糖尿病	11	30.08	19.73	0.79	4.3	7	蓄意自我傷害(自殺)	6	31.49	24.71	1.76	4.2	7	肺炎	7	39.98	18.73	1.11	6.2
8	慢性肝病及肝硬化	10	27.35	21.08	1.31	3.9	8	慢性肝病及肝硬化	6	31.49	24.62	1.09	4.2	8	敗血症	6	34.27	17.00	2.95*	5.3
9	高血壓性疾病	10	27.35	20.01	1.32	3.9	9	高血壓性疾病	5	26.24	21.90	1.32	3.5	9	高血壓性疾病	5	28.56	19.79	1.33	4.4
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	27.35	16.08	1.47	3.9	10	糖尿病	4	20.99	14.49	0.63	2.8	10	慢性肝病及肝硬化	4	22.84	16.84	1.85	3.5
	其他非十大死因	56	153.15	109.25	1.00	22.0		其他非十大死因	26	136.45	102.25	0.85	18.3		其他非十大死因	23	131.35	91.39	0.89	20.4
11	敗血症	9	24.61	15.33	2.04	3.5	11	敗血症	3	15.74	11.47	1.26	2.1	11	皮膚及皮下組織疾病	4	22.84	13.18	8.26*	3.5
12	蓄意自我傷害(自殺)	8	21.88	17.41	1.68	3.1	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	15.74	10.63	1.01	2.1	12	蓄意自我傷害(自殺)	2	11.42	10.31	1.46	1.8
13	皮膚及皮下組織疾病	5	13.67	8.64	6.04*	2.0	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	10.50	8.59	2.74	1.4	13	事故傷害	2	11.42	5.32*-	0.65	1.8
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	8.20	6.62	1.85	1.2	14	胃及十二指腸潰瘍	2	10.50	8.40	2.92	1.4	14	源於周產期的特定病況	1	5.71	14.01	3.93	0.9
15	主動脈瘤及剝離	2	5.47	3.89	1.73	0.8	15	主動脈瘤及剝離	2	10.50	7.73	2.64	1.4	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	5.71	5.88	1.13	0.9

附 註：1. 彰化縣大村鄉年中人口數 計36,565人 男性19,054人 女性17,510人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埔鹽鄉主要死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	272	795.72	417.14*-	0.92	100.0		所有死亡原因	143	798.39	500.32*-	0.85*	100.0		所有死亡原因	129	792.77	340.19	1.02	100.0
	十大主要死因	218	637.74	329.93	0.99	80.1		十大主要死因	113	630.90	394.92*-	0.87	79.0		十大主要死因	108	663.72	287.98	1.16	83.7
1	惡性腫瘤	73	213.56	129.66	0.92	26.8	1	惡性腫瘤	44	245.66	156.17	0.84	30.8	1	惡性腫瘤	29	178.22	109.18	1.05	22.5
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	30	87.76	42.30	0.81	11.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	78.16	50.59	0.71	9.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	98.33	30.87	0.90	12.4
3	腦血管疾病	22	64.36	29.58	1.03	8.1	3	腦血管疾病	12	67.00	38.54	1.12	8.4	3	肺炎	13	79.89	25.31	1.46	10.1
4	肺炎	22	64.36	27.10	1.16	8.1	4	肺炎	9	50.25	29.19	0.90	6.3	4	糖尿病	11	67.60	27.28	1.14	8.5
5	糖尿病	17	49.73	23.98	0.99	6.3	5	慢性下呼吸道疾病	9	50.25	28.59	0.90	6.3	5	腦血管疾病	10	61.46	22.39	0.93	7.8
6	衰老/老邁	17	49.73	19.27*+	2.81*	6.3	6	衰老/老邁	7	39.08	22.99	3.11*	4.9	6	衰老/老邁	10	61.46	16.80	2.63*	7.8
7	慢性下呼吸道疾病	13	38.03	14.89	0.94	4.8	7	糖尿病	6	33.50	19.14	0.79	4.2	7	敗血症	6	36.87	20.23	2.20	4.7
8	事故傷害	9	26.33	20.27	0.73	3.3	8	事故傷害	5	27.92	21.23	0.55	3.5	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	30.73	10.20	0.97	3.9
9	敗血症	9	26.33	15.67	1.60	3.3	9	慢性肝病及肝硬化	4	22.33	16.09	0.71	2.8	9	事故傷害	4	24.58	18.80	1.20	3.1
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	17.55	7.21	0.69	2.2	10	敗血症	3	16.75	12.39	1.04	2.1	10	慢性下呼吸道疾病	4	24.58	6.91	1.08	3.1
	其他非十大死因	54	157.97	87.22*-	0.73*	19.9		其他非十大死因	30	167.49	105.39*-	0.77	21.0		其他非十大死因	21	129.06	52.22*-	0.63*	16.3
11	慢性肝病及肝硬化	5	14.63	9.55	0.63	1.8	11	高血壓性疾病	3	16.75	12.02	0.65	2.1	11	蓄意自我傷害(自殺)	1	6.15	5.21	0.72	0.8
12	蓄意自我傷害(自殺)	4	11.70	8.30	0.84	1.5	12	蓄意自我傷害(自殺)	3	16.75	11.55	0.88	2.1	12	貧血	1	6.15	4.96	3.63	0.8
13	高血壓性疾病	3	8.78	6.14*-	0.31*	1.1	13	胃及十二指腸潰瘍	3	16.75	9.37	3.45	2.1	13	慢性肝病及肝硬化	1	6.15	2.47*-	0.40	0.8
14	胃及十二指腸潰瘍	3	8.78	3.84	2.14	1.1	14	貧血	1	5.58	4.06	3.22	0.7	14	帕金森病	1	6.15	1.97	1.44	0.8
15	貧血	2	5.85	4.67	3.47	0.7	15	皮膚及皮下組織疾病	1	5.58	4.03	2.46	0.7	15	膽結石及其他膽囊疾患	1	6.15	1.65	3.21	0.8

附 註：1. 彰化縣埔鹽鄉年中人口數 計34,183人 男性17,911人 女性16,272人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埔心鄉主要死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	254	719.51	475.61	1.01	100.0		所有死亡原因	160	876.52	684.66	1.09	100.0		所有死亡原因	94	551.42	274.83*-	0.90	100.0
	十大主要死因	203	575.04	374.94	1.08	79.9		十大主要死因	133	728.61	559.92	1.17	83.1		十大主要死因	71	416.50	206.70	0.94	75.5
1	惡性腫瘤	74	209.62	142.73	1.05	29.1	1	惡性腫瘤	59	323.22	240.77	1.28	36.9	1	肺炎	16	93.86	42.02*+	2.32*	17.0
2	肺炎	26	73.65	46.65*+	1.72*	10.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	82.17	65.30	0.89	9.4	2	惡性腫瘤	15	87.99	45.94*-	0.62	16.0
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	26	73.65	44.47	0.84	10.2	3	腦血管疾病	12	65.74	49.85	1.32	7.5	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	11	64.53	26.85	0.78	11.7
4	糖尿病	17	48.16	32.23	1.19	6.7	4	肺炎	10	54.78	49.20	1.24	6.3	4	糖尿病	8	46.93	25.24	1.02	8.5
5	腦血管疾病	17	48.16	31.37	0.96	6.7	5	糖尿病	9	49.30	38.23	1.39	5.6	5	腦血管疾病	5	29.33	17.33	0.58	5.3
6	慢性下呼吸道疾病	13	36.83	19.91	1.18	5.1	6	慢性下呼吸道疾病	9	49.30	36.40	1.13	5.6	6	敗血症	4	23.46	11.29	1.84	4.3
7	高血壓性疾病	10	28.33	16.03	1.26	3.9	7	事故傷害	7	38.35	31.28	0.81	4.4	7	高血壓性疾病	4	23.46	9.57	0.98	4.3
8	事故傷害	9	25.49	20.71	0.77	3.5	8	高血壓性疾病	6	32.87	21.08	1.56	3.8	8	慢性下呼吸道疾病	4	23.46	8.87	1.40	4.3
9	敗血症	6	17.00	9.59	1.30	2.4	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	16.43	14.25	1.00	1.9	9	事故傷害	2	11.73	11.00	0.66	2.1
10	蓄意自我傷害(自殺)	5	14.16	11.26	1.07	2.0	10	蓄意自我傷害(自殺)	3	16.43	13.56	0.90	1.9	10	蓄意自我傷害(自殺)	2	11.73	8.58	1.48	2.1
	其他非十大死因	51	144.47	100.67	0.81	20.1		其他非十大死因	27	147.91	124.74	0.81	16.9		其他非十大死因	23	134.92	68.13	0.79	24.5
11	慢性肝病及肝硬化	5	14.16	9.96	0.67	2.0	11	慢性肝病及肝硬化	3	16.43	13.27	0.55	1.9	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	11.73	5.45	0.49	2.1
12	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	14.16	9.34	0.71	2.0	12	胃及十二指腸潰瘍	2	10.96	9.07	2.89	1.3	12	慢性肝病及肝硬化	2	11.73	5.14	0.93	2.1
13	胃及十二指腸潰瘍	3	8.50	5.36	2.61	1.2	13	敗血症	2	10.96	8.06	0.83	1.3	13	膽結石及其他膽囊疾患	1	5.87	5.71	4.05	1.1
14	疝氣及腸阻塞	2	5.67	3.08	2.77	0.8	14	源於周產期的特定病況	1	5.48	14.12	3.22	0.6	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	5.87	3.97	1.21	1.1
15	結核病	2	5.67	3.08	1.46	0.8	15	病毒性肝炎	1	5.48	5.01	2.34	0.6	15	胃及十二指腸潰瘍	1	5.87	2.88	2.34	1.1

附 註：1. 彰化縣埔心鄉年中人口數 計35,302人 男性18,254人 女性17,047人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣永靖鄉主要死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	281	718.89	463.53	0.99	100.0		所有死亡原因	157	774.39	572.50	0.95	100.0		所有死亡原因	124	659.08	359.70	1.05	100.0
	十大主要死因	214	547.48	345.12	0.99	76.2		十大主要死因	120	591.89	435.73	0.92	76.4		十大主要死因	98	520.89	269.02	1.17	79.0
1	惡性腫瘤	79	202.11	136.60	0.99	28.1	1	惡性腫瘤	49	241.69	177.53	0.95	31.2	1	惡性腫瘤	30	159.46	105.28	1.09	24.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	26	66.52	40.38	0.74	9.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	64.12	45.41	0.68	8.3	2	糖尿病	17	90.36	41.41	1.90*	13.7
3	糖尿病	26	66.52	38.48	1.60*	9.3	3	肺炎	11	54.26	39.65	1.19	7.0	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	69.10	32.12	0.82	10.5
4	肺炎	18	46.05	25.93	1.05	6.4	4	糖尿病	9	44.39	32.24	1.23	5.7	4	高血壓性疾病	10	53.15	20.95	2.16*	8.1
5	高血壓性疾病	17	43.49	23.70	1.89*	6.0	5	蓄意自我傷害(自殺)	7	34.53	27.82	1.90	4.5	5	腦血管疾病	9	47.84	20.23	0.91	7.3
6	腦血管疾病	15	38.37	22.28	0.74	5.3	6	事故傷害	7	34.53	27.36	0.73	4.5	6	肺炎	7	37.21	15.70	0.90	5.6
7	慢性下呼吸道疾病	11	28.14	15.30	0.88	3.9	7	高血壓性疾病	7	34.53	25.97	1.60	4.5	7	慢性下呼吸道疾病	4	21.26	9.98	1.24	3.2
8	事故傷害	8	20.47	15.47*-	0.62	2.8	8	慢性下呼吸道疾病	7	34.53	23.52	0.77	4.5	8	胃及十二指腸潰瘍	3	15.95	9.69	6.10*	2.4
9	蓄意自我傷害(自殺)	8	20.47	15.30	1.56	2.8	9	腦血管疾病	6	29.59	20.70	0.58	3.8	9	敗血症	3	15.95	6.73	1.22	2.4
10	慢性肝病及肝硬化	6	15.35	11.67	0.72	2.1	10	慢性肝病及肝硬化	4	19.73	15.52	0.67	2.5	10	慢性肝病及肝硬化	2	10.63	6.94	0.81	1.6
	其他非十大死因	67	171.41	118.41	0.99	23.8		其他非十大死因	37	182.50	136.77	1.06	23.6		其他非十大死因	26	138.19	90.68	0.75	21.0
11	敗血症	5	12.79	8.15	0.96	1.8	11	結核病	4	19.73	14.62	3.54	2.5	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	10.63	4.43*-	0.43	1.6
12	結核病	5	12.79	7.51	3.19*	1.8	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	14.80	10.87	0.88	1.9	12	源於周產期的特定病況	1	5.32	12.63	3.54	0.8
13	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	12.79	6.63	0.62	1.8	13	貧血	2	9.86	9.10	6.68	1.3	13	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	5.32	3.78	8.54	0.8
14	胃及十二指腸潰瘍	4	10.23	6.55	3.05	1.4	14	敗血症	2	9.86	8.37	0.73	1.3	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	5.32	3.25	1.06	0.8
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	7.67	4.67	1.59	1.1	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	9.86	6.45	2.39	1.3	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	5.32	3.25	0.94	0.8

附 註：1. 彰化縣永靖鄉年中人口數 計39,088人 男性20,274人 女性18,814人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣社頭鄉主要死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	338	757.98	512.40	1.09	100.0		所有死亡原因	206	899.48	697.91	1.11	100.0		所有死亡原因	132	608.58	348.70	1.04	100.0
	十大主要死因	265	594.28	398.91	1.10	78.4		十大主要死因	172	751.03	570.37*+	1.18*	83.5		十大主要死因	96	442.60	257.42	1.12	72.7
1	惡性腫瘤	92	206.32	147.88	1.03	27.2	1	惡性腫瘤	62	270.72	207.36	1.06	30.1	1	惡性腫瘤	30	138.31	94.37	0.99	22.7
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	39	87.46	55.20	1.03	11.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	25	109.16	82.84	1.17	12.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	64.55	33.89	0.83	10.6
3	腦血管疾病	25	56.06	36.97	1.14	7.4	3	慢性下呼吸道疾病	17	74.23	55.16	1.69	8.3	3	肺炎	11	50.71	25.20	1.35	8.3
4	慢性下呼吸道疾病	24	53.82	30.99*+	1.77*	7.1	4	腦血管疾病	17	74.23	53.92	1.47	8.3	4	腦血管疾病	8	36.88	20.28	0.76	6.1
5	肺炎	21	47.09	28.88	1.15	6.2	5	事故傷害	10	43.66	39.55	0.93	4.9	5	高血壓性疾病	8	36.88	18.16	1.65	6.1
6	高血壓性疾病	16	35.88	21.95	1.66	4.7	6	肺炎	10	43.66	30.80	0.99	4.9	6	慢性下呼吸道疾病	7	32.27	14.12	2.07	5.3
7	事故傷害	15	33.64	29.46	1.03	4.4	7	高血壓性疾病	8	34.93	27.42	1.65	3.9	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	27.66	14.38	1.21	4.5
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	14	31.40	18.89	1.60	4.1	8	糖尿病	8	34.93	25.23	0.97	3.9	8	事故傷害	5	23.05	18.76	1.30	3.8
9	糖尿病	11	24.67	14.75*-	0.62	3.3	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	34.93	24.68	2.09	3.9	9	蓄意自我傷害(自殺)	4	18.44	10.20	2.36	3.0
10	慢性肝病及肝硬化	8	17.94	13.95	0.85	2.4	10	慢性肝病及肝硬化	7	30.57	23.41	1.03	3.4	10	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	13.83	8.06	2.67	2.3
	其他非十大死因	73	163.71	113.48	1.04	21.6		其他非十大死因	34	148.46	127.55	0.87	16.5		其他非十大死因	36	165.98	91.28	0.88	27.3
11	蓄意自我傷害(自殺)	6	13.46	9.19	1.03	1.8	11	敗血症	2	8.73	7.19	0.66	1.0	11	糖尿病	3	13.83	6.73*-	0.31*	2.3
12	敗血症	4	8.97	6.58	0.71	1.2	12	蓄意自我傷害(自殺)	2	8.73	6.92	0.48	1.0	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	9.22	7.33	1.91	1.5
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	8.97	5.96	1.95	1.2	13	主動脈瘤及剝離	2	8.73	6.71	2.10	1.0	13	敗血症	2	9.22	6.33	0.77	1.5
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	6.73	5.13	1.34	0.9	14	血管性及未明示之癱瘓症	1	4.37	3.96	2.75	0.5	14	衰老/老邁	2	9.22	4.07	0.60	1.5
15	主動脈瘤及剝離	3	6.73	4.57	2.08	0.9	15	結核病	1	4.37	3.96	0.81	0.5	15	慢性肝病及肝硬化	1	4.61	3.53	0.37	0.8

附 註：1. 彰化縣社頭鄉年中人口數 計44,592人 男性22,902人 女性21,690人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣二水鄉主要死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	183	1,113.68	484.06	1.04	100.0		所有死亡原因	94	1,089.60	558.32	0.90	100.0		所有死亡原因	89	1,140.15	402.50	1.21	100.0
	十大主要死因	149	906.77	392.13	1.10	81.4		十大主要死因	80	927.32	469.00	1.01	85.1		十大主要死因	73	935.18	328.19*+	1.38*	82.0
1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	48	292.11	105.20*+	2.14*	26.2	1	惡性腫瘤	25	289.79	138.61	0.78	26.6	1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	27	345.89	95.95*+	2.63*	30.3
2	惡性腫瘤	45	273.86	128.14	0.95	24.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	243.42	111.23	1.71*	22.3	2	惡性腫瘤	20	256.21	120.32	1.24	22.5
3	腦血管疾病	12	73.03	43.47	0.92	6.6	3	腦血管疾病	7	81.14	50.15	1.03	7.4	3	腦血管疾病	5	64.05	36.30	0.79	5.6
4	肺炎	12	73.03	24.25	1.03	6.6	4	肺炎	7	81.14	36.12	1.06	7.4	4	肺炎	5	64.05	15.10	0.97	5.6
5	糖尿病	7	42.60	21.46	0.67	3.8	5	事故傷害	6	69.55	51.69	1.23	6.4	5	高血壓性疾病	4	51.24	15.11	1.32	4.5
6	事故傷害	6	36.51	28.54	0.90	3.3	6	糖尿病	4	46.37	29.54	0.84	4.3	6	慢性肝病及肝硬化	3	38.43	15.52	2.02	3.4
7	高血壓性疾病	6	36.51	11.97	1.00	3.3	7	慢性下呼吸道疾病	4	46.37	17.60	0.60	4.3	7	糖尿病	3	38.43	10.25*-	0.53	3.4
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	30.43	9.15	0.94	2.7	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	34.77	13.84	1.31	3.2	8	敗血症	2	25.62	7.35	1.26	2.2
9	慢性肝病及肝硬化	4	24.34	12.59	0.89	2.2	9	高血壓性疾病	2	23.18	8.26	0.66	2.1	9	帕金森病	2	25.62	6.58	4.82	2.2
10	慢性下呼吸道疾病	4	24.34	7.36*-	0.47	2.2	10	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	1	11.59	11.96	10.88	1.1	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	25.62	5.71	0.66	2.2
	其他非十大死因	34	206.91	91.93	0.85	18.6		其他非十大死因	14	162.28	89.32*-	0.56*	14.9		其他非十大死因	16	204.97	74.31	0.78	18.0
11	敗血症	3	18.26	5.54	0.88	1.6	11	慢性肝病及肝硬化	1	11.59	8.40	0.32	1.1	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	12.81	8.12	1.79	1.1
12	帕金森病	2	12.17	3.86	2.87	1.1	12	蓄意自我傷害(自殺)	1	11.59	8.15	0.54	1.1	12	皮膚及皮下組織疾病	1	12.81	7.93	2.66	1.1
13	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	1	6.09	6.50	11.45	0.5	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	11.59	5.04	1.87	1.1	13	疝氣及腸阻塞	1	12.81	2.86	3.39	1.1
14	蓄意自我傷害(自殺)	1	6.09	4.72	0.39	0.5	14	敗血症	1	11.59	5.04	0.54	1.1	14	衰老/老邁	1	12.81	2.86	0.46	1.1
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	6.09	3.96	0.84	0.5	15	胃及十二指腸潰瘍	1	11.59	3.76	1.80	1.1							

附 註：1. 彰化縣二水鄉年中人口數 計16,432人 男性8,627人 女性7,806人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣田尾鄉主要死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	260	912.38	538.35	1.09	100.0		所有死亡原因	151	1,016.70	697.53	1.09	100.0		所有死亡原因	109	798.83	371.40	1.08	100.0
	十大主要死因	185	649.19	377.98	1.01	71.2		十大主要死因	108	727.17	485.52	0.99	71.5		十大主要死因	77	564.31	261.53	1.02	70.6
1	惡性腫瘤	60	210.55	131.14	0.93	23.1	1	惡性腫瘤	39	262.59	179.54	0.92	25.8	1	惡性腫瘤	21	153.90	80.86	0.94	19.3
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	28	98.26	55.04	0.93	10.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	87.53	57.74	0.80	8.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	109.93	48.49	1.07	13.8
3	腦血管疾病	18	63.16	31.77	1.04	6.9	3	慢性肝病及肝硬化	12	80.80	58.56*+	2.59*	7.9	3	糖尿病	10	73.29	33.94	1.29	9.2
4	慢性肝病及肝硬化	16	56.15	38.53*+	2.45*	6.2	4	慢性下呼吸道疾病	11	74.06	41.93	1.33	7.3	4	腦血管疾病	9	65.96	27.46	1.04	8.3
5	糖尿病	15	52.64	30.36	1.08	5.8	5	腦血管疾病	9	60.60	36.16	1.02	6.0	5	慢性肝病及肝硬化	4	29.31	14.37	1.97	3.7
6	慢性下呼吸道疾病	15	52.64	25.60	1.33	5.8	6	事故傷害	6	40.40	31.95	0.81	4.0	6	慢性下呼吸道疾病	4	29.31	13.29	1.37	3.7
7	事故傷害	9	31.58	24.82	0.90	3.5	7	糖尿病	5	33.67	23.26	0.81	3.3	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	29.31	9.21	0.98	3.7
8	肺炎	9	31.58	13.03*-	0.58	3.5	8	肺炎	5	33.67	19.14	0.60	3.3	8	肺炎	4	29.31	8.48*-	0.57	3.7
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	28.07	16.63	1.14	3.1	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	26.93	21.37	1.37	2.6	9	事故傷害	3	21.99	18.28	1.10	2.8
10	高血壓性疾病	7	24.56	11.08	0.88	2.7	10	高血壓性疾病	4	26.93	15.87	1.04	2.6	10	高血壓性疾病	3	21.99	7.14	0.73	2.8
	其他非十大死因	75	263.19	160.37*+	1.37*	28.8		其他非十大死因	43	289.52	212.01*+	1.45*	28.5		其他非十大死因	32	234.52	109.87	1.26	29.4
11	蓄意自我傷害(自殺)	5	17.55	13.55	1.28	1.9	11	蓄意自我傷害(自殺)	3	20.20	17.25	1.07	2.0	11	蓄意自我傷害(自殺)	2	14.66	8.71	1.73	1.8
12	敗血症	5	17.55	7.69	1.10	1.9	12	敗血症	3	20.20	11.57	1.25	2.0	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	14.66	6.35	2.64	1.8
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	14.04	7.75	2.46	1.5	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	13.47	8.60	2.29	1.3	13	衰老/老邁	2	14.66	5.02	0.67	1.8
14	衰老/老邁	4	14.04	6.23	0.81	1.5	14	衰老/老邁	2	13.47	7.99	1.04	1.3	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	14.66	4.97	2.18	1.8
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	10.53	5.72	1.87	1.2	15	皮膚及皮下組織疾病	2	13.47	7.45	5.96	1.3	15	帕金森病	2	14.66	4.63	3.60	1.8

附 註：1. 彰化縣田尾鄉年中人口數 計28,497人 男性14,852人 女性13,645人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埤頭鄉主要死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	297	938.80	545.50*+	1.11	100.0		所有死亡原因	177	1,072.86	732.02*+	1.15	100.0		所有死亡原因	120	792.71	365.88	1.04	100.0
	十大主要死因	235	742.82	421.71*+	1.13	79.1		十大主要死因	148	897.08	589.74*+	1.23*	83.6		十大主要死因	90	594.53	269.73	1.07	75.0
1	惡性腫瘤	69	218.11	137.70	0.93	23.2	1	惡性腫瘤	45	272.76	189.78	0.94	25.4	1	惡性腫瘤	24	158.54	83.24	0.93	20.0
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	43	135.92	69.61	1.28	14.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	25	151.53	92.32	1.40	14.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	118.91	47.98	1.13	15.0
3	肺炎	21	66.38	32.64	1.24	7.1	3	事故傷害	19	115.17	88.68*+	2.33*	10.7	3	高血壓性疾病	9	59.45	24.18	1.93	7.5
4	事故傷害	20	63.22	46.58	1.78*	6.7	4	慢性下呼吸道疾病	14	84.86	45.53	1.57	7.9	4	糖尿病	8	52.85	25.73	0.90	6.7
5	腦血管疾病	19	60.06	30.08	0.97	6.4	5	肺炎	13	78.80	51.46	1.46	7.3	5	肺炎	8	52.85	19.71	1.01	6.7
6	慢性下呼吸道疾病	17	53.74	24.28	1.36	5.7	6	腦血管疾病	11	66.67	41.61	1.13	6.2	6	腦血管疾病	8	52.85	17.35	0.82	6.7
7	糖尿病	15	47.41	25.02	0.95	5.1	7	糖尿病	7	42.43	25.09	1.01	4.0	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	39.64	21.92	1.28	5.0
8	高血壓性疾病	14	44.25	22.80	1.59	4.7	8	高血壓性疾病	5	30.31	19.57	1.20	2.8	8	慢性肝病及肝硬化	4	26.42	13.42	1.70	3.3
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	28.45	16.78	1.14	3.0	9	敗血症	5	30.31	18.66	1.92	2.8	9	慢性下呼吸道疾病	3	19.82	9.00	0.91	2.5
10	慢性肝病及肝硬化	8	25.29	16.22	1.09	2.7	10	慢性肝病及肝硬化	4	24.25	17.05	0.78	2.3	10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	13.21	7.20	2.24	1.7
	其他非十大死因	62	195.98	123.79	1.01	20.9		其他非十大死因	29	175.78	142.27	0.88	16.4		其他非十大死因	30	198.18	96.15	0.97	25.0
11	敗血症	6	18.97	9.98	1.18	2.0	11	衰老/老邁	3	18.18	11.34	1.54	1.7	11	血管性及未明示之癱瘓症	2	13.21	4.08	4.06	1.7
12	衰老/老邁	4	12.64	5.39	0.76	1.3	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	18.18	10.95	0.92	1.7	12	蓄意自我傷害(自殺)	1	6.61	5.50	0.77	0.8
13	蓄意自我傷害(自殺)	3	9.48	7.84	0.68	1.0	13	先天性畸形變形及染色體異常	2	12.12	27.31	9.64*	1.1	13	敗血症	1	6.61	5.50	0.41	0.8
14	血管性及未明示之癱瘓症	3	9.48	3.91	3.59	1.0	14	蓄意自我傷害(自殺)	2	12.12	9.86	0.64	1.1	14	事故傷害	1	6.61	3.22*-	0.32	0.8
15	先天性畸形變形及染色體異常	2	6.32	14.41	6.22	0.7	15	病毒性肝炎	1	6.06	4.92	2.32	0.6	15	結核病	1	6.61	2.56	2.40	0.8

附 註：1. 彰化縣埤頭鄉年中人口數 計31,636人 男性16,498人 女性15,138人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣芳苑鄉主要死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	368	1,021.20	506.30	1.00	100.0		所有死亡原因	222	1,164.19	679.20	1.07	100.0		所有死亡原因	146	860.49	322.34	0.90	100.0
	十大主要死因	276	765.90	366.56	0.99	75.0		十大主要死因	167	875.77	493.55	1.06	75.2		十大主要死因	112	660.10	241.37	1.00	76.7
1	惡性腫瘤	114	316.35	162.16	1.16	31.0	1	惡性腫瘤	72	377.58	214.30	1.13	32.4	1	惡性腫瘤	42	247.54	106.66	1.22	28.8
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	42	116.55	48.42	0.90	11.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	120.61	63.96	0.95	10.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	111.98	33.46	0.82	13.0
3	腦血管疾病	31	86.03	35.93	1.14	8.4	3	事故傷害	14	73.42	49.26	1.35	6.3	3	腦血管疾病	18	106.09	28.48	1.29	12.3
4	糖尿病	21	58.28	20.84	0.97	5.7	4	腦血管疾病	13	68.17	37.83	0.98	5.9	4	糖尿病	9	53.04	14.08*-	0.72	6.2
5	事故傷害	17	47.18	30.90	1.20	4.6	5	糖尿病	12	62.93	30.58	1.27	5.4	5	肺炎	8	47.15	20.68	0.69	5.5
6	肺炎	17	47.18	22.89	0.70	4.6	6	慢性肝病及肝硬化	9	47.20	33.99	1.37	4.1	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	23.58	8.32	0.59	2.7
7	慢性肝病及肝硬化	11	30.53	21.20	1.17	3.0	7	肺炎	9	47.20	25.69	0.72	4.1	7	事故傷害	3	17.68	12.63	0.73	2.1
8	敗血症	8	22.20	8.57	1.11	2.2	8	慢性下呼吸道疾病	7	36.71	17.69*-	0.56	3.2	8	敗血症	3	17.68	7.18	0.85	2.1
9	慢性下呼吸道疾病	8	22.20	8.54*-	0.45*	2.2	9	敗血症	5	26.22	11.59	1.40	2.3	9	胃及十二指腸潰瘍	3	17.68	5.56	4.66	2.1
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	19.43	7.10	0.63	1.9	10	結核病	3	15.73	8.64	1.97	1.4	10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	17.68	4.33	2.53	2.1
	其他非十大死因	92	255.30	139.75	1.02	25.0		其他非十大死因	55	288.43	185.66	1.13	24.8		其他非十大死因	34	200.39	80.96	0.67*	23.3
11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	13.88	4.52	2.00	1.4	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	15.73	7.88	0.67	1.4	11	蓄意自我傷害(自殺)	2	11.79	7.90	1.22	1.4
12	結核病	4	11.10	5.21	1.81	1.1	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	15.73	7.16	2.84	1.4	12	慢性肝病及肝硬化	2	11.79	3.42	0.64	1.4
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	11.10	5.05	1.62	1.1	13	皮膚及皮下組織疾病	2	10.49	6.78	3.96	0.9	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	11.79	3.11	1.36	1.4
14	高血壓性疾病	4	11.10	5.02*-	0.32*	1.1	14	高血壓性疾病	2	10.49	6.15*-	0.35	0.9	14	高血壓性疾病	2	11.79	2.45*-	0.29	1.4
15	胃及十二指腸潰瘍	4	11.10	4.81	2.24	1.1	15	源於周產期的特定病況	1	5.24	13.24	3.03	0.5	15	源於周產期的特定病況	1	5.89	13.43	3.75	0.7

附 註：1. 彰化縣芳苑鄉年中人口數 計36,036人 男性19,069人 女性16,967人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣大城鄉主要死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	220	1,170.96	518.44	1.09	100.0		所有死亡原因	121	1,186.74	661.99	1.07	100.0		所有死亡原因	99	1,152.23	361.41	1.11	100.0
	十大主要死因	170	904.83	390.00	1.11	77.3		十大主要死因	97	951.35	528.89	1.15	80.2		十大主要死因	75	872.91	261.76	1.14	75.8
1	惡性腫瘤	68	361.93	173.77	1.24	30.9	1	惡性腫瘤	47	460.97	247.10	1.31	38.8	1	惡性腫瘤	21	244.41	103.86	1.09	21.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	28	149.03	54.10	1.10	12.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	147.12	76.18	1.14	12.4	2	腦血管疾病	13	151.30	38.47	1.70	13.1
3	腦血管疾病	20	106.45	37.35	1.35	9.1	3	事故傷害	9	88.27	57.17	1.60	7.4	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	151.30	37.49	1.03	13.1
4	糖尿病	12	63.87	21.50	0.99	5.5	4	腦血管疾病	7	68.65	38.61	0.96	5.8	4	糖尿病	8	93.11	25.53	1.15	8.1
5	事故傷害	11	58.55	36.28	1.43	5.0	5	慢性肝病及肝硬化	5	49.04	31.61	1.36	4.1	5	肺炎	6	69.83	15.63	0.96	6.1
6	肺炎	8	42.58	13.93*-	0.61	3.6	6	糖尿病	4	39.23	22.19	0.76	3.3	6	慢性下呼吸道疾病	4	46.55	11.10	1.52	4.0
7	慢性肝病及肝硬化	7	37.26	20.35	1.35	3.2	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	29.42	15.72	1.22	2.5	7	衰老/老邁	3	34.92	7.21	1.12	3.0
8	慢性下呼吸道疾病	7	37.26	13.72	0.72	3.2	8	慢性下呼吸道疾病	3	29.42	14.85	0.44	2.5	8	高血壓性疾病	3	34.92	7.21	0.80	3.0
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	26.61	12.12	0.82	2.3	9	敗血症	2	19.62	13.53	1.05	1.7	9	事故傷害	2	23.28	9.52	0.88	2.0
10	衰老/老邁	4	21.29	6.88	0.98	1.8	10	蓄意自我傷害(自殺)	2	19.62	11.92	0.90	1.7	10	慢性肝病及肝硬化	2	23.28	5.73	1.13	2.0
	其他非十大死因	50	266.13	128.44	1.04	22.7		其他非十大死因	24	235.39	133.10	0.82	19.8		其他非十大死因	24	279.33	99.64	1.03	24.2
11	蓄意自我傷害(自殺)	3	15.97	8.53	1.00	1.4	11	病毒性肝炎	2	19.62	10.20	6.17	1.7	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	23.28	4.81*-	0.54	2.0
12	高血壓性疾病	3	15.97	5.16*-	0.44	1.4	12	結核病	2	19.62	9.90	2.47	1.7	12	蓄意自我傷害(自殺)	1	11.64	3.89	1.13	1.0
13	敗血症	2	10.65	5.73	0.52	0.9	13	肺炎	2	19.62	8.27*-	0.30	1.7	13	膽結石及其他膽囊疾患	1	11.64	3.32	4.43	1.0
14	膽結石及其他膽囊疾患	2	10.65	3.51	4.41	0.9	14	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	19.62	8.03	4.05	1.7	14	皮膚及皮下組織疾病	1	11.64	3.32	2.15	1.0
15	結核病	2	10.65	3.51	1.68	0.9	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	9.81	7.75	1.70	0.8	15	貧血	1	11.64	2.69	5.01	1.0

附 註：1. 彰化縣大城鄉年中人口數 計18,788人 男性10,196人 女性8,592人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣竹塘鄉主要死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	156	950.18	467.91	0.95	100.0		所有死亡原因	92	1,065.93	621.23	1.00	100.0		所有死亡原因	64	821.99	339.46	0.88	100.0
	十大主要死因	122	743.09	378.09	0.99	78.2		十大主要死因	75	868.96	514.58	1.10	81.5		十大主要死因	52	667.87	285.15	0.98	81.3
1	惡性腫瘤	46	280.18	147.59	1.01	29.5	1	惡性腫瘤	29	336.00	186.16	0.99	31.5	1	惡性腫瘤	17	218.34	121.26	1.07	26.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	26	158.36	71.95	1.25	16.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	162.21	88.17	1.30	15.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	154.12	67.33	1.18	18.8
3	腦血管疾病	9	54.82	23.04	0.74	5.8	3	慢性下呼吸道疾病	7	81.10	44.04	1.27	7.6	3	腦血管疾病	5	64.22	17.07	0.80	7.8
4	慢性下呼吸道疾病	9	54.82	22.32	1.13	5.8	4	慢性肝病及肝硬化	5	57.93	51.12	1.67	5.4	4	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	51.37	12.64	1.34	6.3
5	慢性肝病及肝硬化	7	42.64	31.25	1.62	4.5	5	事故傷害	5	57.93	38.03	1.10	5.4	5	糖尿病	3	38.53	17.96	0.52	4.7
6	事故傷害	7	42.64	29.47	1.10	4.5	6	蓄意自我傷害(自殺)	4	46.34	36.95	2.28	4.3	6	肺炎	3	38.53	9.73	0.60	4.7
7	肺炎	6	36.55	12.27*-	0.57	3.8	7	腦血管疾病	4	46.34	28.81	0.67	4.3	7	事故傷害	2	25.69	19.00	1.06	3.1
8	蓄意自我傷害(自殺)	4	24.36	21.18	1.63	2.6	8	肺炎	3	34.76	16.64	0.55	3.3	8	敗血症	2	25.69	7.43	1.31	3.1
9	糖尿病	4	24.36	10.71*-	0.40	2.6	9	主動脈瘤及剝離	2	23.17	12.66	4.36	2.2	9	慢性肝病及肝硬化	2	25.69	6.72	1.34	3.1
10	敗血症	4	24.36	8.31	1.27	2.6	10	敗血症	2	23.17	11.99	1.27	2.2	10	慢性下呼吸道疾病	2	25.69	6.01	0.96	3.1
	其他非十大死因	34	207.09	89.82	0.81	21.8		其他非十大死因	17	196.96	106.65*-	0.70	18.5		其他非十大死因	12	154.12	54.31*-	0.62	18.8
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	24.36	8.25	0.81	2.6	11	流行性感冒	1	11.59	7.06	16.84	1.1	11	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	12.84	7.83	14.13	1.6
12	主動脈瘤及剝離	2	12.18	4.82	2.71	1.3	12	腦膜炎	1	11.59	4.93	18.63	1.1	12	疝氣及腸阻塞	1	12.84	4.72	3.56	1.6
13	疝氣及腸阻塞	2	12.18	4.43	3.95	1.3	13	疝氣及腸阻塞	1	11.59	4.93	4.31	1.1	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	12.84	4.72	1.78	1.6
14	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	6.09	3.78	6.86	0.6	14	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	11.59	4.93	2.44	1.1	14	結核病	1	12.84	3.31	3.67	1.6
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	6.09	2.56	0.87	0.6	15	衰老/老邁	1	11.59	4.93	0.85	1.1	15	高血壓性疾病	1	12.84	3.31*-	0.34	1.6

附 註：1. 彰化縣竹塘鄉年中人口數 計16,418人 男性8,631人 女性7,786人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣溪州鄉主要死亡原因

民國100年(2011年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	306	973.31	537.84	1.08	100.0		所有死亡原因	193	1,165.04	753.83*+	1.18*	100.0		所有死亡原因	113	759.77	320.16	0.94	100.0
	十大主要死因	240	763.38	420.67*+	1.09	78.4		十大主要死因	160	965.83	620.14*+	1.25*	82.9		十大主要死因	81	544.61	232.89	0.93	71.7
1	惡性腫瘤	67	213.11	130.89	0.85	21.9	1	惡性腫瘤	46	277.68	180.37	0.90	23.8	1	惡性腫瘤	21	141.20	83.59	0.77	18.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	32	101.78	46.92	0.90	10.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	108.66	66.72	0.95	9.3	2	腦血管疾病	15	100.85	30.80	1.46	13.3
3	肺炎	26	82.70	36.48	1.46	8.5	3	肺炎	18	108.66	60.75	1.90*	9.3	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	94.13	28.29	0.84	12.4
4	腦血管疾病	25	79.52	35.59	1.21	8.2	4	事故傷害	15	90.55	79.07	1.77	7.8	4	肺炎	8	53.79	16.16	0.97	7.1
5	事故傷害	21	66.80	54.32*+	1.81*	6.9	5	慢性肝病及肝硬化	15	90.55	68.87*+	2.75*	7.8	5	事故傷害	6	40.34	29.85	1.84	5.3
6	慢性肝病及肝硬化	17	54.07	41.28*+	2.20*	5.6	6	慢性下呼吸道疾病	14	84.51	47.58	1.48	7.3	6	高血壓性疾病	6	40.34	12.47	1.23	5.3
7	慢性下呼吸道疾病	17	54.07	23.48	1.28	5.6	7	高血壓性疾病	11	66.40	35.14	2.48*	5.7	7	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	20.17	10.64	2.77	2.7
8	高血壓性疾病	17	54.07	22.33	1.83*	5.6	8	腦血管疾病	10	60.36	35.53	0.96	5.2	8	糖尿病	3	20.17	9.51*-	0.32*	2.7
9	糖尿病	12	38.17	21.33	0.72	3.9	9	糖尿病	9	54.33	33.12	1.21	4.7	9	慢性下呼吸道疾病	3	20.17	6.75	0.87	2.7
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	19.08	8.06	0.72	2.0	10	敗血症	4	24.15	12.99	1.45	2.1	10	慢性肝病及肝硬化	2	13.45	4.84	0.80	1.8
	其他非十大死因	66	209.93	117.17	1.03	21.6		其他非十大死因	33	199.20	133.69	0.95	17.1		其他非十大死因	32	215.15	87.27	0.94	28.3
11	敗血症	6	19.08	7.78	1.12	2.0	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	24.15	12.37	1.15	2.1	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	13.45	3.95*-	0.41	1.8
12	蓄意自我傷害(自殺)	3	9.54	7.15	0.66	1.0	12	蓄意自我傷害(自殺)	3	18.11	12.97	0.91	1.6	12	敗血症	2	13.45	3.82	0.78	1.8
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	9.54	6.97	1.52	1.0	13	主動脈瘤及剝離	3	18.11	10.46	3.66	1.6	13	衰老/老邁	2	13.45	3.82	0.58	1.8
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	9.54	5.73	1.57	1.0	14	結核病	2	12.07	7.67	1.73	1.0	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	6.72	6.45	1.06	0.9
15	主動脈瘤及剝離	3	9.54	5.29	2.33	1.0	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	12.07	7.43	1.92	1.0	15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	6.72	2.04	1.81	0.9

附 註：1.彰化縣溪州鄉年中人口數 計31,439人 男性16,566人 女性14,873人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計