

彰化縣彰化市主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	1,524	648.92	397.93*-	0.90*	100.0		所有死亡原因	925	795.99	542.04*-	0.92*	100.0		所有死亡原因	599	504.88	274.75*-	0.89*	100.0
	十大主要死因	1,223	520.76	313.74*-	0.93*	80.2		十大主要死因	752	647.12	432.39*-	0.95	81.3		十大主要死因	472	397.84	215.33*-	0.92	78.8
1	惡性腫瘤	422	179.69	115.44*-	0.87*	27.7	1	惡性腫瘤	261	224.60	155.72*-	0.85*	28.2	1	惡性腫瘤	161	135.70	81.12	0.92	26.9
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	223	94.95	54.57	1.09	14.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	125	107.57	70.69	1.15	13.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	98	82.60	40.46	1.06	16.4
3	肺炎	127	54.08	28.56	1.03	8.3	3	肺炎	80	68.84	41.30	1.08	8.6	3	肺炎	47	39.61	18.92	0.93	7.8
4	糖尿病	93	39.60	23.82	0.99	6.1	4	慢性下呼吸道疾病	58	49.91	30.70	0.95	6.3	4	糖尿病	45	37.93	19.89	0.98	7.5
5	腦血管疾病	82	34.92	19.72*-	0.85	5.4	5	腦血管疾病	50	43.03	28.24	0.96	5.4	5	腦血管疾病	32	26.97	12.36*-	0.74	5.3
6	慢性下呼吸道疾病	79	33.64	18.39	0.99	5.2	6	糖尿病	48	41.31	27.87	1.04	5.2	6	高血壓性疾病	29	24.44	12.93	1.02	4.8
7	事故傷害	57	24.27	17.45*-	0.74*	3.7	7	事故傷害	46	39.58	29.51	0.83	5.0	7	慢性下呼吸道疾病	21	17.70	9.03	1.03	3.5
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	54	22.99	12.98	1.03	3.5	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	35	30.12	19.15	1.27	3.8	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	19	16.01	7.99	0.76	3.2
9	高血壓性疾病	53	22.57	13.21	0.95	3.5	9	慢性肝病及肝硬化	25	21.51	15.87	0.79	2.7	9	事故傷害	11	9.27	6.75*-	0.55*	1.8
10	慢性肝病及肝硬化	33	14.05	9.60*-	0.74	2.2	10	高血壓性疾病	24	20.65	13.35	0.90	2.6	10	蓄意自我傷害(自殺)	9	7.59	5.87	0.78	1.5
	其他非十大死因	301	128.17	84.19*-	0.80*	19.8		其他非十大死因	173	148.87	109.65*-	0.82*	18.7		其他非十大死因	127	107.04	59.42*-	0.78*	21.2
11	敗血症	27	11.50	6.86	0.79	1.8	11	敗血症	21	18.07	11.46	1.00	2.3	11	慢性肝病及肝硬化	8	6.74	3.94	0.73	1.3
12	蓄意自我傷害(自殺)	26	11.07	8.79	0.74	1.7	12	蓄意自我傷害(自殺)	17	14.63	11.83	0.74	1.8	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	8	6.74	3.39	1.04	1.3
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	17	7.24	4.16	1.05	1.1	13	帕金森病	10	8.61	5.19	1.86	1.1	13	敗血症	6	5.06	3.30	0.47	1.0
14	帕金森病	14	5.96	3.09	1.67	0.9	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	9	7.74	5.14	1.04	1.0	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	4.21	2.17	0.68	0.8
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	10	4.26	2.57	0.81	0.7	15	源於周產期的特定病況	5	4.30	7.43	3.00	0.5	15	帕金森病	4	3.37	1.49	1.25	0.7

附 註：1. 彰化縣彰化市年中人口數 計234,850人 男性116,208人 女性118,642人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣鹿港鎮主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	582	672.38	404.92*-	0.92*	100.0		所有死亡原因	345	783.25	543.41	0.93	100.0		所有死亡原因	237	557.50	279.43	0.91	100.0
	十大主要死因	474	547.61	327.50	0.97	81.4		十大主要死因	289	656.12	452.13	1.00	83.8		十大主要死因	190	446.94	223.84	0.98	80.2
1	惡性腫瘤	174	201.02	127.28	0.98	29.9	1	惡性腫瘤	112	254.27	177.70	0.98	32.5	1	惡性腫瘤	62	145.84	83.98	0.97	26.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	78	90.11	53.12	1.02	13.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	47	106.70	73.53	1.18	13.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	31	72.92	31.97	0.84	13.1
3	腦血管疾病	45	51.99	31.86	1.23	7.7	3	慢性下呼吸道疾病	27	61.30	42.84	1.22	7.8	3	腦血管疾病	21	49.40	29.15	1.24	8.9
4	慢性下呼吸道疾病	40	46.21	26.34	1.31	6.9	4	腦血管疾病	24	54.49	35.92	1.23	7.0	4	糖尿病	15	35.28	15.51	0.84	6.3
5	糖尿病	34	39.28	23.45	0.97	5.8	5	事故傷害	20	45.41	33.31	0.96	5.8	5	肺炎	15	35.28	13.71	0.73	6.3
6	肺炎	28	32.35	15.92*-	0.59*	4.8	6	糖尿病	19	43.14	30.93	1.10	5.5	6	慢性下呼吸道疾病	13	30.58	13.38	1.57	5.5
7	事故傷害	21	24.26	16.98*-	0.74	3.6	7	肺炎	13	29.51	17.98*-	0.49*	3.8	7	高血壓性疾病	12	28.23	10.80	1.05	5.1
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	20	23.11	11.58	1.01	3.4	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	27.24	17.13	1.18	3.5	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	18.82	7.73	0.83	3.4
9	高血壓性疾病	19	21.95	11.35	0.90	3.3	9	敗血症	8	18.16	12.28	1.03	2.3	9	敗血症	7	16.47	7.42	1.39	3.0
10	敗血症	15	17.33	9.63	1.17	2.6	10	高血壓性疾病	7	15.89	10.50	0.72	2.0	10	蓄意自我傷害(自殺)	6	14.11	10.18	1.46	2.5
	其他非十大死因	108	124.77	77.42*-	0.74*	18.6		其他非十大死因	56	127.14	91.28*-	0.68*	16.2		其他非十大死因	47	110.56	55.59*-	0.70*	19.8
11	蓄意自我傷害(自殺)	11	12.71	10.02	0.86	1.9	11	慢性肝病及肝硬化	6	13.62	10.25*-	0.50	1.7	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	7.06	3.48	1.00	1.3
12	慢性肝病及肝硬化	8	9.24	6.33*-	0.49*	1.4	12	蓄意自我傷害(自殺)	5	11.35	9.65	0.58	1.4	12	貧血	2	4.70	3.60	3.67	0.8
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	6	6.93	3.74	0.96	1.0	13	主動脈瘤及剝離	3	6.81	4.95	1.25	0.9	13	結核病	2	4.70	2.54	2.26	0.8
14	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	5	5.78	2.76	2.83	0.9	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	6.81	4.21	0.93	0.9	14	慢性肝病及肝硬化	2	4.70	2.45	0.49	0.8
15	結核病	4	4.62	2.94	1.36	0.7	15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	6.81	4.13	3.02	0.9	15	衰老/老邁	2	4.70	1.98	0.51	0.8

附 註：1. 彰化縣鹿港鎮年中人口數 計86,558人 男性44,047人 女性42,511人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣和美鎮主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	579	635.30	425.71	0.95	100.0		所有死亡原因	342	735.45	563.62	0.96	100.0		所有死亡原因	237	530.96	297.68	0.96	100.0
	十大主要死因	470	515.70	344.70	1.00	81.2		十大主要死因	277	595.67	454.18	0.98	81.0		十大主要死因	196	439.11	242.90	1.06	82.7
1	惡性腫瘤	179	196.41	137.74	1.02	30.9	1	惡性腫瘤	116	249.45	191.40	1.04	33.9	1	惡性腫瘤	63	141.14	88.65	1.01	26.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	58	63.64	40.51	0.80	10.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	32	68.81	51.10	0.83	9.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	26	58.25	29.25	0.76	11.0
3	肺炎	46	50.47	32.15	1.06	7.9	3	肺炎	27	58.06	44.13	1.10	7.9	3	糖尿病	24	53.77	29.83	1.45	10.1
4	糖尿病	45	49.38	32.52	1.35	7.8	4	糖尿病	21	45.16	33.26	1.26	6.1	4	肺炎	19	42.57	23.01	1.01	8.0
5	腦血管疾病	33	36.21	22.04	0.96	5.7	5	慢性下呼吸道疾病	19	40.86	31.80	0.93	5.6	5	腦血管疾病	19	42.57	19.61	1.21	8.0
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	30	32.92	20.74*+	1.61*	5.2	6	事故傷害	19	40.86	31.78	0.89	5.6	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	18	40.33	20.67	2.00*	7.6
7	事故傷害	26	28.53	21.06	0.90	4.5	7	腦血管疾病	14	30.11	22.93	0.76	4.1	7	事故傷害	7	15.68	10.28	0.96	3.0
8	慢性下呼吸道疾病	25	27.43	17.43	0.89	4.3	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	25.81	19.45	1.26	3.5	8	高血壓性疾病	7	15.68	7.53	0.67	3.0
9	高血壓性疾病	15	16.46	9.73	0.76	2.6	9	慢性肝病及肝硬化	9	19.35	15.84	0.73	2.6	9	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	7	15.68	7.01	2.61*	3.0
10	慢性肝病及肝硬化	13	14.26	10.80	0.79	2.2	10	高血壓性疾病	8	17.20	12.51	0.87	2.3	10	慢性下呼吸道疾病	6	13.44	7.05	0.79	2.5
	其他非十大死因	109	119.60	81.01*+	0.80*	18.8		其他非十大死因	65	139.78	109.44	0.86	19.0		其他非十大死因	41	91.85	54.79*+	0.66*	17.3
11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	11	12.07	7.90	2.46*	1.9	11	衰老/老邁	6	12.90	10.81	1.56	1.8	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	11.20	5.05	1.81	2.1
12	敗血症	9	9.88	6.34	0.74	1.6	12	蓄意自我傷害(自殺)	6	12.90	10.41	0.65	1.8	12	慢性肝病及肝硬化	4	8.96	5.77	1.02	1.7
13	衰老/老邁	8	8.78	5.67	1.07	1.4	13	敗血症	5	10.75	8.32	0.68	1.5	13	敗血症	4	8.96	5.12	0.85	1.7
14	蓄意自我傷害(自殺)	7	7.68	5.84*+	0.52	1.2	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	8.60	7.43	2.22	1.2	14	貧血	3	6.72	3.34	5.50*	1.3
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	7	7.68	4.43	1.22	1.2	15	結核病	3	6.45	4.56	1.61	0.9	15	血管性及未明示之癱瘓症	3	6.72	3.13	1.35	1.3

附 註：1. 彰化縣和美鎮年中人口數 計91,138人 男性46,502人 女性44,636人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣北斗鎮主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	258	776.20	435.24	0.98	100.0		所有死亡原因	144	858.73	561.06	0.94	100.0		所有死亡原因	114	692.17	319.65	1.05	100.0
	十大主要死因	214	643.82	363.23	1.05	82.9		十大主要死因	124	739.46	484.54	1.03	86.1		十大主要死因	94	570.73	268.60	1.17	82.5
1	惡性腫瘤	67	201.57	121.52	0.90	26.0	1	惡性腫瘤	42	250.46	162.25	0.89	29.2	1	惡性腫瘤	25	151.79	88.91	0.93	21.9
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	30	90.26	47.26	0.94	11.6	2	糖尿病	13	77.52	52.31	1.80	9.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	17	103.22	45.07	1.11	14.9
3	糖尿病	28	84.24	46.65*+	1.90*	10.9	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	77.52	49.01	0.79	9.0	3	糖尿病	15	91.07	40.33	2.00*	13.2
4	高血壓性疾病	19	57.16	28.15*+	2.15*	7.4	4	慢性下呼吸道疾病	11	65.60	42.41	1.19	7.6	4	高血壓性疾病	11	66.79	25.03	2.31*	9.6
5	慢性下呼吸道疾病	17	51.14	27.62	1.33	6.6	5	肺炎	11	65.60	38.96	0.99	7.6	5	慢性下呼吸道疾病	6	36.43	12.87	1.74	5.3
6	肺炎	17	51.14	24.40	0.87	6.6	6	腦血管疾病	9	53.67	32.37	1.11	6.3	6	肺炎	6	36.43	12.87	0.71	5.3
7	腦血管疾病	13	39.11	19.70	0.85	5.0	7	事故傷害	8	47.71	41.28	0.96	5.6	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	30.36	14.90	1.23	4.4
8	事故傷害	9	27.08	21.85	0.78	3.5	8	高血壓性疾病	8	47.71	29.55	1.98	5.6	8	腦血管疾病	4	24.29	10.69	0.57	3.5
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	24.07	13.17	0.96	3.1	9	敗血症	5	29.82	18.31	1.54	3.5	9	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	18.21	10.23	2.53	2.6
10	慢性肝病及肝硬化	6	18.05	12.90	0.90	2.3	10	慢性肝病及肝硬化	4	23.85	18.09	0.82	2.8	10	慢性肝病及肝硬化	2	12.14	7.70	1.16	1.8
	其他非十大死因	44	132.37	72.01*-	0.75	17.1		其他非十大死因	20	119.27	76.52*-	0.61*	13.9		其他非十大死因	20	121.43	51.05*-	0.70	17.5
11	敗血症	5	15.04	8.16	0.93	1.9	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	17.89	10.82	0.71	2.1	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	12.14	5.97	1.58	1.8
12	蓄意自我傷害(自殺)	3	9.03	6.77	0.59	1.2	12	蓄意自我傷害(自殺)	2	11.93	10.67	0.59	1.4	12	血管性及未明示之癱呆症	2	12.14	4.47	1.97	1.8
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	9.03	5.30	1.54	1.2	13	流行性感冒	2	11.93	7.84	3.58	1.4	13	蓄意自我傷害(自殺)	1	6.07	2.24*-	0.60	0.9
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	9.03	4.60	1.14	1.2	14	帕金森病	2	11.93	7.71	2.41	1.4	14	事故傷害	1	6.07	2.24*-	0.33	0.9
15	流行性感冒	2	6.02	3.94	2.60	0.8	15	皮膚及皮下組織疾病	2	11.93	6.68	3.47	1.4							

附 註：1. 彰化縣北斗鎮年中人口數 計33,239人 男性16,769人 女性16,470人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣員林市主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	882	706.26	449.97	0.99	100.0		所有死亡原因	507	815.64	578.45	0.97	100.0		所有死亡原因	375	597.86	334.84	1.04	100.0
	十大主要死因	714	571.73	360.86	1.04	81.0		十大主要死因	411	661.20	468.08	1.00	81.1		十大主要死因	304	484.66	268.35	1.12	81.1
1	惡性腫瘤	283	226.61	151.87	1.10	32.1	1	惡性腫瘤	169	271.88	194.74	1.04	33.3	1	惡性腫瘤	114	181.75	115.16*+	1.24*	30.4
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	97	77.67	44.46	0.91	11.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	45	72.39	48.83	0.80	8.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	52	82.90	39.12	1.05	13.9
3	肺炎	62	49.65	28.57	0.97	7.0	3	肺炎	34	54.70	37.29	0.92	6.7	3	肺炎	28	44.64	21.11	1.03	7.5
4	糖尿病	56	44.84	27.91	1.13	6.3	4	慢性下呼吸道疾病	31	49.87	31.52	1.01	6.1	4	糖尿病	26	41.45	21.39	1.06	6.9
5	腦血管疾病	53	42.44	25.24	1.05	6.0	5	糖尿病	30	48.26	34.36	1.22	5.9	5	腦血管疾病	23	36.67	18.29	1.00	6.1
6	慢性下呼吸道疾病	44	35.23	19.12	1.06	5.0	6	腦血管疾病	30	48.26	32.74	1.10	5.9	6	高血壓性疾病	18	28.70	13.34	1.19	4.8
7	高血壓性疾病	35	28.03	16.59	1.21	4.0	7	事故傷害	25	40.22	33.43	0.84	4.9	7	慢性下呼吸道疾病	13	20.73	10.45	1.19	3.5
8	事故傷害	33	26.42	21.64	0.81	3.7	8	慢性肝病及肝硬化	18	28.96	19.83	1.05	3.6	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	19.13	10.52	0.91	3.2
9	慢性肝病及肝硬化	28	22.42	14.50	1.19	3.2	9	高血壓性疾病	17	27.35	19.30	1.24	3.4	9	慢性肝病及肝硬化	10	15.94	9.44	1.72	2.7
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	23	18.42	10.95	0.84	2.6	10	蓄意自我傷害(自殺)	12	19.31	16.03	0.98	2.4	10	事故傷害	8	12.75	9.54	0.75	2.1
	其他非十大死因	168	134.52	89.10	0.85*	19.0		其他非十大死因	96	154.44	110.38	0.87	18.9		其他非十大死因	71	113.19	66.49	0.81	18.9
11	蓄意自我傷害(自殺)	19	15.21	12.59	1.02	2.2	11	敗血症	11	17.70	12.46	1.01	2.2	11	敗血症	8	12.75	7.37	1.16	2.1
12	敗血症	19	15.21	9.44	1.07	2.2	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	17.70	11.70	0.78	2.2	12	蓄意自我傷害(自殺)	7	11.16	9.40	1.15	1.9
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	8	6.41	4.02	0.94	0.9	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	8	12.87	8.95	1.80	1.6	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	7.97	4.63	1.29	1.3
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	6	4.80	2.95	0.92	0.7	14	疝氣及腸阻塞	4	6.44	4.82	2.26	0.8	14	貧血	2	3.19	2.11	2.52	0.5
15	主動脈瘤及剝離	5	4.00	2.66	1.04	0.6	15	主動脈瘤及剝離	3	4.83	3.68	0.90	0.6	15	皮膚及皮下組織疾病	2	3.19	1.89	1.05	0.5

附 註：1.彰化縣員林市中人口數 計124,884人 男性62,160人 女性62,724人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣溪湖鎮主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	445	798.81	469.71	1.05	100.0		所有死亡原因	257	907.29	623.85	1.07	100.0		所有死亡原因	188	686.58	335.71	1.04	100.0
	十大主要死因	349	626.48	374.80	1.08	78.4		十大主要死因	209	737.84	510.81	1.11	81.3		十大主要死因	143	522.24	262.53	1.05	76.1
1	惡性腫瘤	140	251.31	159.60	1.20*	31.5	1	惡性腫瘤	97	342.44	234.75*+	1.31*	37.7	1	惡性腫瘤	43	157.04	94.43	1.01	22.9
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	52	93.34	51.35	1.00	11.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	26	91.79	61.21	1.01	10.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	26	94.95	44.15	0.99	13.8
3	肺炎	38	68.21	30.84	1.17	8.5	3	肺炎	17	60.02	38.23	0.98	6.6	3	肺炎	21	76.69	25.51	1.42	11.2
4	腦血管疾病	22	39.49	24.95	0.90	4.9	4	慢性下呼吸道疾病	14	49.42	31.29	0.97	5.4	4	腦血管疾病	11	40.17	19.23	0.93	5.9
5	慢性下呼吸道疾病	22	39.49	19.86	1.05	4.9	5	糖尿病	13	45.89	29.42	1.17	5.1	5	高血壓性疾病	9	32.87	13.59	1.10	4.8
6	糖尿病	21	37.70	20.54	0.90	4.7	6	事故傷害	12	42.36	35.57	0.89	4.7	6	糖尿病	8	29.22	13.16	0.65	4.3
7	事故傷害	19	34.11	27.16	1.03	4.3	7	腦血管疾病	11	38.83	29.13	0.87	4.3	7	慢性下呼吸道疾病	8	29.22	13.05	1.34	4.3
8	慢性肝病及肝硬化	14	25.13	17.17	1.33	3.1	8	慢性肝病及肝硬化	9	31.77	24.06	1.17	3.5	8	事故傷害	7	25.56	19.21	1.44	3.7
9	高血壓性疾病	13	23.34	12.47	0.90	2.9	9	蓄意自我傷害(自殺)	6	21.18	16.79	1.08	2.3	9	慢性肝病及肝硬化	5	18.26	10.11	1.83	2.7
10	蓄意自我傷害(自殺)	8	14.36	10.86	0.97	1.8	10	高血壓性疾病	4	14.12	10.36	0.63	1.6	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	18.26	10.10	0.76	2.7
	其他非十大死因	96	172.33	94.91	0.95	21.6		其他非十大死因	48	169.46	113.04	0.93	18.7		其他非十大死因	45	164.34	73.17	0.99	23.9
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	14.36	8.54	0.60	1.8	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	14.12	9.16	1.92	1.6	11	衰老/老邁	4	14.61	4.11	1.36	2.1
12	衰老/老邁	8	14.36	6.14	1.38	1.8	12	敗血症	4	14.12	9.14	0.80	1.6	12	血管性及未明示之癱瘓症	3	10.96	4.84	1.66	1.6
13	敗血症	7	12.57	7.19	0.81	1.6	13	衰老/老邁	4	14.12	8.32	1.42	1.6	13	敗血症	3	10.96	4.84	0.83	1.6
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	8.98	4.81	1.20	1.1	14	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	10.59	7.05*-	0.46	1.2	14	蓄意自我傷害(自殺)	2	7.30	5.06	0.75	1.1
15	血管性及未明示之癱瘓症	5	8.98	4.38	1.84	1.1	15	主動脈瘤及剝離	3	10.59	7.02	1.94	1.2	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	7.30	4.31	1.02	1.1

附 註：1.彰化縣溪湖鎮年中人口數 計55,708人 男性28,326人 女性27,382人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣田中鎮主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	445	1,051.49	470.34	1.10	100.0		所有死亡原因	274	1,252.97	592.19	1.06	100.0		所有死亡原因	171	836.02	345.90	1.11	100.0
	十大主要死因	342	808.11	361.01	1.09	76.9		十大主要死因	212	969.45	450.09	1.04	77.4		十大主要死因	133	650.24	274.45	1.15	77.8
1	惡性腫瘤	84	198.48	102.69*-	0.77*	18.9	1	肺炎	52	237.79	89.66*+	2.32*	19.0	1	惡性腫瘤	34	166.23	86.48	0.93	19.9
2	肺炎	63	148.86	54.03*+	1.90*	14.2	2	惡性腫瘤	50	228.64	118.55*-	0.67*	18.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	102.67	44.70	0.95	12.3
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	43	101.60	48.15	0.84	9.7	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	22	100.60	51.68	0.77	8.0	3	腦血管疾病	18	88.00	30.26	1.79*	10.5
4	腦血管疾病	35	82.70	34.22	1.47*	7.9	4	慢性下呼吸道疾病	19	86.88	31.32	1.05	6.9	4	糖尿病	12	58.67	26.29	1.12	7.0
5	慢性下呼吸道疾病	28	66.16	22.47	1.32	6.3	5	腦血管疾病	17	77.74	37.35	1.22	6.2	5	肺炎	11	53.78	18.98	0.89	6.4
6	糖尿病	24	56.71	25.46	1.06	5.4	6	糖尿病	12	54.87	24.90	1.04	4.4	6	高血壓性疾病	10	48.89	18.43	1.45	5.8
7	高血壓性疾病	22	51.98	19.82	1.53	4.9	7	高血壓性疾病	12	54.87	21.13	1.63	4.4	7	慢性下呼吸道疾病	9	44.00	13.27	1.78	5.3
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	16	37.81	14.46	1.22	3.6	8	慢性肝病及肝硬化	10	45.73	30.59	1.44	3.6	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	34.22	11.68	1.22	4.1
9	事故傷害	15	35.44	22.28	0.94	3.4	9	事故傷害	9	41.16	27.55	0.73	3.3	9	事故傷害	6	29.33	16.92	1.48	3.5
10	慢性肝病及肝硬化	12	28.35	17.42	1.29	2.7	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	41.16	17.35	1.18	3.3	10	血管性及未明示之癱瘓症	5	24.45	7.44	3.32*	2.9
	其他非十大死因	103	243.38	109.33	1.11	23.1		其他非十大死因	62	283.52	142.10	1.11	22.6		其他非十大死因	38	185.78	71.45	0.97	22.2
11	血管性及未明示之癱瘓症	10	23.63	7.72*+	3.53*	2.2	11	血管性及未明示之癱瘓症	5	22.86	8.21	3.93*	1.8	11	衰老/老邁	4	19.56	7.22	1.63	2.3
12	衰老/老邁	7	16.54	6.25	1.15	1.6	12	蓄意自我傷害(自殺)	3	13.72	12.14	0.64	1.1	12	皮膚及皮下組織疾病	3	14.67	5.87	3.67	1.8
13	蓄意自我傷害(自殺)	4	9.45	7.34	0.59	0.9	13	衰老/老邁	3	13.72	5.70	0.78	1.1	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	9.78	3.63	1.12	1.2
14	皮膚及皮下組織疾病	4	9.45	3.88	2.23	0.9	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	9.15	5.67	1.68	0.7	14	慢性肝病及肝硬化	2	9.78	3.28	0.84	1.2
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	9.45	3.67	0.97	0.9	15	結核病	2	9.15	4.24	1.13	0.7	15	帕金森病	2	9.78	2.91	2.67	1.2

附 註：1. 彰化縣田中鎮年中人口數 計42,321人 男性21,868人 女性20,454人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣二林鎮主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	516	998.09	466.01	1.00	100.0		所有死亡原因	288	1,081.00	618.74	1.01	100.0		所有死亡原因	228	909.89	312.22	1.00	100.0
	十大主要死因	399	771.78	369.64	1.02	77.3		十大主要死因	235	882.07	508.72	1.05	81.6		十大主要死因	167	666.45	247.54	1.05	73.2
1	惡性腫瘤	139	268.86	137.31	1.01	26.9	1	惡性腫瘤	86	322.80	182.97	1.00	29.9	1	惡性腫瘤	53	211.51	93.94	1.04	23.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	84	162.48	70.76*+	1.30*	16.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	43	161.40	91.91*+	1.39*	14.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	41	163.62	46.01	1.21	18.0
3	肺炎	39	75.44	26.89	0.92	7.6	3	事故傷害	17	63.81	55.73	1.18	5.9	3	肺炎	22	87.80	24.23	1.13	9.6
4	腦血管疾病	27	52.23	23.48	0.88	5.2	4	肺炎	17	63.81	30.51	0.77	5.9	4	腦血管疾病	12	47.89	13.30	0.79	5.3
5	事故傷害	24	46.42	36.95	1.21	4.7	5	腦血管疾病	15	56.30	32.20	0.98	5.2	5	糖尿病	11	43.90	14.30	0.69	4.8
6	糖尿病	22	42.55	19.79	0.76	4.3	6	慢性肝病及肝硬化	14	52.55	32.83	1.65	4.9	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	31.93	10.93	0.94	3.5
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	19	36.75	15.58	1.14	3.7	7	慢性下呼吸道疾病	14	52.55	24.72	0.76	4.9	7	事故傷害	7	27.94	18.83	1.27	3.1
8	慢性下呼吸道疾病	17	32.88	11.69*-	0.63	3.3	8	糖尿病	11	41.29	23.95	0.83	3.8	8	敗血症	5	19.95	5.47	1.08	2.2
9	慢性肝病及肝硬化	16	30.95	18.32	1.37	3.1	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	41.29	21.02	1.36	3.8	9	蓄意自我傷害(自殺)	4	15.96	13.50	1.46	1.8
10	敗血症	12	23.21	8.87	1.10	2.3	10	敗血症	7	26.27	12.89	1.13	2.4	10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	15.96	7.04	1.62	1.8
	其他非十大死因	117	226.31	96.37	0.94	22.7		其他非十大死因	53	198.93	110.02	0.87	18.4		其他非十大死因	61	243.44	64.68	0.87	26.8
11	蓄意自我傷害(自殺)	8	15.47	12.66	0.97	1.6	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	18.77	9.75	1.91	1.7	11	高血壓性疾病	4	15.96	3.67*-	0.37*	1.8
12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	8	15.47	6.30	1.49	1.6	12	蓄意自我傷害(自殺)	4	15.01	12.10	0.72	1.4	12	皮膚及皮下組織疾病	3	11.97	3.55	2.46	1.3
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	7	13.54	6.23	1.85	1.4	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	11.26	5.53	2.17	1.0	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	11.97	3.23	1.12	1.3
14	高血壓性疾病	6	11.61	3.34*-	0.33*	1.2	14	結核病	3	11.26	4.88	1.76	1.0	14	慢性下呼吸道疾病	3	11.97	2.90*-	0.38	1.3
15	皮膚及皮下組織疾病	5	9.67	4.06	2.19	1.0	15	皮膚及皮下組織疾病	2	7.51	4.10	1.87	0.7	15	慢性肝病及肝硬化	2	7.98	2.16*-	0.59	0.9

附 註：1. 彰化縣二林鎮年中人口數 計51,699人 男性26,642人 女性25,058人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣線西鄉主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	155	912.30	553.27*+	1.19*	100.0		所有死亡原因	90	1,025.17	699.30	1.13	100.0		所有死亡原因	65	791.72	387.56	1.26	100.0
	十大主要死因	119	700.41	411.49	1.21	76.8		十大主要死因	69	785.97	521.02	1.15	76.7		十大主要死因	52	633.37	282.68	1.37*	80.0
1	惡性腫瘤	41	241.32	141.38	1.13	26.5	1	惡性腫瘤	27	307.55	194.75	1.11	30.0	1	惡性腫瘤	14	170.52	80.75	1.12	21.5
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	22	129.49	73.00	1.38	14.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	8	91.13	63.35	0.93	8.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	170.52	77.86	1.91*	21.5
3	腦血管疾病	9	52.97	31.21	1.19	5.8	3	蓄意自我傷害(自殺)	6	68.34	54.50	3.36*	6.7	3	糖尿病	5	60.90	28.64	1.41	7.7
4	肺炎	8	47.09	22.29	0.81	5.2	4	腦血管疾病	6	68.34	46.19	1.42	6.7	4	高血壓性疾病	4	48.72	16.59	1.75	6.2
5	蓄意自我傷害(自殺)	7	41.20	35.11	2.71*	4.5	5	肺炎	6	68.34	37.96	1.01	6.7	5	事故傷害	3	36.54	23.21	2.09	4.6
6	事故傷害	7	41.20	25.88	1.22	4.5	6	敗血症	4	45.56	36.70	2.36	4.4	6	腦血管疾病	3	36.54	16.62	0.89	4.6
7	糖尿病	7	41.20	25.45	0.97	4.5	7	事故傷害	4	45.56	29.00	0.92	4.4	7	衰老/老邁	3	36.54	11.96	3.77	4.6
8	高血壓性疾病	7	41.20	18.40	1.59	4.5	8	慢性下呼吸道疾病	3	34.17	19.29	0.61	3.3	8	敗血症	2	24.36	10.48	2.00	3.1
9	敗血症	6	35.31	24.63	2.25	3.9	9	高血壓性疾病	3	34.17	18.67	1.41	3.3	9	肺炎	2	24.36	8.61*-	0.49	3.1
10	慢性下呼吸道疾病	5	29.43	14.14	0.78	3.2	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	22.78	20.61	0.90	2.2	10	慢性下呼吸道疾病	2	24.36	7.97	1.20	3.1
	其他非十大死因	36	211.89	141.78	1.14	23.2		其他非十大死因	21	239.21	178.28	1.07	23.3		其他非十大死因	13	158.34	104.88	0.95	20.0
11	衰老/老邁	4	23.54	9.74	2.27	2.6	11	糖尿病	2	22.78	20.34	0.55	2.2	11	先天性畸形變形及染色體異常	1	12.18	21.54	7.57	1.5
12	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	1	12.18	10.15	22.92	0.6	12	慢性肝病及肝硬化	2	22.78	16.57	0.78	2.2	12	蓄意自我傷害(自殺)	1	12.18	13.34	1.23	1.5
13	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	11.77	10.23	0.49	1.3	13	主動脈瘤及剝離	1	11.39	10.94	1.94	1.1	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	12.18	10.16	1.67	1.5
14	慢性肝病及肝硬化	2	11.77	8.31	0.61	1.3	14	流行性感胃	1	11.39	10.30	3.47	1.1	14	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	1	12.18	10.15	22.92	1.5
15	先天性畸形變形及染色體異常	1	5.89	10.57	4.53	0.6	15	加害(他殺)	1	11.39	6.54	8.39	1.1	15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	12.18	3.99	6.54	1.5

附 註：1.彰化縣線西鄉年中人口數 計16,990人 男性8,779人 女性8,210人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣伸港鄉主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	260	710.19	472.39	1.03	100.0		所有死亡原因	145	775.19	581.52	0.97	100.0		所有死亡原因	115	642.28	363.72	1.11	100.0
	十大主要死因	198	540.84	358.08	1.03	76.2		十大主要死因	117	625.50	464.25	1.00	80.7		十大主要死因	88	491.48	269.15	1.20	76.5
1	惡性腫瘤	67	183.01	130.32	0.94	25.8	1	惡性腫瘤	39	208.50	154.32	0.85	26.9	1	惡性腫瘤	28	156.38	110.59	1.10	24.3
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	30	81.94	46.17	0.98	11.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	74.85	53.23	0.88	9.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	89.36	37.52	1.10	13.9
3	事故傷害	22	60.09	45.16*+	1.88*	8.5	3	事故傷害	13	69.50	58.56	1.49	9.0	3	事故傷害	9	50.27	29.62	3.01*	7.8
4	糖尿病	17	46.44	26.59	1.22	6.5	4	蓄意自我傷害(自殺)	10	53.46	39.28	2.71*	6.9	4	肺炎	8	44.68	22.07	0.99	7.0
5	肺炎	13	35.51	20.63	0.70	5.0	5	糖尿病	9	48.12	32.72	1.30	6.2	5	糖尿病	8	44.68	19.22	1.13	7.0
6	蓄意自我傷害(自殺)	11	30.05	21.79	2.03*	4.2	6	慢性下呼吸道疾病	8	42.77	30.98	0.92	5.5	6	敗血症	5	27.93	12.47	2.52	4.3
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	27.31	17.60	1.28	3.8	7	腦血管疾病	7	37.42	26.10	0.90	4.8	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	22.34	11.72	1.06	3.5
8	腦血管疾病	10	27.31	16.16	0.69	3.8	8	慢性肝病及肝硬化	6	32.08	26.89	1.20	4.1	8	血管性及未明示之癱瘓症	4	22.34	8.51	4.15*	3.5
9	慢性肝病及肝硬化	9	24.58	18.80	1.36	3.5	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	32.08	23.00	1.49	4.1	9	慢性肝病及肝硬化	3	16.76	10.33	1.86	2.6
10	慢性下呼吸道疾病	9	24.58	14.85	0.75	3.5	10	肺炎	5	26.73	19.17*-	0.48	3.4	10	腦血管疾病	3	16.76	7.10*-	0.45	2.6
	其他非十大死因	62	169.35	114.32	1.03	23.8		其他非十大死因	28	149.69	117.27	0.89	19.3		其他非十大死因	27	150.80	94.57	0.89	23.5
11	敗血症	7	19.12	10.68	1.37	2.7	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	21.38	17.34	3.14	2.8	11	先天性畸形變形及染色體異常	2	11.17	14.86	6.67	1.7
12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	6	16.39	12.74	2.44	2.3	12	主動脈瘤及剝離	4	21.38	15.49	4.11*	2.8	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	11.17	8.87	1.69	1.7
13	主動脈瘤及剝離	4	10.93	7.35	2.89	1.5	13	高血壓性疾病	3	16.04	12.02	0.78	2.1	13	腦膜炎	1	5.59	4.20	36.15	0.9
14	高血壓性疾病	4	10.93	6.98	0.48	1.5	14	敗血症	2	10.69	7.17	0.65	1.4	14	蓄意自我傷害(自殺)	1	5.59	4.20	0.58	0.9
15	血管性及未明示之癱瘓症	4	10.93	5.31	2.62	1.5	15	嬰兒猝死症候群(SIDS)	1	5.35	8.67	31.41	0.7	15	高血壓性疾病	1	5.59	3.15*-	0.22	0.9

附 註：1.彰化縣伸港鄉年中人口數 計36,610人 男性18,705人 女性17,905人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣福興鄉主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	385	809.71	449.17	1.01	100.0		所有死亡原因	234	944.50	617.06	1.04	100.0		所有死亡原因	151	663.04	290.19	0.95	100.0
	十大主要死因	307	645.66	351.61	1.07	79.7		十大主要死因	196	791.12	511.90	1.15	83.8		十大主要死因	116	509.35	220.68	1.03	76.8
1	惡性腫瘤	95	199.80	121.84	0.90	24.7	1	惡性腫瘤	67	270.43	181.74	0.98	28.6	1	衰老/老邁	29	127.34	43.46*+	11.30*	19.2
2	衰老/老邁	67	140.91	60.05*+	12.56*	17.4	2	衰老/老邁	38	153.38	85.21*+	13.71*	16.2	2	惡性腫瘤	28	122.95	62.14*-	0.75	18.5
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	27	56.78	30.71*-	0.57*	7.0	3	事故傷害	14	56.51	40.10	1.13	6.0	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	57.08	25.11	0.57*	8.6
4	腦血管疾病	23	48.37	27.05	1.03	6.0	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	56.51	36.15*-	0.58*	6.0	4	肺炎	13	57.08	21.48	1.00	8.6
5	肺炎	23	48.37	20.17	0.77	6.0	5	糖尿病	12	48.44	34.79	1.17	5.1	5	腦血管疾病	11	48.30	22.40	1.05	7.3
6	事故傷害	18	37.86	26.54	1.10	4.7	6	敗血症	12	48.44	32.51*+	2.51*	5.1	6	糖尿病	5	21.95	12.02	0.46	3.3
7	糖尿病	17	35.75	23.43	0.80	4.4	7	腦血管疾病	12	48.44	30.99	1.01	5.1	7	敗血症	5	21.95	6.03	1.59	3.3
8	敗血症	17	35.75	19.19*+	2.16*	4.4	8	慢性下呼吸道疾病	11	44.40	29.06	0.80	4.7	8	事故傷害	4	17.56	13.24	0.94	2.6
9	慢性下呼吸道疾病	12	25.24	14.58	0.63	3.1	9	肺炎	10	40.36	21.13*-	0.60	4.3	9	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	17.56	9.14	2.17	2.6
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	16.83	8.06	0.66	2.1	10	蓄意自我傷害(自殺)	6	24.22	20.21	1.19	2.6	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	17.56	5.65	0.68	2.6
	其他非十大死因	78	164.04	97.55	0.81	20.3		其他非十大死因	38	153.38	105.17*-	0.70*	16.2		其他非十大死因	35	153.68	69.51	0.74	23.2
11	蓄意自我傷害(自殺)	7	14.72	11.88	0.96	1.8	11	慢性肝病及肝硬化	5	20.18	14.98	0.70	2.1	11	高血壓性疾病	3	13.17	6.29	0.42	2.0
12	慢性肝病及肝硬化	7	14.72	9.88	0.75	1.8	12	高血壓性疾病	4	16.15	11.92	0.67	1.7	12	血管性及未明示之癱瘓症	3	13.17	3.62	1.89	2.0
13	高血壓性疾病	7	14.72	9.30	0.53	1.8	13	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	16.15	10.51	0.64	1.7	13	慢性肝病及肝硬化	2	8.78	3.24	0.82	1.3
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	10.52	5.96	1.31	1.3	14	流行性感冒	2	8.07	4.58	2.50	0.9	14	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	4.39	4.47	2.05	0.7
15	血管性及未明示之癱瘓症	3	6.31	2.32	1.19	0.8	15	先天性畸形變形及染色體異常	1	4.04	6.90	3.62	0.4	15	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	4.39	3.06	3.19	0.7

附 註：1. 彰化縣福興鄉年中人口數 計47,548人 男性24,775人 女性22,774人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣秀水鄉主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	266	676.02	409.69	0.93	100.0		所有死亡原因	155	762.65	540.06	0.92	100.0		所有死亡原因	111	583.47	281.85	0.93	100.0
	十大主要死因	205	520.99	320.78	0.95	77.1		十大主要死因	121	595.36	424.25	0.93	78.1		十大主要死因	85	446.80	219.36	0.97	76.6
1	惡性腫瘤	71	180.44	117.72	0.88	26.7	1	惡性腫瘤	48	236.17	170.22	0.92	31.0	1	惡性腫瘤	23	120.90	67.58	0.81	20.7
2	腦血管疾病	23	58.45	35.23	1.39	8.6	2	腦血管疾病	14	68.88	49.62	1.59	9.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	63.08	25.02	0.71	10.8
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	58.45	33.72*-	0.66*	8.6	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	11	54.12	39.33	0.61	7.1	3	肺炎	11	57.82	23.20	1.16	9.9
4	肺炎	21	53.37	28.59	0.97	7.9	4	肺炎	10	49.20	34.52	0.84	6.5	4	腦血管疾病	9	47.31	22.57	1.16	8.1
5	糖尿病	13	33.04	17.93	0.82	4.9	5	事故傷害	9	44.28	33.71	0.93	5.8	5	敗血症	7	36.80	15.37	3.03*	6.3
6	事故傷害	12	30.50	25.40	0.93	4.5	6	糖尿病	7	34.44	22.60	0.90	4.5	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	31.54	14.14	1.38	5.4
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	30.50	17.12	1.34	4.5	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	29.52	19.29	1.31	3.9	7	糖尿病	6	31.54	12.13	0.74	5.4
8	敗血症	12	30.50	16.16	2.06*	4.5	8	慢性下呼吸道疾病	6	29.52	19.00	0.61	3.9	8	蓄意自我傷害(自殺)	4	21.03	14.73	2.16	3.6
9	蓄意自我傷害(自殺)	9	22.87	17.35	1.54	3.4	9	蓄意自我傷害(自殺)	5	24.60	19.51	1.24	3.2	9	高血壓性疾病	4	21.03	7.36	0.76	3.6
10	慢性下呼吸道疾病	9	22.87	11.56	0.65	3.4	10	敗血症	5	24.60	16.45	1.42	3.2	10	事故傷害	3	15.77	17.25	0.92	2.7
	其他非十大死因	61	155.03	88.91	0.87	22.9		其他非十大死因	34	167.29	115.81	0.90	21.9		其他非十大死因	26	136.67	62.49	0.84	23.4
11	高血壓性疾病	8	20.33	9.97	0.83	3.0	11	結核病	4	19.68	13.24	4.40*	2.6	11	慢性肝病及肝硬化	3	15.77	6.14	1.64	2.7
12	慢性肝病及肝硬化	5	12.71	7.83	0.68	1.9	12	高血壓性疾病	4	19.68	12.50	0.91	2.6	12	慢性下呼吸道疾病	3	15.77	5.06	0.78	2.7
13	結核病	4	10.17	5.96	3.00	1.5	13	慢性肝病及肝硬化	2	9.84	7.93*-	0.36	1.3	13	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	5.26	4.49	4.25	0.9
14	主動脈瘤及剝離	3	7.62	6.12	1.92	1.1	14	主動脈瘤及剝離	2	9.84	7.48	1.81	1.3	14	主動脈瘤及剝離	1	5.26	4.44	2.17	0.9
15	腦膜炎	2	5.08	3.63	23.82*	0.8	15	腦膜炎	2	9.84	7.22	36.88*	1.3	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	5.26	2.76	0.73	0.9

附 註：1. 彰化縣秀水鄉年中人口數 計39,348人 男性20,324人 女性19,024人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣花壇鄉主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	341	740.29	455.42	1.02	100.0		所有死亡原因	204	861.78	594.51	1.02	100.0		所有死亡原因	137	611.85	324.33	1.02	100.0
	十大主要死因	260	564.44	353.02	1.04	76.2		十大主要死因	158	667.46	461.53	1.09	77.5		十大主要死因	107	477.87	258.54	1.09	78.1
1	惡性腫瘤	96	208.41	133.35	1.00	28.2	1	惡性腫瘤	61	257.69	176.34	0.98	29.9	1	惡性腫瘤	35	156.31	92.28	1.05	25.5
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	35	75.98	47.18	0.87	10.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	88.71	59.71	0.97	10.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	62.53	36.44	0.75	10.2
3	肺炎	29	62.96	34.79	1.19	8.5	3	肺炎	18	76.04	51.94	1.27	8.8	3	糖尿病	12	53.59	23.17	1.32	8.8
4	糖尿病	23	49.93	28.60	1.25	6.7	4	糖尿病	11	46.47	31.76	1.18	5.4	4	肺炎	11	49.13	19.06	1.07	8.0
5	高血壓性疾病	18	39.08	21.76	1.64	5.3	5	慢性肝病及肝硬化	9	38.02	30.10	1.33	4.4	5	高血壓性疾病	10	44.66	19.25	1.74	7.3
6	事故傷害	15	32.56	21.12	0.98	4.4	6	蓄意自我傷害(自殺)	8	33.80	27.23	1.64	3.9	6	事故傷害	8	35.73	23.55	2.06	5.8
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	26.05	14.36	1.16	3.5	7	高血壓性疾病	8	33.80	22.91	1.53	3.9	7	腦血管疾病	6	26.80	19.15	0.70	4.4
8	蓄意自我傷害(自殺)	11	23.88	18.17	1.55	3.2	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	33.80	22.29	1.47	3.9	8	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	17.86	9.03	2.75	2.9
9	腦血管疾病	11	23.88	17.26	0.58	3.2	9	事故傷害	7	29.57	19.97*-	0.61	3.4	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	17.86	7.83	0.82	2.9
10	慢性肝病及肝硬化	10	21.71	16.42	1.13	2.9	10	敗血症	7	29.57	19.27	1.68	3.4	10	蓄意自我傷害(自殺)	3	13.40	8.76	1.35	2.2
	其他非十大死因	81	175.85	102.39	0.97	23.8		其他非十大死因	46	194.32	132.98	0.83	22.5		其他非十大死因	30	133.98	65.79	0.85	21.9
11	慢性下呼吸道疾病	10	21.71	10.64*-	0.63	2.9	11	慢性下呼吸道疾病	7	29.57	18.43*-	0.60	3.4	11	慢性下呼吸道疾病	3	13.40	4.76	0.72	2.2
12	敗血症	9	19.54	11.61	1.34	2.6	12	腦血管疾病	5	21.12	15.45*-	0.48	2.5	12	敗血症	2	8.93	5.04	0.78	1.5
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	8.68	4.93	1.63	1.2	13	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	8.45	5.24	3.75	1.0	13	皮膚及皮下組織疾病	2	8.93	3.51	2.82	1.5
14	皮膚及皮下組織疾病	3	6.51	3.58	2.05	0.9	14	胃及十二指腸潰瘍	2	8.45	5.15	3.16	1.0	14	主動脈瘤及剝離	1	4.47	3.19	1.91	0.7
15	胃及十二指腸潰瘍	3	6.51	3.07	2.96	0.9	15	源於周產期的特定病況	1	4.22	6.96	2.81	0.5	15	慢性肝病及肝硬化	1	4.47	2.52	0.47	0.7

附 註：1. 彰化縣花壇鄉年中人口數 計46,063人 男性23,672人 女性22,391人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣芬園鄉主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	255	1,065.07	450.23	1.05	100.0		所有死亡原因	148	1,175.35	601.04	1.04	100.0		所有死亡原因	107	942.73	299.10	1.04	100.0
	十大主要死因	207	864.59	367.86	1.13	81.2		十大主要死因	125	992.69	506.28	1.13	84.5		十大主要死因	84	740.09	235.93	1.15	78.5
1	惡性腫瘤	56	233.90	110.76	0.87	22.0	1	惡性腫瘤	42	333.55	175.72	0.99	28.4	1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	176.21	48.44	1.30	18.7
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	41	171.25	62.11	1.34	16.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	166.77	75.72	1.35	14.2	2	惡性腫瘤	14	123.35	46.37*-	0.62	13.1
3	高血壓性疾病	23	96.07	32.96*+	2.64*	9.0	3	慢性下呼吸道疾病	15	119.12	55.14	1.61	10.1	3	高血壓性疾病	12	105.73	30.28	2.48*	11.2
4	慢性下呼吸道疾病	19	79.36	29.36	1.48	7.5	4	高血壓性疾病	11	87.36	36.58*+	2.82*	7.4	4	肺炎	11	96.92	27.23	1.25	10.3
5	糖尿病	18	75.18	35.98	1.34	7.1	5	糖尿病	8	63.53	33.68	1.23	5.4	5	糖尿病	10	88.11	38.26	1.41	9.3
6	肺炎	16	66.83	25.14	0.80	6.3	6	事故傷害	7	55.59	32.61	0.99	4.7	6	腦血管疾病	7	61.67	14.83	1.02	6.5
7	腦血管疾病	13	54.30	19.89	0.90	5.1	7	慢性肝病及肝硬化	6	47.65	30.78	1.45	4.1	7	慢性下呼吸道疾病	4	35.24	9.07	1.11	3.7
8	事故傷害	9	37.59	20.41	0.97	3.5	8	腦血管疾病	6	47.65	23.85	0.78	4.1	8	結核病	2	17.62	8.92	5.37	1.9
9	慢性肝病及肝硬化	7	29.24	18.02	1.28	2.7	9	肺炎	5	39.71	22.05	0.44	3.4	9	事故傷害	2	17.62	7.50	0.81	1.9
10	蓄意自我傷害(自殺)	5	20.88	13.24	1.28	2.0	10	蓄意自我傷害(自殺)	4	31.77	20.16	1.47	2.7	10	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	17.62	5.02	1.70	1.9
	其他非十大死因	48	200.48	82.37	0.80	18.8		其他非十大死因	23	182.66	94.76	0.73	15.5		其他非十大死因	23	202.64	63.17	0.77	21.5
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	20.88	9.16	0.64	2.0	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	23.82	13.88	0.73	2.0	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	17.62	4.10*-	0.53	1.9
12	敗血症	4	16.71	7.48	0.78	1.6	12	敗血症	2	15.88	10.35	0.64	1.4	12	血管性及未明示之癡呆症	2	17.62	3.23	1.81	1.9
13	血管性及未明示之癡呆症	4	16.71	4.50	2.29	1.6	13	疝氣及腸阻塞	2	15.88	9.95	4.06	1.4	13	敗血症	2	17.62	3.23	0.95	1.9
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	12.53	5.46	1.21	1.2	14	血管性及未明示之癡呆症	2	15.88	6.00	3.08	1.4	14	貧血	1	8.81	6.33	4.81	0.9
15	結核病	3	12.53	5.42	2.39	1.2	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	7.94	5.42	0.76	0.7	15	蓄意自我傷害(自殺)	1	8.81	5.34	0.81	0.9

附 註：1. 彰化縣芬園鄉年中人口數 計23,942人 男性12,592人 女性11,350人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣大村鄉主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	296	807.73	469.64	1.06	100.0		所有死亡原因	168	884.58	599.54	1.03	100.0		所有死亡原因	128	725.05	359.88	1.11	100.0
	十大主要死因	205	559.41	337.78	0.95	69.3		十大主要死因	121	637.11	440.44	0.94	72.0		十大主要死因	87	492.81	258.98	1.07	68.0
1	惡性腫瘤	82	223.76	135.67	1.05	27.7	1	惡性腫瘤	52	273.80	188.35	1.03	31.0	1	惡性腫瘤	30	169.93	87.19	1.08	23.4
2	肺炎	28	76.41	40.02	1.34	9.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	63.18	45.30	0.68	7.1	2	肺炎	18	101.96	46.26*+	1.97*	14.1
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	24	65.49	40.11	0.71	8.1	3	慢性下呼吸道疾病	12	63.18	38.16	1.25	7.1	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	67.97	35.42	0.73	9.4
4	慢性下呼吸道疾病	15	40.93	19.00	1.11	5.1	4	肺炎	10	52.65	32.49	0.86	6.0	4	糖尿病	11	62.31	33.51	1.40	8.6
5	糖尿病	14	38.20	23.29	0.91	4.7	5	慢性肝病及肝硬化	9	47.39	34.22	1.64	5.4	5	事故傷害	3	16.99	21.80	0.95	2.3
6	事故傷害	11	30.02	31.37	0.88	3.7	6	事故傷害	8	42.12	40.87	0.86	4.8	6	蓄意自我傷害(自殺)	3	16.99	8.44	1.66	2.3
7	慢性肝病及肝硬化	9	24.56	17.80	1.25	3.0	7	腦血管疾病	7	36.86	24.74	0.82	4.2	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	16.99	8.25	0.71	2.3
8	腦血管疾病	9	24.56	13.29*-	0.56	3.0	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	21.06	12.65	0.90	2.4	8	慢性下呼吸道疾病	3	16.99	5.88	0.81	2.3
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	19.10	9.80	0.80	2.4	9	高血壓性疾病	4	21.06	12.33	0.94	2.4	9	敗血症	2	11.33	7.60	0.90	1.6
10	高血壓性疾病	6	16.37	7.42	0.64	2.0	10	糖尿病	3	15.80	11.33*-	0.40	1.8	10	高血壓性疾病	2	11.33	4.63*-	0.39	1.6
	其他非十大死因	91	248.32	131.86*+	1.45*	30.7		其他非十大死因	47	247.47	159.10	1.37*	28.0		其他非十大死因	41	232.24	100.89	1.21	32.0
11	敗血症	5	13.64	9.07	0.88	1.7	11	敗血症	3	15.80	10.92	0.88	1.8	11	腦血管疾病	2	11.33	4.10*-	0.27*	1.6
12	蓄意自我傷害(自殺)	5	13.64	8.67	0.88	1.7	12	蓄意自我傷害(自殺)	2	10.53	7.99	0.51	1.2	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	5.66	2.85	0.80	0.8
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	8.19	4.55	1.46	1.0	13	膽結石及其他膽囊疾患	2	10.53	6.67	6.56	1.2	13	血管性及未明示之癱瘓症	1	5.66	2.05	0.91	0.8
14	皮膚及皮下組織疾病	2	5.46	3.25	1.63	0.7	14	結核病	2	10.53	6.33	2.26	1.2	14	皮膚及皮下組織疾病	1	5.66	1.78	1.63	0.8
15	膽結石及其他膽囊疾患	2	5.46	2.71	3.50	0.7	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	10.53	6.31	2.45	1.2							

附 註：1. 彰化縣大村鄉年中人口數 計36,646人 男性18,992人 女性17,654人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埔鹽鄉主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	300	912.74	422.08	0.93	100.0		所有死亡原因	170	984.59	545.67	0.92	100.0		所有死亡原因	130	833.23	305.71	0.93	100.0
	十大主要死因	227	690.64	318.62	0.92	75.7		十大主要死因	127	735.55	413.37	0.90	74.7		十大主要死因	103	660.17	243.68	0.98	79.2
1	惡性腫瘤	80	243.40	127.70	0.93	26.7	1	惡性腫瘤	59	341.71	197.35	1.06	34.7	1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	24	153.83	43.65	1.15	18.5
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	35	106.49	44.62	0.86	11.7	2	肺炎	12	69.50	32.59	0.83	7.1	2	惡性腫瘤	21	134.60	63.90	0.69	16.2
3	肺炎	24	73.02	27.74	0.90	8.0	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	11	63.71	40.18	0.55*	6.5	3	肺炎	12	76.91	25.10	1.00	9.2
4	腦血管疾病	18	54.76	23.03	0.94	6.0	4	慢性下呼吸道疾病	9	52.13	24.22	0.75	5.3	4	腦血管疾病	11	70.50	30.39	1.18	8.5
5	糖尿病	14	42.59	18.91	0.78	4.7	5	事故傷害	8	46.33	36.30	0.85	4.7	5	糖尿病	8	51.28	19.78	0.83	6.2
6	慢性下呼吸道疾病	14	42.59	14.65	0.82	4.7	6	腦血管疾病	7	40.54	16.54*-	0.70	4.1	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	44.87	16.67	1.36	5.4
7	事故傷害	12	36.51	29.94	0.95	4.0	7	糖尿病	6	34.75	18.89	0.70	3.5	7	高血壓性疾病	6	38.46	9.01	0.91	4.6
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	30.42	12.44	0.96	3.3	8	敗血症	6	34.75	15.81	1.48	3.5	8	慢性下呼吸道疾病	5	32.05	7.81	1.02	3.8
9	高血壓性疾病	10	30.42	10.88	0.87	3.3	9	衰老/老邁	5	28.96	12.25	2.04	2.9	9	衰老/老邁	5	32.05	6.02	2.04	3.8
10	衰老/老邁	10	30.42	8.72	2.04	3.3	10	蓄意自我傷害(自殺)	4	23.17	19.23	1.09	2.4	10	事故傷害	4	25.64	21.34	1.19	3.1
	其他非十大死因	73	222.10	103.46	0.95	24.3		其他非十大死因	43	249.04	132.31	0.96	25.3		其他非十大死因	27	173.05	62.03	0.77	20.8
11	敗血症	8	24.34	9.52	1.17	2.7	11	慢性肝病及肝硬化	4	23.17	16.53	0.73	2.4	11	血管性及未明示之癱瘓症	3	19.23	4.76	2.00	2.3
12	蓄意自我傷害(自殺)	6	18.25	16.33	1.13	2.0	12	高血壓性疾病	4	23.17	11.34	0.80	2.4	12	蓄意自我傷害(自殺)	2	12.82	13.02	1.19	1.5
13	慢性肝病及肝硬化	5	15.21	10.96	0.69	1.7	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	17.38	9.95	3.32	1.8	13	敗血症	2	12.82	5.86	0.70	1.5
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	12.17	5.86	1.68	1.3	14	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	17.38	8.51	0.57	1.8	14	慢性肝病及肝硬化	1	6.41	4.26	0.49	0.8
15	血管性及未明示之癱瘓症	4	12.17	3.63	1.73	1.3	15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	11.58	6.11	3.81	1.2	15	病毒性肝炎	1	6.41	1.78	5.51	0.8

附 註：1.彰化縣埔鹽鄉年中人口數 計32,868人 男性17,266人 女性15,602人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埔心鄉主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	332	953.75	539.48*+	1.21*	100.0		所有死亡原因	181	1,008.47	671.00	1.12	100.0		所有死亡原因	151	895.45	404.11*+	1.33*	100.0
	十大主要死因	258	741.17	429.03*+	1.24*	77.7		十大主要死因	154	858.03	574.45*+	1.22*	85.1		十大主要死因	113	670.11	311.65*+	1.39*	74.8
1	惡性腫瘤	91	261.42	156.24	1.18	27.4	1	惡性腫瘤	59	328.73	215.41	1.18	32.6	1	惡性腫瘤	32	189.76	101.63	1.18	21.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	44	126.40	63.90	1.31	13.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	128.15	81.42	1.32	12.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	124.53	44.66	1.30	13.9
3	糖尿病	23	66.07	35.53	1.52	6.9	3	慢性下呼吸道疾病	14	78.00	47.77	1.44	7.7	3	腦血管疾病	14	83.02	37.28	1.89*	9.3
4	腦血管疾病	22	63.20	33.61	1.39	6.6	4	肺炎	13	72.43	45.25	1.11	7.2	4	糖尿病	13	77.09	35.19	1.68	8.6
5	肺炎	22	63.20	31.91	1.05	6.6	5	事故傷害	12	66.86	57.33	1.33	6.6	5	肺炎	9	53.37	20.47	0.99	6.0
6	慢性下呼吸道疾病	16	45.96	23.83	1.19	4.8	6	糖尿病	10	55.72	34.98	1.34	5.5	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	47.44	24.48	1.92	5.3
7	事故傷害	15	43.09	35.97	1.25	4.5	7	腦血管疾病	8	44.57	28.47	0.95	4.4	7	高血壓性疾病	6	35.58	15.10	1.19	4.0
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	31.60	17.27	1.28	3.3	8	慢性肝病及肝硬化	7	39.00	28.46	1.33	3.9	8	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	23.72	7.69	3.07	2.6
9	蓄意自我傷害(自殺)	7	20.11	16.33	1.29	2.1	9	蓄意自我傷害(自殺)	5	27.86	24.81	1.34	2.8	9	事故傷害	3	17.79	13.92	0.97	2.0
10	慢性肝病及肝硬化	7	20.11	14.44	1.01	2.1	10	敗血症	3	16.71	10.55	0.88	1.7	10	主動脈瘤及剝離	3	17.79	11.23	6.76*	2.0
	其他非十大死因	74	212.58	110.45	1.12	22.3		其他非十大死因	27	150.43	96.56	0.76	14.9		其他非十大死因	38	225.35	92.45	1.19	25.2
11	高血壓性疾病	7	20.11	10.46	0.75	2.1	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	16.71	9.80	0.68	1.7	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	17.79	7.47	2.44	2.0
12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	6	17.24	8.11	2.22	1.8	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	11.14	7.69	1.43	1.1	12	血管性及未明示之癱瘓症	3	17.79	7.24	2.73	2.0
13	敗血症	5	14.36	7.00	0.89	1.5	13	先天性畸形變形及染色體異常	1	5.57	4.80	5.17	0.6	13	蓄意自我傷害(自殺)	2	11.86	6.49	1.16	1.3
14	主動脈瘤及剝離	4	11.49	7.52	2.70	1.2	14	高血壓性疾病	1	5.57	3.93*-	0.23	0.6	14	流行性感冒	2	11.86	4.84	9.57*	1.3
15	血管性及未明示之癱瘓症	3	8.62	4.09	1.72	0.9	15	主動脈瘤及剝離	1	5.57	3.24	0.96	0.6	15	膽結石及其他膽囊疾患	2	11.86	4.84	7.72	1.3

附 註：1.彰化縣埔心鄉年中人口數 計34,810人 男性17,948人 女性16,863人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣永靖鄉主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	330	871.20	481.70	1.07	100.0		所有死亡原因	189	960.56	618.16	1.04	100.0		所有死亡原因	141	774.60	347.19	1.10	100.0
	十大主要死因	275	726.00	400.07*+	1.15*	83.3		十大主要死因	163	828.42	532.28	1.14	86.2		十大主要死因	114	626.27	274.03	1.22*	80.9
1	惡性腫瘤	105	277.20	161.62	1.22	31.8	1	惡性腫瘤	70	355.76	227.16	1.26	37.0	1	惡性腫瘤	35	192.28	99.33	1.14	24.8
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	38	100.32	47.78	1.00	11.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	106.73	61.59	1.07	11.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	17	93.39	37.13	0.93	12.1
3	糖尿病	24	63.36	35.43	1.40	7.3	3	肺炎	15	76.24	44.24	1.13	7.9	3	糖尿病	15	82.40	33.46	1.70	10.6
4	肺炎	23	60.72	28.37	0.97	7.0	4	慢性下呼吸道疾病	12	60.99	37.28	1.09	6.3	4	高血壓性疾病	12	65.92	21.25	2.08*	8.5
5	腦血管疾病	18	47.52	27.65	1.00	5.5	5	事故傷害	10	50.82	38.76	1.01	5.3	5	腦血管疾病	10	54.94	25.46	1.19	7.1
6	高血壓性疾病	18	47.52	21.07	1.71*	5.5	6	糖尿病	9	45.74	33.80	1.07	4.8	6	肺炎	8	43.95	17.28	0.78	5.7
7	慢性下呼吸道疾病	16	42.24	21.09	1.05	4.8	7	腦血管疾病	8	40.66	26.75	0.83	4.2	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	32.96	12.29	1.26	4.3
8	慢性肝病及肝硬化	11	29.04	21.26	1.43	3.3	8	慢性肝病及肝硬化	7	35.58	27.56	1.21	3.7	8	慢性肝病及肝硬化	4	21.97	13.43	2.03	2.8
9	事故傷害	11	29.04	20.98	0.83	3.3	9	高血壓性疾病	6	30.49	18.04	1.25	3.2	9	慢性下呼吸道疾病	4	21.97	7.26	0.95	2.8
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	29.04	14.83	1.12	3.3	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	25.41	17.11	1.00	2.6	10	主動脈瘤及剝離	3	16.48	7.13	5.90*	2.1
	其他非十大死因	55	145.20	81.63	0.79	16.7		其他非十大死因	26	132.14	85.88*-	0.68	13.8		其他非十大死因	27	148.33	73.16	0.78	19.1
11	敗血症	6	15.84	7.82	0.94	1.8	11	敗血症	4	20.33	10.84	1.04	2.1	11	敗血症	2	10.99	5.40	0.80	1.4
12	主動脈瘤及剝離	5	13.20	6.85	2.98	1.5	12	帕金森病	2	10.16	6.48	2.00	1.1	12	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	5.49	12.29	3.91	0.7
13	蓄意自我傷害(自殺)	3	7.92	4.50*-	0.51	0.9	13	主動脈瘤及剝離	2	10.16	6.06	1.70	1.1	13	蓄意自我傷害(自殺)	1	5.49	3.98	0.53	0.7
14	帕金森病	2	5.28	2.87	1.21	0.6	14	蓄意自我傷害(自殺)	2	10.16	5.91*-	0.49	1.1	14	事故傷害	1	5.49	3.47*-	0.29	0.7
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	5.28	2.34	0.65	0.6	15	先天性畸形變形及染色體異常	1	5.08	10.14	4.99	0.5	15	膽結石及其他膽囊疾患	1	5.49	3.15	3.36	0.7

附 註：1. 彰化縣永靖鄉年中人口數 計37,879人 男性19,676人 女性18,203人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣社頭鄉主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	317	730.13	402.00	0.90	100.0		所有死亡原因	188	843.05	530.05	0.91	100.0		所有死亡原因	129	610.85	281.55	0.88	100.0
	十大主要死因	245	564.30	308.19	0.92	77.3		十大主要死因	149	668.16	420.01	0.96	79.3		十大主要死因	98	464.06	210.07	0.91	76.0
1	惡性腫瘤	85	195.78	115.56	0.86	26.8	1	惡性腫瘤	58	260.09	166.91	0.91	30.9	1	惡性腫瘤	27	127.85	65.13	0.77	20.9
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	40	92.13	47.80	0.93	12.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	89.69	55.76	0.90	10.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	94.71	37.02	0.96	15.5
3	肺炎	26	59.88	26.39	0.97	8.2	3	肺炎	15	67.26	38.34	1.00	8.0	3	肺炎	11	52.09	18.08	0.94	8.5
4	腦血管疾病	22	50.67	28.48	1.08	6.9	4	腦血管疾病	14	62.78	39.42	1.27	7.4	4	糖尿病	9	42.62	21.31	0.90	7.0
5	慢性下呼吸道疾病	17	39.16	19.08	0.98	5.4	5	慢性下呼吸道疾病	14	62.78	36.57	1.12	7.4	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	37.88	21.80	1.48	6.2
6	糖尿病	14	32.25	18.64	0.71	4.4	6	慢性肝病及肝硬化	7	31.39	21.28	1.05	3.7	6	腦血管疾病	8	37.88	18.81	0.84	6.2
7	慢性肝病及肝硬化	11	25.34	16.11	1.25	3.5	7	敗血症	6	26.91	16.47	1.37	3.2	7	慢性肝病及肝硬化	4	18.94	10.44	1.77	3.1
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	25.34	14.95	0.99	3.5	8	蓄意自我傷害(自殺)	5	22.42	17.33	1.09	2.7	8	敗血症	4	18.94	5.78	1.39	3.1
9	敗血症	10	23.03	11.32	1.38	3.2	9	糖尿病	5	22.42	14.80	0.52	2.7	9	高血壓性疾病	4	18.94	5.37*-	0.62	3.1
10	高血壓性疾病	9	20.73	9.86	0.75	2.8	10	高血壓性疾病	5	22.42	13.11	0.92	2.7	10	事故傷害	3	14.21	6.33	0.76	2.3
	其他非十大死因	72	165.83	93.81*-	0.83	22.7		其他非十大死因	39	174.89	110.03*-	0.76	20.7		其他非十大死因	31	146.79	71.48	0.81	24.0
11	蓄意自我傷害(自殺)	7	16.12	12.86	1.04	2.2	11	衰老/老邁	5	22.42	12.54	2.04	2.7	11	慢性下呼吸道疾病	3	14.21	4.85	0.63	2.3
12	事故傷害	7	16.12	10.11*-	0.46*	2.2	12	事故傷害	4	17.94	13.60*-	0.35*	2.1	12	蓄意自我傷害(自殺)	2	9.47	8.17	0.93	1.6
13	衰老/老邁	6	13.82	5.39	1.26	1.9	13	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	13.45	8.20	0.52	1.6	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	9.47	7.97	1.26	1.6
14	疝氣及腸阻塞	3	6.91	3.00	2.98	0.9	14	帕金森病	2	8.97	5.21	1.74	1.1	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	9.47	3.09	1.19	1.6
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	6.91	2.73	0.86	0.9	15	疝氣及腸阻塞	2	8.97	4.66	2.84	1.1	15	源於周產期的特定病況	1	4.74	8.45	7.08	0.8

附 註：1. 彰化縣社頭鄉年中人口數 計43,417人 男性22,300人 女性21,118人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣二水鄉主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	219	1,407.09	529.84	1.16*	100.0		所有死亡原因	104	1,275.13	534.72	0.94	100.0		所有死亡原因	115	1,552.38	527.56*+	1.43*	100.0
	十大主要死因	173	1,111.54	404.40	1.22*	79.0		十大主要死因	88	1,078.96	466.07	1.08	84.6		十大主要死因	86	1,160.91	397.65*+	1.51*	74.8
1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	50	321.25	110.53*+	2.09*	22.8	1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	28	343.31	143.72*+	2.30*	26.9	1	惡性腫瘤	23	310.48	112.91	1.30	20.0
2	惡性腫瘤	44	282.70	108.60	0.88	20.1	2	惡性腫瘤	21	257.48	107.95*-	0.64*	20.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	22	296.98	78.71*+	1.85*	19.1
3	肺炎	28	179.90	49.46*+	1.76*	12.8	3	肺炎	17	208.44	73.19	1.83*	16.3	3	肺炎	11	148.49	27.84	1.62	9.6
4	腎炎、腎病症候群及腎病變	13	83.53	26.15	2.07*	5.9	4	慢性下呼吸道疾病	6	73.57	29.63	0.79	5.8	4	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	107.99	28.32	2.64*	7.0
5	慢性下呼吸道疾病	12	77.10	25.00	1.17	5.5	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	61.30	23.07	1.53	4.8	5	慢性下呼吸道疾病	6	80.99	19.61	2.14	5.2
6	事故傷害	7	44.98	33.19	1.03	3.2	6	事故傷害	4	49.04	41.02	0.79	3.8	6	糖尿病	5	67.49	30.53	0.89	4.3
7	蓄意自我傷害(自殺)	5	32.13	19.58	1.85	2.3	7	蓄意自我傷害(自殺)	3	36.78	22.71	1.63	2.9	7	事故傷害	3	40.50	24.42	1.62	2.6
8	糖尿病	5	32.13	14.70	0.47	2.3	8	腦血管疾病	2	24.52	10.83*-	0.33	1.9	8	敗血症	3	40.50	9.82	1.86	2.6
9	腦血管疾病	5	32.13	10.24*-	0.44	2.3	9	慢性肝病及肝硬化	1	12.26	7.41	0.34	1.0	9	腦血管疾病	3	40.50	8.34*-	0.56	2.6
10	敗血症	4	25.70	6.96	0.99	1.8	10	疝氣及腸阻塞	1	12.26	6.54	2.58	1.0	10	先天性畸形變形及染色體異常	2	27.00	57.14	15.64*	1.7
	其他非十大死因	46	295.55	125.43	0.97	21.0		其他非十大死因	16	196.17	68.65*-	0.55*	15.4		其他非十大死因	29	391.47	129.91	1.24	25.2
11	慢性肝病及肝硬化	3	19.28	8.89	0.74	1.4	11	帕金森病	1	12.26	4.34	1.41	1.0	11	蓄意自我傷害(自殺)	2	27.00	15.39	2.23	1.7
12	先天性畸形變形及染色體異常	2	12.85	27.17	9.77*	0.9	12	主動脈瘤及剝離	1	12.26	3.59	1.43	1.0	12	慢性肝病及肝硬化	2	27.00	8.98	1.68	1.7
13	疝氣及腸阻塞	1	6.43	3.21	1.78	0.5	13	敗血症	1	12.26	3.59*-	0.40	1.0	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	13.50	6.29	1.04	0.9
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	6.43	3.21	0.50	0.5	14	膽結石及其他膽囊疾患	1	12.26	3.55	4.13	1.0	14	高血壓性疾病	1	13.50	2.68*-	0.26	0.9
15	帕金森病	1	6.43	2.02	0.89	0.5														

附 註：1. 彰化縣二水鄉年中人口數 計15,564人 男性8,156人 女性7,408人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣田尾鄉主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	256	928.65	470.17	1.00	100.0		所有死亡原因	156	1,094.58	638.17	1.05	100.0		所有死亡原因	100	751.03	297.16	0.92	100.0
	十大主要死因	190	689.23	363.13	0.96	74.2		十大主要死因	120	841.99	495.77	1.03	76.9		十大主要死因	75	563.27	241.42	0.93	75.0
1	惡性腫瘤	72	261.18	144.35	1.05	28.1	1	惡性腫瘤	42	294.70	178.41	0.94	26.9	1	惡性腫瘤	30	225.31	105.17	1.24	30.0
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	26	94.32	49.29	0.81	10.2	2	慢性下呼吸道疾病	18	126.30	66.66*+	1.88*	11.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	10	75.10	31.25	0.63	10.0
3	慢性下呼吸道疾病	22	79.81	35.18*+	1.66*	8.6	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	112.26	65.74	0.99	10.3	3	高血壓性疾病	7	52.57	13.47	1.39	7.0
4	肺炎	18	65.30	30.10	0.87	7.0	4	肺炎	12	84.20	41.92	1.03	7.7	4	肺炎	6	45.06	20.13	0.66	6.0
5	腦血管疾病	11	39.90	19.65	0.73	4.3	5	事故傷害	7	49.12	43.57	0.92	4.5	5	腦血管疾病	5	37.55	16.84	0.69	5.0
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	39.90	17.72	1.34	4.3	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	49.12	24.75	1.65	4.5	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	30.04	12.72	0.99	4.0
7	事故傷害	10	36.28	29.72	0.98	3.9	7	慢性肝病及肝硬化	6	42.10	29.45	1.34	3.8	7	慢性下呼吸道疾病	4	30.04	6.70	1.08	4.0
8	高血壓性疾病	8	29.02	11.14	0.88	3.1	8	腦血管疾病	6	42.10	22.30	0.75	3.8	8	事故傷害	3	22.53	15.71	1.13	3.0
9	慢性肝病及肝硬化	6	21.77	15.99	1.01	2.3	9	糖尿病	3	21.05	13.69	0.44	1.9	9	蓄意自我傷害(自殺)	3	22.53	14.39	2.14	3.0
10	糖尿病	6	21.77	10.00*-	0.42*	2.3	10	敗血症	3	21.05	9.28	0.93	1.9	10	糖尿病	3	22.53	5.03*-	0.40	3.0
	其他非十大死因	66	239.42	107.04	1.13	25.8		其他非十大死因	36	252.60	142.40	1.12	23.1		其他非十大死因	25	187.76	55.74	0.91	25.0
11	敗血症	5	18.14	6.08	0.93	2.0	11	皮膚及皮下組織疾病	2	14.03	7.96	3.53	1.3	11	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	15.02	3.79	5.75	2.0
12	蓄意自我傷害(自殺)	4	14.51	10.97	0.92	1.6	12	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	14.03	7.14	4.62	1.3	12	敗血症	2	15.02	3.79	0.93	2.0
13	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	4	14.51	5.68	5.15*	1.6	13	蓄意自我傷害(自殺)	1	7.02	7.73	0.34	0.6	13	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	1	7.51	8.01	16.56	1.0
14	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	1	7.51	8.01	16.56	0.4	14	腸道感染症	1	7.02	7.37	8.33	0.6	14	流行性感冒	1	7.51	2.90	5.14	1.0
15	流行性感冒	2	7.26	3.98	2.87	0.8	15	加害(他殺)	1	7.02	6.32	4.96	0.6	15	膽結石及其他膽囊疾患	1	7.51	1.68	3.83	1.0

附 註：1. 彰化縣田尾鄉年中人口數 計27,567人 男性14,252人 女性13,315人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埤頭鄉主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	315	1,021.63	488.85	1.05	100.0		所有死亡原因	171	1,066.82	619.64	1.01	100.0		所有死亡原因	144	972.71	360.24	1.10	100.0
	十大主要死因	234	758.93	361.01	1.03	74.3		十大主要死因	130	811.03	451.88	0.97	76.0		十大主要死因	105	709.27	275.86	1.11	72.9
1	惡性腫瘤	82	265.95	138.75	1.03	26.0	1	惡性腫瘤	51	318.17	181.42	1.00	29.8	1	惡性腫瘤	31	209.40	98.01	1.08	21.5
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	33	107.03	43.76	0.87	10.5	2	事故傷害	14	87.34	61.46	1.63	8.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	155.36	49.84	1.18	16.0
3	肺炎	23	74.60	25.98	0.93	7.3	3	肺炎	13	81.10	38.18	0.98	7.6	3	糖尿病	10	67.55	18.80	1.11	6.9
4	事故傷害	21	68.11	43.96	1.80*	6.7	4	慢性下呼吸道疾病	12	74.86	35.94	1.10	7.0	4	肺炎	10	67.55	14.95	0.90	6.9
5	糖尿病	20	64.87	28.20	1.20	6.3	5	糖尿病	10	62.39	36.06	1.28	5.8	5	腦血管疾病	9	60.79	28.21	1.03	6.3
6	腦血管疾病	15	48.65	21.94	0.85	4.8	6	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	10	62.39	34.89*-	0.54*	5.8	6	事故傷害	7	47.28	23.07	2.21	4.9
7	慢性下呼吸道疾病	15	48.65	18.80	0.95	4.8	7	高血壓性疾病	6	37.43	18.34	1.30	3.5	7	慢性肝病及肝硬化	6	40.53	16.82	3.10*	4.2
8	慢性肝病及肝硬化	11	35.68	16.80	1.63	3.5	8	腦血管疾病	6	37.43	18.12	0.66	3.5	8	高血壓性疾病	4	27.02	9.17	0.65	2.8
9	高血壓性疾病	10	32.43	12.95	0.94	3.2	9	慢性肝病及肝硬化	5	31.19	16.89	1.00	2.9	9	慢性下呼吸道疾病	3	20.26	6.48	0.66	2.1
10	蓄意自我傷害(自殺)	4	12.97	9.86	0.82	1.3	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	18.72	10.57	0.62	1.8	10	蓄意自我傷害(自殺)	2	13.51	10.51	1.27	1.4
	其他非十大死因	81	262.71	127.84	1.10	25.7		其他非十大死因	41	255.79	167.76	1.15	24.0		其他非十大死因	39	263.44	84.38	1.07	27.1
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	12.97	7.33	0.41	1.3	11	蓄意自我傷害(自殺)	2	12.48	9.25	0.59	1.2	11	敗血症	2	13.51	5.60	0.75	1.4
12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	12.97	5.51	1.30	1.3	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	12.48	6.74	1.29	1.2	12	帕金森病	2	13.51	4.42	3.15	1.4
13	敗血症	4	12.97	5.43	0.63	1.3	13	敗血症	2	12.48	5.79	0.54	1.2	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	13.51	3.90	1.32	1.4
14	帕金森病	4	12.97	4.74	2.41	1.3	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	12.48	5.66	2.45	1.2	14	皮膚及皮下組織疾病	2	13.51	3.77	2.84	1.4
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	12.97	3.96	1.82	1.3	15	帕金森病	2	12.48	5.66	2.01	1.2	15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	13.51	2.60	1.42	1.4

附 註：1. 彰化縣埤頭鄉年中人口數 計30,833人 男性16,029人 女性14,804人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣芳苑鄉主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	408	1,193.12	505.09*+	1.02	100.0		所有死亡原因	245	1,354.49	677.00	1.07	100.0		所有死亡原因	163	1,011.92	323.92	0.92	100.0
	十大主要死因	329	962.10	412.69*+	1.09	80.6		十大主要死因	201	1,111.23	571.92*+	1.13	82.0		十大主要死因	131	813.26	271.35	0.99	80.4
1	惡性腫瘤	131	383.09	182.58*+	1.26*	32.1	1	惡性腫瘤	87	480.98	250.44*+	1.28*	35.5	1	惡性腫瘤	44	273.16	113.66	1.17	27.0
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	54	157.91	62.63	1.06	13.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	30	165.86	83.30	1.20	12.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	24	148.99	40.04	0.90	14.7
3	事故傷害	25	73.11	46.24*+	1.73*	6.1	3	事故傷害	20	110.57	71.07	1.87*	8.2	3	腦血管疾病	13	80.71	24.25	1.09	8.0
4	腦血管疾病	24	70.18	26.47	0.99	5.9	4	慢性下呼吸道疾病	13	71.87	30.54	0.85	5.3	4	糖尿病	11	68.29	20.99	0.89	6.7
5	肺炎	23	67.26	17.63*-	0.67	5.6	5	肺炎	12	66.34	22.06*-	0.64	4.9	5	肺炎	11	68.29	16.16	0.72	6.7
6	糖尿病	18	52.64	20.82	0.80	4.4	6	腦血管疾病	11	60.81	27.74	0.88	4.5	6	衰老/老邁	9	55.87	9.29	2.85*	5.5
7	慢性下呼吸道疾病	18	52.64	18.08	0.82	4.4	7	慢性肝病及肝硬化	8	44.23	23.99	1.24	3.3	7	事故傷害	5	31.04	19.58	1.26	3.1
8	衰老/老邁	13	38.02	8.34	2.03*	3.2	8	糖尿病	7	38.70	19.08	0.67	2.9	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	31.04	12.85	0.76	3.1
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	35.09	14.26	0.91	2.9	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	38.70	16.42	1.05	2.9	9	慢性下呼吸道疾病	5	31.04	7.80	0.79	3.1
10	慢性肝病及肝硬化	11	32.17	15.65	1.28	2.7	10	蓄意自我傷害(自殺)	6	33.17	27.28	1.49	2.4	10	高血壓性疾病	4	24.83	6.73	0.47	2.5
	其他非十大死因	79	231.02	92.40	0.78*	19.4		其他非十大死因	44	243.26	105.07	0.87	18.0		其他非十大死因	32	198.66	52.57*-	0.72	19.6
11	敗血症	8	23.39	10.47	0.92	2.0	11	敗血症	5	27.64	16.01	0.98	2.0	11	慢性肝病及肝硬化	3	18.62	4.59	1.17	1.8
12	高血壓性疾病	8	23.39	8.91	0.55	2.0	12	高血壓性疾病	4	22.11	10.49	0.63	1.6	12	敗血症	3	18.62	3.24	0.83	1.8
13	蓄意自我傷害(自殺)	6	17.55	14.89	1.03	1.5	13	衰老/老邁	4	22.11	7.21	1.24	1.6	13	帕金森病	2	12.42	4.86	2.25	1.2
14	主動脈瘤及剝離	3	8.77	3.51	1.44	0.7	14	血管性及未明示之癱瘓症	2	11.06	3.60	1.85	0.8	14	主動脈瘤及剝離	2	12.42	3.21	2.98	1.2
15	帕金森病	3	8.77	3.33	1.29	0.7	15	流行性感冒	1	5.53	3.65	1.33	0.4	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	12.42	2.78	0.96	1.2

附 註：1. 彰化縣芳苑鄉年中人口數 計34,196人 男性18,088人 女性16,108人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣大城鄉主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	245	1,408.05	551.54*+	1.12	100.0		所有死亡原因	159	1,687.00	793.35*+	1.28*	100.0		所有死亡原因	86	1,078.37	298.40	0.89	100.0
	十大主要死因	196	1,126.44	433.82*+	1.19*	80.0		十大主要死因	131	1,389.92	636.24*+	1.35*	82.4		十大主要死因	66	827.59	220.41	0.95	76.7
1	惡性腫瘤	75	431.03	188.85*+	1.30*	30.6	1	惡性腫瘤	56	594.16	274.35*+	1.49*	35.2	1	惡性腫瘤	19	238.24	82.82	0.91	22.1
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	27	155.17	47.61	0.98	11.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	137.93	54.63	0.96	8.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	175.55	41.68	0.96	16.3
3	腦血管疾病	19	109.20	32.22	1.43	7.8	3	腦血管疾病	13	137.93	52.82	1.88*	8.2	3	肺炎	9	112.85	16.70	1.08	10.5
4	肺炎	19	109.20	27.08	1.03	7.8	4	事故傷害	11	116.71	70.73	1.92	6.9	4	腦血管疾病	6	75.24	12.56	0.92	7.0
5	事故傷害	15	86.21	49.17	1.95*	6.1	5	肺炎	10	106.10	41.53	1.02	6.3	5	事故傷害	4	50.16	23.16	1.85	4.7
6	慢性下呼吸道疾病	12	68.97	17.38	1.01	4.9	6	慢性下呼吸道疾病	9	95.49	35.59	1.09	5.7	6	高血壓性疾病	4	50.16	9.01	0.87	4.7
7	高血壓性疾病	9	51.72	14.90	1.13	3.7	7	糖尿病	6	63.66	20.19	1.03	3.8	7	蓄意自我傷害(自殺)	3	37.62	18.70	3.07	3.5
8	糖尿病	8	45.98	11.20*-	0.64	3.3	8	慢性肝病及肝硬化	5	53.05	24.99	1.38	3.1	8	慢性下呼吸道疾病	3	37.62	7.24	0.87	3.5
9	蓄意自我傷害(自殺)	6	34.48	31.44	1.97	2.4	9	高血壓性疾病	5	53.05	22.05	1.47	3.1	9	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	25.08	4.28	1.73	2.3
10	慢性肝病及肝硬化	6	34.48	13.98	1.27	2.4	10	蓄意自我傷害(自殺)	3	31.83	39.36	1.40	1.9	10	糖尿病	2	25.08	4.28*-	0.29	2.3
	其他非十大死因	49	281.61	117.71	0.91	20.0		其他非十大死因	28	297.08	157.11	1.02	17.6		其他非十大死因	20	250.78	77.99	0.73	23.3
11	血管性及未明示之癱瘓症	4	22.99	5.45	2.51	1.6	11	血管性及未明示之癱瘓症	3	31.83	10.31	5.34*	1.9	11	帕金森病	2	25.08	3.55	4.06	2.3
12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	22.99	5.05	1.68	1.6	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	21.22	7.67	1.65	1.3	12	病毒性肝炎	1	12.54	33.33	8.72	1.2
13	病毒性肝炎	2	11.49	16.02	6.26	0.8	13	先天性畸形變形及染色體異常	1	10.61	25.53	11.78	0.6	13	結核病	1	12.54	2.50	2.78	1.2
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	11.49	5.48	1.23	0.8	14	源於周產期的特定病況	1	10.61	25.53	10.37	0.6	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	12.54	2.50	0.96	1.2
15	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	11.49	4.34*-	0.28*	0.8	15	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	10.61	6.02	0.28	0.6	15	血管性及未明示之癱瘓症	1	12.54	2.50	0.95	1.2

附 註：1.彰化縣大城鄉年中人口數 計17,400人 男性9,425人 女性7,975人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣竹塘鄉主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	207	1,329.99	526.76	1.13	100.0		所有死亡原因	119	1,449.98	697.49	1.18	100.0		所有死亡原因	88	1,195.98	382.90	1.05	100.0
	十大主要死因	153	983.04	366.49	1.09	73.9		十大主要死因	90	1,096.62	525.16	1.19	75.6		十大主要死因	67	910.57	291.21	1.19	76.1
1	惡性腫瘤	61	391.93	178.16	1.27	29.5	1	惡性腫瘤	42	511.76	264.92	1.38	35.3	1	惡性腫瘤	19	258.22	87.91	1.07	21.6
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	128.50	42.21	0.86	9.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	146.22	59.94	1.09	10.1	2	腦血管疾病	11	149.50	26.56	1.94	12.5
3	腦血管疾病	19	122.08	28.64	1.71*	9.2	3	肺炎	8	97.48	36.61	1.00	6.7	3	肺炎	10	135.91	38.51	1.38	11.4
4	肺炎	18	115.65	34.95	1.16	8.7	4	腦血管疾病	8	97.48	35.12	1.45	6.7	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	8	108.73	29.46	0.63	9.1
5	慢性下呼吸道疾病	9	57.83	17.65	0.90	4.3	5	慢性下呼吸道疾病	6	73.11	28.87	0.91	5.0	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	67.95	27.27	1.59	5.7
6	事故傷害	7	44.98	28.19	1.07	3.4	6	事故傷害	4	48.74	31.18	0.84	3.4	6	高血壓性疾病	4	54.36	9.39	0.99	4.5
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	32.13	13.04	0.82	2.4	7	糖尿病	4	48.74	19.46	0.85	3.4	7	事故傷害	3	40.77	25.01	1.63	3.4
8	糖尿病	5	32.13	9.95*-	0.48	2.4	8	衰老/老邁	3	36.55	12.81	2.22	2.5	8	慢性下呼吸道疾病	3	40.77	7.79	1.00	3.4
9	高血壓性疾病	5	32.13	7.66	0.75	2.4	9	慢性肝病及肝硬化	2	24.37	8.77	0.70	1.7	9	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	2	27.18	20.29	15.55*	2.3
10	衰老/老邁	4	25.70	6.05	1.38	1.9	10	源於周產期的特定病況	1	12.18	27.48	11.00	0.8	10	蓄意自我傷害(自殺)	2	27.18	19.03	2.31	2.3
	其他非十大死因	54	346.95	160.26	1.25	26.1		其他非十大死因	29	353.36	172.33	1.15	24.4		其他非十大死因	21	285.40	91.69	0.77	23.9
11	蓄意自我傷害(自殺)	3	19.28	11.80	1.16	1.4	11	蓄意自我傷害(自殺)	1	12.18	7.05	0.56	0.8	11	主動脈瘤及剝離	2	27.18	4.69	6.16	2.3
12	慢性肝病及肝硬化	3	19.28	5.70*-	0.77	1.4	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	12.18	6.22	2.06	0.8	12	敗血症	2	27.18	4.69	1.18	2.3
13	血管性及未明示之癱瘓症	3	19.28	4.86	2.20	1.4	13	病毒性肝炎	1	12.18	4.59	6.58	0.8	13	血管性及未明示之癱瘓症	2	27.18	4.12	2.18	2.3
14	敗血症	3	19.28	4.43	0.76	1.4	14	皮膚及皮下組織疾病	1	12.18	4.59	2.65	0.8	14	先天性畸形變形及染色體異常	1	13.59	32.73	8.28	1.1
15	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	2	12.85	8.63	10.71*	1.0	15	血管性及未明示之癱瘓症	1	12.18	4.59	2.21	0.8	15	帕金森病	1	13.59	3.67	2.29	1.1

附 註：1. 彰化縣竹塘鄉年中人口數 計15,564人 男性8,207人 女性7,358人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣溪州鄉主要死亡原因

民國105年(2016年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	326	1,070.08	496.61	1.06	100.0		所有死亡原因	199	1,247.81	683.85	1.13	100.0		所有死亡原因	127	874.84	304.06	0.96	100.0
	十大主要死因	250	820.61	389.11	1.08	76.7		十大主要死因	158	990.72	548.60	1.15	79.4		十大主要死因	99	681.96	235.85	1.06	78.0
1	惡性腫瘤	82	269.16	133.20	0.98	25.2	1	惡性腫瘤	53	332.33	178.32	0.99	26.6	1	惡性腫瘤	29	199.77	91.61	0.97	22.8
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	47	154.28	66.33	1.24	14.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	24	150.49	83.26	1.26	12.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23	158.43	42.62	1.19	18.1
3	腦血管疾病	25	82.06	36.54	1.37	7.7	3	事故傷害	18	112.87	81.64*+	2.05*	9.0	3	腦血管疾病	12	82.66	34.61	1.36	9.4
4	肺炎	21	68.93	25.51	0.85	6.4	4	肺炎	14	87.79	41.22	1.04	7.0	4	糖尿病	8	55.11	21.91	0.86	6.3
5	事故傷害	19	62.37	42.62	1.60	5.8	5	腦血管疾病	13	81.51	39.10	1.37	6.5	5	肺炎	7	48.22	12.38	0.64	5.5
6	慢性下呼吸道疾病	16	52.52	19.31	1.00	4.9	6	高血壓性疾病	11	68.97	32.53	2.32*	5.5	6	慢性下呼吸道疾病	7	48.22	11.39	1.55	5.5
7	高血壓性疾病	16	52.52	19.30	1.48	4.9	7	慢性下呼吸道疾病	9	56.43	26.89	0.80	4.5	7	高血壓性疾病	5	34.44	7.69	0.82	3.9
8	糖尿病	12	39.39	19.81	0.69	3.7	8	蓄意自我傷害(自殺)	6	37.62	26.01	1.75	3.0	8	敗血症	3	20.67	5.16	1.15	2.4
9	蓄意自我傷害(自殺)	6	19.69	13.47	1.21	1.8	9	慢性肝病及肝硬化	6	37.62	24.08	1.14	3.0	9	胃及十二指腸潰瘍	3	20.67	4.57	7.13*	2.4
10	慢性肝病及肝硬化	6	19.69	13.03	0.85	1.8	10	糖尿病	4	25.08	15.55	0.49	2.0	10	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	13.78	3.91	1.27	1.6
	其他非十大死因	76	249.47	107.50	1.02	23.3		其他非十大死因	41	257.09	135.25	1.07	20.6		其他非十大死因	28	192.88	68.21	0.73	22.0
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	19.69	7.04*-	0.60	1.8	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	25.08	11.85	0.80	2.0	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	13.78	3.70	1.40	1.6
12	胃及十二指腸潰瘍	6	19.69	6.75	6.00*	1.8	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	18.81	11.68	3.50	1.5	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	13.78	3.32*-	0.40	1.6
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	16.41	8.19	2.21	1.5	13	胃及十二指腸潰瘍	3	18.81	8.87	5.16*	1.5	13	腸道感染症	1	6.89	4.02	11.00	0.8
14	敗血症	4	13.13	5.05	0.62	1.2	14	疝氣及腸阻塞	2	12.54	6.37	3.24	1.0	14	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	6.89	3.52	4.14	0.8
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	13.13	4.23	1.25	1.2	15	血管性及未明示之癱瘓症	2	12.54	5.25	2.67	1.0	15	帕金森病	1	6.89	3.52	1.46	0.8

附 註：1. 彰化縣溪州鄉年中人口數 計30,465人 男性15,948人 女性14,517人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計