

彰化縣彰化市癌症死亡原因

民國105年(2016年)

| 合 計 | | | | | | | 男 性 | | | | | | 女 性 | | | | | | | |
|-----|------------------------------|----------|------------------|------------|-----------|----------------|-----|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|----|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|
| 順位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % |
| | 所有癌症死因 | 422 | 179.69 | 115.44*- | 0.87* | 100.0 | | 所有癌症死因 | 261 | 224.60 | 155.72*- | 0.85* | 100.0 | | 所有癌症死因 | 161 | 135.70 | 81.12 | 0.92 | 100.0 |
| | 十大癌症死因 | 333 | 141.79 | 90.03*- | 0.88* | 78.9 | | 十大癌症死因 | 230 | 197.92 | 136.71*- | 0.89 | 88.1 | | 十大癌症死因 | 131 | 110.42 | 66.44 | 0.95 | 81.4 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 91 | 38.75 | 23.39*- | 0.86 | 21.6 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 60 | 51.63 | 34.09 | 0.85 | 23.0 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 31 | 26.13 | 14.67 | 0.91 | 19.3 |
| 2 | 肝和肝內膽管癌 | 59 | 25.12 | 16.07*- | 0.69* | 14.0 | 2 | 肝和肝內膽管癌 | 43 | 37.00 | 26.24*- | 0.74* | 16.5 | 2 | 女性乳房癌 | 22 | 18.54 | 12.21 | 1.09 | 13.7 |
| 3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 53 | 22.57 | 14.36 | 1.03 | 12.6 | 3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 37 | 31.84 | 21.69 | 1.30 | 14.2 | 3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 16 | 13.49 | 8.47 | 0.70 | 9.9 |
| 4 | 女性乳房癌 | 22 | 18.54 | 12.21 | 1.09 | 5.2 | 4 | 口腔癌 | 23 | 19.79 | 14.80*- | 0.68 | 8.8 | 4 | 肝和肝內膽管癌 | 16 | 13.49 | 6.89*- | 0.63 | 9.9 |
| 5 | 前列腺(攝護腺)癌 | 13 | 11.19 | 7.02 | 0.92 | 3.1 | 5 | 食道癌 | 23 | 19.79 | 13.60 | 1.20 | 8.8 | 5 | 卵巢癌 | 10 | 8.43 | 5.47 | 1.50 | 6.2 |
| 6 | 口腔癌 | 26 | 11.07 | 7.65*- | 0.70 | 6.2 | 6 | 前列腺(攝護腺)癌 | 13 | 11.19 | 7.02 | 0.92 | 5.0 | 6 | 胃癌 | 10 | 8.43 | 5.05 | 1.19 | 6.2 |
| 7 | 食道癌 | 24 | 10.22 | 6.61 | 1.14 | 5.7 | 7 | 胃癌 | 12 | 10.33 | 6.55 | 0.98 | 4.6 | 7 | 胰臟癌 | 9 | 7.59 | 4.94 | 1.26 | 5.6 |
| 8 | 胃癌 | 22 | 9.37 | 5.69 | 1.08 | 5.2 | 8 | 白血病 | 8 | 6.88 | 5.59 | 1.46 | 3.1 | 8 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 6 | 5.06 | 3.31 | 1.16 | 3.7 |
| 9 | 卵巢癌 | 10 | 8.43 | 5.47 | 1.50 | 2.4 | 9 | 鼻咽癌 | 7 | 6.02 | 4.54 | 0.95 | 2.7 | 9 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 6 | 5.06 | 2.86 | 1.26 | 3.7 |
| 10 | 胰臟癌 | 13 | 5.54 | 3.87 | 0.77 | 3.1 | 10 | 胰臟癌 | 4 | 3.44 | 2.59*- | 0.41 | 1.5 | 10 | 子宮體癌 | 5 | 4.21 | 2.57 | 1.54 | 3.1 |
| | 其他非十大癌症死因 | 89 | 37.90 | 25.41 | 0.82 | 21.1 | | 其他非十大癌症死因 | 31 | 26.68 | 19.00*- | 0.66* | 11.9 | | 其他非十大癌症死因 | 30 | 25.29 | 14.69 | 0.81 | 18.6 |
| 11 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 6 | 5.06 | 3.31 | 1.16 | 1.4 | 11 | 腎臟癌 | 4 | 3.44 | 2.53 | 2.35 | 1.5 | 11 | 白血病 | 3 | 2.53 | 1.53 | 0.54 | 1.9 |
| 12 | 白血病 | 11 | 4.68 | 3.47 | 0.99 | 2.6 | 12 | 膽囊和其他膽道癌 | 4 | 3.44 | 1.93 | 1.75 | 1.5 | 12 | 間皮和軟組織癌 | 3 | 2.53 | 1.40 | 1.64 | 1.9 |
| 13 | 子宮體癌 | 5 | 4.21 | 2.57 | 1.54 | 1.2 | 13 | 喉癌 | 3 | 2.58 | 2.01 | 1.07 | 1.1 | 13 | 口腔癌 | 3 | 2.53 | 1.23 | 1.82 | 1.9 |
| 14 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 8 | 3.41 | 2.07 | 0.72 | 1.9 | 14 | 膀胱癌 | 3 | 2.58 | 1.92 | 0.53 | 1.1 | 14 | 腎臟癌 | 2 | 1.69 | 0.95 | 0.85 | 1.2 |
| 15 | 鼻咽癌 | 7 | 2.98 | 2.15 | 0.77 | 1.7 | 15 | 間皮和軟組織癌 | 2 | 1.72 | 1.21 | 1.50 | 0.8 | 15 | 膀胱癌 | 2 | 1.69 | 0.93 | 1.27 | 1.2 |

附 註：1. 彰化縣彰化市年中人口數 計234,850人 男性116,208人 女性118,642人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣鹿港鎮癌症死亡原因

民國105年(2016年)

| 合 計 | | | | | | | 男 性 | | | | | | 女 性 | | | | | | | |
|--------|------------------------------|----------|------------|------------|-----------|----------------|--------|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|--------|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|
| 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % |
| | 所有癌症死因 | 174 | 201.02 | 127.28 | 0.98 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 112 | 254.27 | 177.70 | 0.98 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 62 | 145.84 | 83.98 | 0.97 | 100.0 |
| | 十大癌症死因 | 141 | 162.90 | 102.48 | 1.03 | 81.0 | | 十大癌症死因 | 98 | 222.49 | 155.20 | 1.03 | 87.5 | | 十大癌症死因 | 52 | 122.32 | 71.98 | 1.11 | 83.9 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 45 | 51.99 | 32.69 | 1.15 | 25.9 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 28 | 63.57 | 44.26 | 1.06 | 25.0 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 17 | 39.99 | 23.36 | 1.35 | 27.4 |
| 2 | 肝和肝內膽管癌 | 26 | 30.04 | 19.48 | 0.84 | 14.9 | 2 | 肝和肝內膽管癌 | 20 | 45.41 | 33.18 | 0.92 | 17.9 | 2 | 結腸、直腸和肛門癌 | 12 | 28.23 | 16.25 | 1.40 | 19.4 |
| 3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 22 | 25.42 | 15.27 | 1.14 | 12.6 | 3 | 口腔癌 | 13 | 29.51 | 19.52 | 1.03 | 11.6 | 3 | 女性乳房癌 | 6 | 14.11 | 7.61 | 0.86 | 9.7 |
| 4 | 口腔癌 | 14 | 16.17 | 9.79 | 1.05 | 8.0 | 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 10 | 22.70 | 14.87 | 0.94 | 8.9 | 4 | 肝和肝內膽管癌 | 6 | 14.11 | 6.04*- | 0.64 | 9.7 |
| 5 | 前列腺(攝護腺)癌 | 7 | 15.89 | 10.87 | 1.33 | 4.0 | 5 | 食道癌 | 7 | 15.89 | 11.27 | 0.98 | 6.3 | 5 | 子宮體癌 | 2 | 4.70 | 3.54 | 1.85 | 3.2 |
| 6 | 女性乳房癌 | 6 | 14.11 | 7.61 | 0.86 | 3.4 | 6 | 前列腺(攝護腺)癌 | 7 | 15.89 | 10.87 | 1.33 | 6.3 | 6 | 胰臟癌 | 2 | 4.70 | 3.47 | 0.79 | 3.2 |
| 7 | 食道癌 | 7 | 8.09 | 5.56 | 0.94 | 4.0 | 7 | 胃癌 | 5 | 11.35 | 7.64 | 1.11 | 4.5 | 7 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 2 | 4.70 | 2.97 | 1.07 | 3.2 |
| 8 | 胰臟癌 | 6 | 6.93 | 5.27 | 0.97 | 3.4 | 8 | 胰臟癌 | 4 | 9.08 | 7.35 | 1.11 | 3.6 | 8 | 膽囊和其他膽道癌 | 2 | 4.70 | 2.90 | 1.63 | 3.2 |
| 9 | 胃癌 | 6 | 6.93 | 3.88 | 0.79 | 3.4 | 9 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 3 | 6.81 | 4.30 | 1.24 | 2.7 | 9 | 白血病 | 2 | 4.70 | 2.74 | 1.00 | 3.2 |
| 10 | 子宮體癌 | 2 | 4.70 | 3.54 | 1.85 | 1.1 | 10 | 間皮和軟組織癌 | 1 | 2.27 | 1.94 | 1.99 | 0.9 | 10 | 腦癌 | 1 | 2.35 | 3.09 | 1.44 | 1.6 |
| | 其他非十大癌症死因 | 33 | 38.12 | 24.79 | 0.81 | 19.0 | | 其他非十大癌症死因 | 14 | 31.78 | 22.50 | 0.73 | 12.5 | | 其他非十大癌症死因 | 10 | 23.52 | 12.00*- | 0.59 | 16.1 |
| 11 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 2 | 4.70 | 2.97 | 1.07 | 1.1 | 11 | 小腸癌 | 1 | 2.27 | 1.84 | 4.15 | 0.9 | 11 | 鼻咽癌 | 1 | 2.35 | 1.86 | 2.01 | 1.6 |
| 12 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 4 | 4.62 | 2.54 | 0.95 | 2.3 | 12 | 喉癌 | 1 | 2.27 | 1.84 | 0.98 | 0.9 | 12 | 膀胱癌 | 1 | 2.35 | 1.73 | 1.64 | 1.6 |
| 13 | 白血病 | 3 | 3.47 | 2.22 | 0.73 | 1.7 | 13 | 主唾液腺癌 | 1 | 2.27 | 1.57 | 3.32 | 0.9 | 13 | 口腔癌 | 1 | 2.35 | 0.94 | 1.54 | 1.6 |
| 14 | 膽囊和其他膽道癌 | 3 | 3.47 | 2.04 | 1.46 | 1.7 | 14 | 白血病 | 1 | 2.27 | 1.57 | 0.48 | 0.9 | 14 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 1 | 2.35 | 0.94 | 0.57 | 1.6 |
| 15 | 卵巢癌 | 1 | 2.35 | 0.94*- | 0.43 | 0.6 | 15 | 膽囊和其他膽道癌 | 1 | 2.27 | 1.40 | 1.21 | 0.9 | 15 | 卵巢癌 | 1 | 2.35 | 0.94*- | 0.43 | 1.6 |

附 註：1. 彰化縣鹿港鎮年中人口數 計86,558人 男性44,047人 女性42,511人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣和美鎮癌症死亡原因

民國105年(2016年)

| 合 計 | | | | | | | 男 性 | | | | | | | 女 性 | | | | | | |
|--------|------------------------------|----------|------------------|------------|-----------|----------------|--------|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|--------|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|
| 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % |
| | 所有癌症死因 | 179 | 196.41 | 137.74 | 1.02 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 116 | 249.45 | 191.40 | 1.04 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 63 | 141.14 | 88.65 | 1.01 | 100.0 |
| | 十大癌症死因 | 145 | 159.10 | 111.13 | 1.07 | 81.0 | | 十大癌症死因 | 99 | 212.89 | 163.04 | 1.05 | 85.3 | | 十大癌症死因 | 55 | 123.22 | 77.40 | 1.20 | 87.3 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 37 | 40.60 | 28.71 | 0.99 | 20.7 | 1 | 肝和肝內膽管癌 | 24 | 51.61 | 38.30 | 1.13 | 20.7 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 16 | 35.85 | 22.87 | 1.33 | 25.4 |
| 2 | 肝和肝內膽管癌 | 33 | 36.21 | 23.86 | 1.09 | 18.4 | 2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 21 | 45.16 | 35.57 | 0.83 | 18.1 | 2 | 女性乳房癌 | 9 | 20.16 | 12.90 | 1.25 | 14.3 |
| 3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 20 | 21.94 | 15.23 | 1.07 | 11.2 | 3 | 口腔癌 | 14 | 30.11 | 21.99 | 1.07 | 12.1 | 3 | 肝和肝內膽管癌 | 9 | 20.16 | 10.53 | 1.01 | 14.3 |
| 4 | 女性乳房癌 | 9 | 20.16 | 12.90 | 1.25 | 5.0 | 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 12 | 25.81 | 19.65 | 1.16 | 10.3 | 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 8 | 17.92 | 11.79 | 0.97 | 12.7 |
| 5 | 口腔癌 | 14 | 15.36 | 11.11 | 1.01 | 7.8 | 5 | 胰臟癌 | 7 | 15.05 | 11.79 | 1.95 | 6.0 | 5 | 胰臟癌 | 4 | 8.96 | 5.53 | 1.61 | 6.3 |
| 6 | 胰臟癌 | 11 | 12.07 | 8.55 | 1.81 | 6.1 | 6 | 食道癌 | 6 | 12.90 | 10.00 | 0.80 | 5.2 | 6 | 膽囊和其他膽道癌 | 4 | 8.96 | 5.07 | 3.41 | 6.3 |
| 7 | 前列腺(攝護腺)癌 | 5 | 10.75 | 8.80 | 1.05 | 2.8 | 7 | 前列腺(攝護腺)癌 | 5 | 10.75 | 8.80 | 1.05 | 4.3 | 7 | 白血病 | 2 | 4.48 | 2.99 | 1.00 | 3.2 |
| 8 | 食道癌 | 6 | 6.58 | 5.06 | 0.77 | 3.4 | 8 | 胃癌 | 4 | 8.60 | 7.56 | 0.94 | 3.4 | 8 | 骨和關節軟骨癌 | 1 | 2.24 | 1.99 | 3.61 | 1.6 |
| 9 | 胃癌 | 5 | 5.49 | 4.17 | 0.69 | 2.8 | 9 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 3 | 6.45 | 4.87 | 1.30 | 2.6 | 9 | 鼻咽癌 | 1 | 2.24 | 1.99 | 1.98 | 1.6 |
| 10 | 膽囊和其他膽道癌 | 5 | 5.49 | 3.57 | 2.55 | 2.8 | 10 | 膀胱癌 | 3 | 6.45 | 4.51 | 1.54 | 2.6 | 10 | 胃癌 | 1 | 2.24 | 1.74 | 0.33 | 1.6 |
| | 其他非十大癌症死因 | 34 | 37.31 | 26.62 | 0.86 | 19.0 | | 其他非十大癌症死因 | 17 | 36.56 | 28.36 | 0.97 | 14.7 | | 其他非十大癌症死因 | 8 | 17.92 | 11.25*- | 0.49* | 12.7 |
| 11 | 膀胱癌 | 4 | 4.39 | 2.86 | 1.58 | 2.2 | 11 | 腦癌 | 2 | 4.30 | 3.68 | 1.84 | 1.7 | 11 | 腎臟癌 | 1 | 2.24 | 1.58 | 1.18 | 1.6 |
| 12 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 3 | 3.29 | 2.40 | 0.74 | 1.7 | 12 | 小腸癌 | 1 | 2.15 | 1.75 | 3.88 | 0.9 | 12 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 1 | 2.24 | 1.58 | 0.54 | 1.6 |
| 13 | 白血病 | 3 | 3.29 | 2.16 | 0.73 | 1.7 | 13 | 膽囊和其他膽道癌 | 1 | 2.15 | 1.75 | 1.26 | 0.9 | 13 | 間皮和軟組織癌 | 1 | 2.24 | 1.45 | 1.49 | 1.6 |
| 14 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 1 | 2.24 | 1.58 | 0.54 | 0.6 | 14 | 鼻咽癌 | 1 | 2.15 | 1.75 | 0.36 | 0.9 | 14 | 小腸癌 | 1 | 2.24 | 1.37 | 3.34 | 1.6 |
| 15 | 鼻咽癌 | 2 | 2.19 | 1.93 | 0.60 | 1.1 | 15 | 黑色素瘤和其他皮膚癌 | 1 | 2.15 | 1.68 | 1.89 | 0.9 | 15 | 膀胱癌 | 1 | 2.24 | 1.37 | 1.78 | 1.6 |

附 註：1. 彰化縣和美鎮年中人口數 計91,138人 男性46,502人 女性44,636人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣北斗鎮癌症死亡原因

民國105年(2016年)

| 合 計 | | | | | | | 男 性 | | | | | | 女 性 | | | | | | | |
|-----|------------------------------|----------|------------------|------------|-----------|----------------|-----|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|----|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|
| 順位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % |
| | 所有癌症死因 | 67 | 201.57 | 121.52 | 0.90 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 42 | 250.46 | 162.25 | 0.89 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 25 | 151.79 | 88.91 | 0.93 | 100.0 |
| | 十大癌症死因 | 51 | 153.43 | 92.23 | 0.96 | 76.1 | | 十大癌症死因 | 36 | 214.68 | 139.36 | 0.95 | 85.7 | | 十大癌症死因 | 22 | 133.58 | 80.05 | 1.10 | 88.0 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 13 | 39.11 | 25.62 | 0.79 | 19.4 | 1 | 肝和肝內膽管癌 | 10 | 59.63 | 35.99 | 1.10 | 23.8 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 6 | 36.43 | 24.98 | 1.13 | 24.0 |
| 2 | 肝和肝內膽管癌 | 13 | 39.11 | 20.91 | 0.99 | 19.4 | 2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 7 | 41.74 | 27.52 | 0.63 | 16.7 | 2 | 結腸、直腸和肛門癌 | 3 | 18.21 | 9.73 | 0.84 | 12.0 |
| 3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 8 | 24.07 | 13.61 | 1.00 | 11.9 | 3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 5 | 29.82 | 18.19 | 1.14 | 11.9 | 3 | 肝和肝內膽管癌 | 3 | 18.21 | 8.47 | 0.76 | 12.0 |
| 4 | 前列腺(攝護腺)癌 | 4 | 23.85 | 14.22 | 1.80 | 6.0 | 4 | 口腔癌 | 4 | 23.85 | 17.01 | 0.78 | 9.5 | 4 | 胰臟癌 | 3 | 18.21 | 6.96 | 2.79 | 12.0 |
| 5 | 女性乳房癌 | 2 | 12.14 | 8.64 | 0.69 | 3.0 | 5 | 前列腺(攝護腺)癌 | 4 | 23.85 | 14.22 | 1.80 | 9.5 | 5 | 女性乳房癌 | 2 | 12.14 | 8.64 | 0.69 | 8.0 |
| 6 | 口腔癌 | 4 | 12.03 | 8.35 | 0.73 | 6.0 | 6 | 胃癌 | 2 | 11.93 | 7.88 | 1.06 | 4.8 | 6 | 卵巢癌 | 1 | 6.07 | 5.83 | 1.03 | 4.0 |
| 7 | 胰臟癌 | 4 | 12.03 | 6.83 | 1.55 | 6.0 | 7 | 胰臟癌 | 1 | 5.96 | 5.51 | 0.67 | 2.4 | 7 | 鼻咽癌 | 1 | 6.07 | 4.21 | 4.69 | 4.0 |
| 8 | 卵巢癌 | 1 | 6.07 | 5.83 | 1.03 | 1.5 | 8 | 白血病 | 1 | 5.96 | 4.37 | 1.19 | 2.4 | 8 | 子宮體癌 | 1 | 6.07 | 3.88 | 2.20 | 4.0 |
| 9 | 子宮體癌 | 1 | 6.07 | 3.88 | 2.20 | 1.5 | 9 | 腦癌 | 1 | 5.96 | 4.33 | 2.30 | 2.4 | 9 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 1 | 6.07 | 3.88 | 1.28 | 4.0 |
| 10 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 1 | 6.07 | 3.88 | 1.28 | 1.5 | 10 | 鼻咽癌 | 1 | 5.96 | 4.33 | 0.89 | 2.4 | 10 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 1 | 6.07 | 3.48 | 1.35 | 4.0 |
| | 其他非十大癌症死因 | 16 | 48.14 | 29.29 | 0.74 | 23.9 | | 其他非十大癌症死因 | 6 | 35.78 | 22.90 | 0.62 | 14.3 | | 其他非十大癌症死因 | 3 | 18.21 | 8.86*- | 0.44 | 12.0 |
| 11 | 鼻咽癌 | 2 | 6.02 | 4.34 | 1.48 | 3.0 | 11 | 喉癌 | 1 | 5.96 | 4.20 | 2.28 | 2.4 | 11 | 腦癌 | 1 | 6.07 | 2.75 | 3.49 | 4.0 |
| 12 | 胃癌 | 2 | 6.02 | 3.89 | 0.62 | 3.0 | 12 | 鼻腔、中耳和副鼻竇癌 | 1 | 5.96 | 3.46 | 13.55 | 2.4 | 12 | 喉癌 | 1 | 6.07 | 2.24 | 39.19 | 4.0 |
| 13 | 腦癌 | 2 | 6.02 | 3.70 | 2.76 | 3.0 | 13 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 1 | 5.96 | 3.34 | 1.00 | 2.4 | | | | | | | |
| 14 | 喉癌 | 2 | 6.02 | 3.35 | 4.29 | 3.0 | 14 | 食道癌 | 1 | 5.96 | 3.34*- | 0.34 | 2.4 | | | | | | | |
| 15 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 2 | 6.02 | 3.26 | 1.15 | 3.0 | | | | | | | | | | | | | | |

附 註：1. 彰化縣北斗鎮年中人口數 計33,239人 男性16,769人 女性16,470人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣員林市癌症死亡原因

民國105年(2016年)

| 合 計 | | | | | | | 男 性 | | | | | | | 女 性 | | | | | | |
|-----|------------------------------|----------|------------------|------------|-----------|----------------|-----|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|-----|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|
| 順位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % |
| | 所有癌症死因 | 283 | 226.61 | 151.87 | 1.10 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 169 | 271.88 | 194.74 | 1.04 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 114 | 181.75 | 115.16*+ | 1.24* | 100.0 |
| | 十大癌症死因 | 210 | 168.16 | 113.77 | 1.04 | 74.2 | | 十大癌症死因 | 137 | 220.40 | 158.81 | 1.04 | 81.1 | | 十大癌症死因 | 88 | 140.30 | 89.89*+ | 1.27* | 77.2 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 56 | 44.84 | 29.43 | 1.00 | 19.8 | 1 | 肝和肝內膽管癌 | 34 | 54.70 | 39.53 | 1.10 | 20.1 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 23 | 36.67 | 23.84 | 1.28 | 20.2 |
| 2 | 肝和肝內膽管癌 | 42 | 33.63 | 22.66 | 0.93 | 14.8 | 2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 33 | 53.09 | 36.70 | 0.88 | 19.5 | 2 | 女性乳房癌 | 17 | 27.10 | 19.17 | 1.60 | 14.9 |
| 3 | 女性乳房癌 | 17 | 27.10 | 19.17 | 1.60 | 6.0 | 3 | 口腔癌 | 15 | 24.13 | 18.81 | 0.82 | 8.9 | 3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 17 | 27.10 | 17.35 | 1.41 | 14.9 |
| 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 31 | 24.82 | 16.88 | 1.14 | 11.0 | 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 14 | 22.52 | 16.36 | 0.93 | 8.3 | 4 | 肝和肝內膽管癌 | 8 | 12.75 | 7.45 | 0.60 | 7.0 |
| 5 | 口腔癌 | 15 | 12.01 | 9.05 | 0.76 | 5.3 | 5 | 食道癌 | 10 | 16.09 | 10.63 | 0.97 | 5.9 | 5 | 胃癌 | 6 | 9.57 | 5.50 | 1.36 | 5.3 |
| 6 | 前列腺(攝護腺)癌 | 7 | 11.26 | 7.13 | 0.97 | 2.5 | 6 | 胰臟癌 | 8 | 12.87 | 8.57 | 1.55 | 4.7 | 6 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 5 | 7.97 | 4.46 | 1.97 | 4.4 |
| 7 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 11 | 8.81 | 7.25 | 1.86 | 3.9 | 7 | 前列腺(攝護腺)癌 | 7 | 11.26 | 7.13 | 0.97 | 4.1 | 7 | 腎臟癌 | 3 | 4.78 | 3.32 | 2.46 | 2.6 |
| 8 | 食道癌 | 11 | 8.81 | 5.44 | 0.98 | 3.9 | 8 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 6 | 9.65 | 9.74 | 1.78 | 3.6 | 8 | 腦癌 | 3 | 4.78 | 3.23 | 2.95 | 2.6 |
| 9 | 胰臟癌 | 10 | 8.01 | 5.46 | 1.11 | 3.5 | 9 | 腦癌 | 5 | 8.04 | 6.13 | 3.21* | 3.0 | 9 | 卵巢癌 | 3 | 4.78 | 2.96 | 0.86 | 2.6 |
| 10 | 胃癌 | 10 | 8.01 | 4.84 | 0.93 | 3.5 | 10 | 膀胱癌 | 5 | 8.04 | 5.21 | 1.70 | 3.0 | 10 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 3 | 4.78 | 2.61 | 1.11 | 2.6 |
| | 其他非十大癌症死因 | 73 | 58.45 | 38.11*+ | 1.34* | 25.8 | | 其他非十大癌症死因 | 32 | 51.48 | 35.93 | 1.06 | 18.9 | | 其他非十大癌症死因 | 26 | 41.45 | 25.27 | 1.15 | 22.8 |
| 11 | 腦癌 | 8 | 6.41 | 4.60 | 3.07* | 2.8 | 11 | 胃癌 | 4 | 6.44 | 4.26 | 0.63 | 2.4 | 11 | 胰臟癌 | 2 | 3.19 | 2.65 | 0.53 | 1.8 |
| 12 | 膀胱癌 | 7 | 5.61 | 3.24 | 1.85 | 2.5 | 12 | 白血病 | 3 | 4.83 | 3.47 | 1.02 | 1.8 | 12 | 子宮體癌 | 2 | 3.19 | 2.42 | 1.17 | 1.8 |
| 13 | 卵巢癌 | 3 | 4.78 | 2.96 | 0.86 | 1.1 | 13 | 鼻咽癌 | 2 | 3.22 | 2.41 | 0.51 | 1.2 | 13 | 白血病 | 2 | 3.19 | 1.92 | 0.68 | 1.8 |
| 14 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 3 | 4.78 | 2.61 | 1.11 | 1.1 | 14 | 黑色素瘤和其他皮膚癌 | 2 | 3.22 | 2.13 | 2.57 | 1.2 | 14 | 膽囊和其他膽道癌 | 2 | 3.19 | 1.68 | 1.13 | 1.8 |
| 15 | 白血病 | 5 | 4.00 | 2.64 | 0.85 | 1.8 | 15 | 喉癌 | 2 | 3.22 | 2.11 | 1.35 | 1.2 | 15 | 膀胱癌 | 2 | 3.19 | 1.37 | 2.45 | 1.8 |

附 註：1. 彰化縣員林市年中人口數 計124,884人 男性62,160人 女性62,724人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣溪湖鎮癌症死亡原因

民國105年(2016年)

| 合 計 | | | | | | | 男 性 | | | | | | 女 性 | | | | | | | |
|--------|------------------------------|----------|------------------|------------|-----------|----------------|--------|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|--------|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|
| 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % |
| | 所有癌症死因 | 140 | 251.31 | 159.60 | 1.20* | 100.0 | | 所有癌症死因 | 97 | 342.44 | 234.75*+ | 1.31* | 100.0 | | 所有癌症死因 | 43 | 157.04 | 94.43 | 1.01 | 100.0 |
| | 十大癌症死因 | 110 | 197.46 | 127.07 | 1.20 | 78.6 | | 十大癌症死因 | 81 | 285.96 | 194.47 | 1.30* | 83.5 | | 十大癌症死因 | 38 | 138.78 | 88.12 | 1.18 | 88.4 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 26 | 46.67 | 27.30 | 1.01 | 18.6 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 20 | 70.61 | 45.35 | 1.17 | 20.6 | 1 | 肝和肝內膽管癌 | 10 | 36.52 | 22.66 | 1.62 | 23.3 |
| 2 | 肝和肝內膽管癌 | 25 | 44.88 | 31.07 | 1.23 | 17.9 | 2 | 肝和肝內膽管癌 | 15 | 52.95 | 39.13 | 1.07 | 15.5 | 2 | 結腸、直腸和肛門癌 | 9 | 32.87 | 22.05 | 1.55 | 20.9 |
| 3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 21 | 37.70 | 24.47 | 1.65* | 15.0 | 3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 12 | 42.36 | 28.19 | 1.74 | 12.4 | 3 | 氣管、支氣管和肺癌 | 6 | 21.91 | 11.95 | 0.71 | 14.0 |
| 4 | 前列腺(攝護腺)癌 | 6 | 21.18 | 12.85 | 1.76 | 4.3 | 4 | 食道癌 | 6 | 21.18 | 15.66 | 1.31 | 6.2 | 4 | 女性乳房癌 | 4 | 14.61 | 11.21 | 0.89 | 9.3 |
| 5 | 女性乳房癌 | 4 | 14.61 | 11.21 | 0.89 | 2.9 | 5 | 口腔癌 | 6 | 21.18 | 15.46 | 0.74 | 6.2 | 5 | 腎臟癌 | 3 | 10.96 | 6.97 | 5.26* | 7.0 |
| 6 | 胃癌 | 7 | 12.57 | 7.49 | 1.38 | 5.0 | 6 | 前列腺(攝護腺)癌 | 6 | 21.18 | 12.85 | 1.76 | 6.2 | 6 | 胃癌 | 2 | 7.30 | 2.45 | 0.95 | 4.7 |
| 7 | 食道癌 | 6 | 10.77 | 7.98 | 1.24 | 4.3 | 7 | 胃癌 | 5 | 17.65 | 12.79 | 1.71 | 5.2 | 7 | 胸腺癌 | 1 | 3.65 | 2.83 | 12.08 | 2.3 |
| 8 | 口腔癌 | 6 | 10.77 | 7.68 | 0.69 | 4.3 | 8 | 鼻咽癌 | 4 | 14.12 | 9.99 | 2.27 | 4.1 | 8 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 1 | 3.65 | 2.79 | 0.83 | 2.3 |
| 9 | 胰臟癌 | 5 | 8.98 | 5.05 | 1.24 | 3.6 | 9 | 胰臟癌 | 4 | 14.12 | 8.70 | 1.71 | 4.1 | 9 | 胰臟癌 | 1 | 3.65 | 2.79 | 0.61 | 2.3 |
| 10 | 鼻咽癌 | 4 | 7.18 | 5.08 | 1.90 | 2.9 | 10 | 膀胱癌 | 3 | 10.59 | 6.34 | 2.20 | 3.1 | 10 | 卵巢癌 | 1 | 3.65 | 2.43 | 0.67 | 2.3 |
| | 其他非十大癌症死因 | 30 | 53.85 | 32.53 | 1.18 | 21.4 | | 其他非十大癌症死因 | 16 | 56.49 | 40.28 | 1.42 | 16.5 | | 其他非十大癌症死因 | 5 | 18.26 | 6.31*- | 0.48 | 11.6 |
| 11 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 3 | 5.39 | 3.77 | 1.08 | 2.1 | 11 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 2 | 7.06 | 5.16 | 1.28 | 2.1 | 11 | 白血病 | 1 | 3.65 | 1.03 | 0.76 | 2.3 |
| 12 | 腎臟癌 | 3 | 5.39 | 3.65 | 3.10 | 2.1 | 12 | 甲狀腺癌 | 1 | 3.53 | 3.08 | 4.43 | 1.0 | | | | | | | |
| 13 | 膀胱癌 | 3 | 5.39 | 2.07 | 1.66 | 2.1 | 13 | 小腸癌 | 1 | 3.53 | 2.78 | 6.34 | 1.0 | | | | | | | |
| 14 | 卵巢癌 | 1 | 3.65 | 2.43 | 0.67 | 0.7 | 14 | 心臟、縱隔和胸(肋)膜癌 | 1 | 3.53 | 2.31 | 8.46 | 1.0 | | | | | | | |
| 15 | 甲狀腺癌 | 1 | 1.80 | 1.46 | 2.27 | 0.7 | 15 | 膽囊和其他膽道癌 | 1 | 3.53 | 2.11 | 1.88 | 1.0 | | | | | | | |

附 註：1. 彰化縣溪湖鎮年中人口數 計55,708人 男性28,326人 女性27,382人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣田中鎮癌症死亡原因

民國105年(2016年)

| 合 計 | | | | | | | 男 性 | | | | | | | 女 性 | | | | | | |
|--------|------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------|------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------|------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|
| 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死 亡 人 數 | 每十萬 死 亡 率 | 標 準 化 死 亡 率 | 標 準 死 亡 比 | 死 亡 百 分 比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死 亡 人 數 | 每十萬 死 亡 率 | 標 準 化 死 亡 率 | 標 準 死 亡 比 | 死 亡 百 分 比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死 亡 人 數 | 每十萬 死 亡 率 | 標 準 化 死 亡 率 | 標 準 死 亡 比 | 死 亡 百 分 比 % |
| | 所有癌症死因 | 84 | 198.48 | 102.69*- | 0.77* | 100.0 | | 所有癌症死因 | 50 | 228.64 | 118.55*- | 0.67* | 100.0 | | 所有癌症死因 | 34 | 166.23 | 86.48 | 0.93 | 100.0 |
| | 十大癌症死因 | 72 | 170.13 | 87.63 | 0.86 | 85.7 | | 十大癌症死因 | 42 | 192.06 | 101.62*- | 0.70* | 84.0 | | 十大癌症死因 | 32 | 156.45 | 79.26 | 1.29 | 94.1 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 22 | 51.98 | 25.55 | 0.89 | 26.2 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 10 | 45.73 | 21.60*- | 0.55 | 20.0 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 12 | 58.67 | 29.76 | 1.62 | 35.3 |
| 2 | 女性乳房癌 | 6 | 29.33 | 18.18 | 1.57 | 7.1 | 2 | 肝和肝內膽管癌 | 7 | 32.01 | 18.13*- | 0.50 | 14.0 | 2 | 女性乳房癌 | 6 | 29.33 | 18.18 | 1.57 | 17.6 |
| 3 | 肝和肝內膽管癌 | 10 | 23.63 | 13.87*- | 0.53* | 11.9 | 3 | 口腔癌 | 5 | 22.86 | 16.04 | 0.70 | 10.0 | 3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 5 | 24.45 | 10.61 | 1.01 | 14.7 |
| 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 10 | 23.63 | 10.93 | 0.84 | 11.9 | 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 5 | 22.86 | 11.19 | 0.70 | 10.0 | 4 | 肝和肝內膽管癌 | 3 | 14.67 | 9.47 | 0.55 | 8.8 |
| 5 | 前列腺(攝護腺)癌 | 4 | 18.29 | 5.68 | 0.97 | 4.8 | 5 | 胃癌 | 4 | 18.29 | 8.30 | 1.23 | 8.0 | 5 | 白血病 | 3 | 14.67 | 4.91 | 2.69 | 8.8 |
| 6 | 胃癌 | 6 | 14.18 | 5.70 | 1.23 | 7.1 | 6 | 前列腺(攝護腺)癌 | 4 | 18.29 | 5.68 | 0.97 | 8.0 | 6 | 胃癌 | 2 | 9.78 | 3.26 | 1.10 | 5.9 |
| 7 | 口腔癌 | 5 | 11.81 | 8.22 | 0.67 | 6.0 | 7 | 食道癌 | 3 | 13.72 | 9.63 | 0.73 | 6.0 | 7 | 鼻咽癌 | 1 | 4.89 | 3.07 | 3.56 | 2.9 |
| 8 | 白血病 | 5 | 11.81 | 4.31 | 2.13 | 6.0 | 8 | 白血病 | 2 | 9.15 | 3.42 | 1.64 | 4.0 | | | | | | | |
| 9 | 食道癌 | 3 | 7.09 | 4.97 | 0.71 | 3.6 | 9 | 膽囊和其他膽道癌 | 1 | 4.57 | 4.44 | 1.58 | 2.0 | | | | | | | |
| 10 | 膽囊和其他膽道癌 | 1 | 2.36 | 2.39 | 0.76 | 1.2 | 10 | 骨和關節軟骨癌 | 1 | 4.57 | 3.19 | 29.76 | 2.0 | | | | | | | |
| | 其他非十大癌症死因 | 12 | 28.35 | 15.06*- | 0.47* | 14.3 | | 其他非十大癌症死因 | 8 | 36.58 | 16.93*- | 0.53 | 16.0 | | 其他非十大癌症死因 | 2 | 9.78 | 7.22*- | 0.17* | 5.9 |
| 11 | 骨和關節軟骨癌 | 1 | 2.36 | 1.64 | 5.85 | 1.2 | 11 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 1 | 4.57 | 3.02 | 0.65 | 2.0 | | | | | | | |
| 12 | 鼻咽癌 | 1 | 2.36 | 1.52 | 0.53 | 1.2 | 12 | 喉癌 | 1 | 4.57 | 2.84 | 1.41 | 2.0 | | | | | | | |
| 13 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 1 | 2.36 | 1.52 | 0.39 | 1.2 | 13 | 胰臟癌 | 1 | 4.57 | 2.16 | 0.42 | 2.0 | | | | | | | |
| 14 | 喉癌 | 1 | 2.36 | 1.47 | 1.46 | 1.2 | 14 | 膀胱癌 | 1 | 4.57 | 1.26 | 0.64 | 2.0 | | | | | | | |
| 15 | 胰臟癌 | 1 | 2.36 | 1.04*- | 0.27 | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | |

附 註：1. 彰化縣田中鎮年中人口數 計42,321人 男性21,868人 女性20,454人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣二林鎮癌症死亡原因

民國105年(2016年)

| 合 計 | | | | | | | 男 性 | | | | | | 女 性 | | | | | | | |
|--------|------------------------------|----------|------------------|------------|-----------|----------------|--------|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|--------|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|
| 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % |
| | 所有癌症死因 | 139 | 268.86 | 137.31 | 1.01 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 86 | 322.80 | 182.97 | 1.00 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 53 | 211.51 | 93.94 | 1.04 | 100.0 |
| | 十大癌症死因 | 114 | 220.51 | 110.91 | 1.09 | 82.0 | | 十大癌症死因 | 74 | 277.76 | 155.13 | 1.02 | 86.0 | | 十大癌症死因 | 47 | 187.56 | 87.46 | 1.19 | 88.7 |
| 1 | 肝和肝內膽管癌 | 30 | 58.03 | 27.63 | 1.24 | 21.6 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 21 | 78.82 | 40.88 | 1.02 | 24.4 | 1 | 肝和肝內膽管癌 | 13 | 51.88 | 22.81 | 1.69 | 24.5 |
| 2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 30 | 58.03 | 27.53 | 0.95 | 21.6 | 2 | 肝和肝內膽管癌 | 17 | 63.81 | 33.64 | 1.04 | 19.8 | 2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 9 | 35.92 | 17.73 | 0.86 | 17.0 |
| 3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 17 | 32.88 | 16.47 | 1.12 | 12.2 | 3 | 口腔癌 | 12 | 45.04 | 27.53 | 1.36 | 14.0 | 3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 9 | 35.92 | 15.32 | 1.27 | 17.0 |
| 4 | 口腔癌 | 13 | 25.15 | 14.48 | 1.41 | 9.4 | 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 8 | 30.03 | 16.82 | 0.98 | 9.3 | 4 | 胃癌 | 5 | 19.95 | 7.85 | 1.94 | 9.4 |
| 5 | 前列腺(攝護腺)癌 | 4 | 15.01 | 6.46 | 0.92 | 2.9 | 5 | 鼻咽癌 | 4 | 15.01 | 10.09 | 2.03 | 4.7 | 5 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 3 | 11.97 | 7.91 | 2.10 | 5.7 |
| 6 | 胃癌 | 7 | 13.54 | 6.54 | 1.13 | 5.0 | 6 | 前列腺(攝護腺)癌 | 4 | 15.01 | 6.46 | 0.92 | 4.7 | 6 | 胰臟癌 | 2 | 7.98 | 3.88 | 1.02 | 3.8 |
| 7 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 3 | 11.97 | 7.91 | 2.10 | 2.2 | 7 | 胰臟癌 | 2 | 7.51 | 5.96 | 0.74 | 2.3 | 7 | 女性乳房癌 | 2 | 7.98 | 3.48*- | 0.42 | 3.8 |
| 8 | 女性乳房癌 | 2 | 7.98 | 3.48*- | 0.42 | 1.4 | 8 | 食道癌 | 2 | 7.51 | 5.34 | 0.40 | 2.3 | 8 | 白血病 | 2 | 7.98 | 3.18 | 1.36 | 3.8 |
| 9 | 鼻咽癌 | 4 | 7.74 | 5.24 | 1.73 | 2.9 | 9 | 胃癌 | 2 | 7.51 | 4.46 | 0.56 | 2.3 | 9 | 子宮體癌 | 1 | 3.99 | 2.89 | 1.43 | 1.9 |
| 10 | 胰臟癌 | 4 | 7.74 | 4.87 | 0.85 | 2.9 | 10 | 喉癌 | 2 | 7.51 | 3.95 | 2.48 | 2.3 | 10 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 1 | 3.99 | 2.41 | 0.69 | 1.9 |
| | 其他非十大癌症死因 | 25 | 48.36 | 26.40 | 0.74 | 18.0 | | 其他非十大癌症死因 | 12 | 45.04 | 27.84 | 0.86 | 14.0 | | 其他非十大癌症死因 | 6 | 23.94 | 6.47*- | 0.54 | 11.3 |
| 11 | 白血病 | 3 | 5.80 | 3.01 | 1.02 | 2.2 | 11 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 2 | 7.51 | 3.92 | 1.10 | 2.3 | 11 | 膽囊和其他膽道癌 | 1 | 3.99 | 1.39 | 1.00 | 1.9 |
| 12 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 3 | 5.80 | 3.01 | 0.92 | 2.2 | 12 | 膽囊和其他膽道癌 | 2 | 7.51 | 3.16 | 3.02 | 2.3 | 12 | 小腸癌 | 1 | 3.99 | 0.76 | 4.02 | 1.9 |
| 13 | 膽囊和其他膽道癌 | 3 | 5.80 | 2.04 | 1.79 | 2.2 | 13 | 間皮和軟組織癌 | 1 | 3.75 | 2.94 | 2.79 | 1.2 | 13 | 口腔癌 | 1 | 3.99 | 0.76 | 1.68 | 1.9 |
| 14 | 子宮體癌 | 1 | 3.99 | 2.89 | 1.43 | 0.7 | 14 | 腦癌 | 1 | 3.75 | 2.40 | 1.33 | 1.2 | 14 | 卵巢癌 | 1 | 3.99 | 0.76*- | 0.60 | 1.9 |
| 15 | 卵巢癌 | 1 | 3.99 | 0.76*- | 0.60 | 0.7 | 15 | 主唾液腺癌 | 1 | 3.75 | 2.35 | 4.47 | 1.2 | | | | | | | |

附 註：1. 彰化縣二林鎮年中人口數 計51,699人 男性26,642人 女性25,058人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣線西鄉癌症死亡原因

民國105年(2016年)

| 合 計 | | | | | | | 男 性 | | | | | | 女 性 | | | | | | | |
|--------|------------------------------|----------|------------------|------------|-----------|----------------|--------|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|--------|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|
| 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % |
| | 所有癌症死因 | 41 | 241.32 | 141.38 | 1.13 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 27 | 307.55 | 194.75 | 1.11 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 14 | 170.52 | 80.75 | 1.12 | 100.0 |
| | 十大癌症死因 | 38 | 223.66 | 132.92 | 1.33 | 92.7 | | 十大癌症死因 | 26 | 296.16 | 187.89 | 1.30 | 96.3 | | 十大癌症死因 | 13 | 158.34 | 76.76 | 1.84 | 92.9 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 11 | 64.74 | 35.68 | 1.38 | 26.8 | 1 | 肝和肝內膽管癌 | 8 | 91.13 | 59.23 | 1.74 | 29.6 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 4 | 48.72 | 26.15 | 1.62 | 28.6 |
| 2 | 肝和肝內膽管癌 | 8 | 47.09 | 29.24 | 1.27 | 19.5 | 2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 7 | 79.74 | 45.47 | 1.24 | 25.9 | 2 | 食道癌 | 2 | 24.36 | 9.25 | 33.66* | 14.3 |
| 3 | 口腔癌 | 6 | 35.31 | 21.66 | 2.21 | 14.6 | 3 | 口腔癌 | 5 | 56.95 | 36.51 | 1.88 | 18.5 | 3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 2 | 24.36 | 8.61 | 1.18 | 14.3 |
| 4 | 食道癌 | 3 | 17.66 | 9.88 | 1.98 | 7.3 | 4 | 白血病 | 1 | 11.39 | 10.03 | 2.32 | 3.7 | 4 | 白血病 | 1 | 12.18 | 10.90 | 2.55 | 7.1 |
| 5 | 結腸、直腸和肛門癌 | 3 | 17.66 | 8.67 | 0.75 | 7.3 | 5 | 食道癌 | 1 | 11.39 | 9.05 | 0.66 | 3.7 | 5 | 女性乳房癌 | 1 | 12.18 | 8.02 | 0.74 | 7.1 |
| 6 | 女性乳房癌 | 1 | 12.18 | 8.02 | 0.74 | 2.4 | 6 | 胃癌 | 1 | 11.39 | 7.51 | 1.03 | 3.7 | 6 | 胃癌 | 1 | 12.18 | 5.85 | 1.63 | 7.1 |
| 7 | 白血病 | 2 | 11.77 | 10.45 | 2.42 | 4.9 | 7 | 胰臟癌 | 1 | 11.39 | 7.32 | 1.31 | 3.7 | 7 | 口腔癌 | 1 | 12.18 | 3.99 | 7.63 | 7.1 |
| 8 | 胃癌 | 2 | 11.77 | 6.96 | 1.28 | 4.9 | 8 | 結腸、直腸和肛門癌 | 1 | 11.39 | 6.86 | 0.43 | 3.7 | 8 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 1 | 12.18 | 3.99 | 2.86 | 7.1 |
| 9 | 前列腺(攝護腺)癌 | 1 | 11.39 | 5.90 | 0.86 | 2.4 | 9 | 前列腺(攝護腺)癌 | 1 | 11.39 | 5.90 | 0.86 | 3.7 | | | | | | | |
| 10 | 胰臟癌 | 1 | 5.89 | 3.91 | 0.80 | 2.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他非十大癌症死因 | 3 | 17.66 | 8.46*- | 0.39 | 7.3 | | 其他非十大癌症死因 | 1 | 11.39 | 6.86*- | 0.23 | 3.7 | | 其他非十大癌症死因 | 1 | 12.18 | 3.99*- | 0.18 | 7.1 |
| 11 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 1 | 5.89 | 2.38 | 1.16 | 2.4 | | | | | | | | | | | | | | |

附 註：1. 彰化縣線西鄉年中人口數 計16,990人 男性8,779人 女性8,210人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣伸港鄉癌症死亡原因

民國105年(2016年)

| 合 計 | | | | | | | 男 性 | | | | | | 女 性 | | | | | | | |
|--------|------------------------------|----------|------------------|------------|-----------|----------------|--------|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|--------|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|
| 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % |
| | 所有癌症死因 | 67 | 183.01 | 130.32 | 0.94 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 39 | 208.50 | 154.32 | 0.85 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 28 | 156.38 | 110.59 | 1.10 | 100.0 |
| | 十大癌症死因 | 51 | 139.31 | 97.62 | 1.07 | 76.1 | | 十大癌症死因 | 38 | 203.15 | 150.63 | 1.01 | 97.4 | | 十大癌症死因 | 22 | 122.87 | 90.90 | 1.22 | 78.6 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 14 | 38.24 | 26.22 | 0.90 | 20.9 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 12 | 64.15 | 47.39 | 1.14 | 30.8 | 1 | 肝和肝內膽管癌 | 5 | 27.93 | 18.58 | 1.35 | 17.9 |
| 2 | 肝和肝內膽管癌 | 12 | 32.78 | 22.56 | 0.96 | 17.9 | 2 | 肝和肝內膽管癌 | 7 | 37.42 | 27.42 | 0.80 | 17.9 | 2 | 卵巢癌 | 4 | 22.34 | 14.05 | 4.27* | 14.3 |
| 3 | 卵巢癌 | 4 | 22.34 | 14.05 | 4.27* | 6.0 | 3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 4 | 21.38 | 15.97 | 0.93 | 10.3 | 3 | 女性乳房癌 | 2 | 11.17 | 9.49 | 0.71 | 7.1 |
| 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 6 | 16.39 | 12.65 | 0.78 | 9.0 | 4 | 膀胱癌 | 4 | 21.38 | 14.45 | 4.79* | 10.3 | 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 2 | 11.17 | 8.87 | 0.59 | 7.1 |
| 5 | 女性乳房癌 | 2 | 11.17 | 9.49 | 0.71 | 3.0 | 5 | 食道癌 | 3 | 16.04 | 11.98 | 1.02 | 7.7 | 5 | 白血病 | 2 | 11.17 | 8.83 | 2.51 | 7.1 |
| 6 | 膀胱癌 | 4 | 10.93 | 6.67 | 3.73* | 6.0 | 6 | 鼻咽癌 | 2 | 10.69 | 8.36 | 1.79 | 5.1 | 6 | 胰臟癌 | 2 | 11.17 | 8.13 | 2.02 | 7.1 |
| 7 | 前列腺(攝護腺)癌 | 2 | 10.69 | 7.21 | 0.97 | 3.0 | 7 | 口腔癌 | 2 | 10.69 | 7.32*- | 0.38 | 5.1 | 7 | 氣管、支氣管和肺癌 | 2 | 11.17 | 7.35 | 0.40 | 7.1 |
| 8 | 鼻咽癌 | 3 | 8.19 | 6.90 | 2.26 | 4.5 | 8 | 前列腺(攝護腺)癌 | 2 | 10.69 | 7.21 | 0.97 | 5.1 | 8 | 鼻咽癌 | 1 | 5.59 | 5.77 | 4.84 | 3.6 |
| 9 | 食道癌 | 3 | 8.19 | 6.06 | 0.98 | 4.5 | 9 | 間皮和軟組織癌 | 1 | 5.35 | 5.43 | 4.82 | 2.6 | 9 | 甲狀腺癌 | 1 | 5.59 | 4.98 | 8.72 | 3.6 |
| 10 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 1 | 5.59 | 3.64 | 1.34 | 1.5 | 10 | 胃癌 | 1 | 5.35 | 5.11 | 0.55 | 2.6 | 10 | 心臟、縱隔和胸(肋)膜癌 | 1 | 5.59 | 4.84 | 34.95 | 3.6 |
| | 其他非十大癌症死因 | 16 | 43.70 | 32.70 | 0.67 | 23.9 | | 其他非十大癌症死因 | 1 | 5.35 | 3.69*- | 0.12* | 2.6 | | 其他非十大癌症死因 | 6 | 33.51 | 19.69 | 0.81 | 21.4 |
| 11 | 白血病 | 2 | 5.46 | 4.35 | 1.20 | 3.0 | | | | | | | | 11 | 小腸癌 | 1 | 5.59 | 4.84 | 8.22 | 3.6 |
| 12 | 胰臟癌 | 2 | 5.46 | 4.15 | 0.81 | 3.0 | | | | | | | | 12 | 腦癌 | 1 | 5.59 | 3.64 | 3.62 | 3.6 |
| 13 | 口腔癌 | 2 | 5.46 | 3.57*- | 0.36 | 3.0 | | | | | | | | 13 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 1 | 5.59 | 3.64 | 1.34 | 3.6 |
| 14 | 間皮和軟組織癌 | 1 | 2.73 | 2.80 | 2.08 | 1.5 | | | | | | | | 14 | 腎臟癌 | 1 | 5.59 | 2.37 | 2.92 | 3.6 |
| 15 | 胃癌 | 1 | 2.73 | 2.67 | 0.33 | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | |

附 註：1. 彰化縣伸港鄉年中人口數 計36,610人 男性18,705人 女性17,905人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣福興鄉癌症死亡原因

民國105年(2016年)

| 合 計 | | | | | | | 男 性 | | | | | | | 女 性 | | | | | | |
|--------|------------------------------|----------|------------------|------------|-----------|----------------|--------|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|--------|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|
| 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % |
| | 所有癌症死因 | 95 | 199.80 | 121.84 | 0.90 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 67 | 270.43 | 181.74 | 0.98 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 28 | 122.95 | 62.14*- | 0.75 | 100.0 |
| | 十大癌症死因 | 74 | 155.63 | 95.54 | 0.93 | 77.9 | | 十大癌症死因 | 56 | 226.03 | 153.63 | 0.98 | 83.6 | | 十大癌症死因 | 24 | 105.38 | 52.04 | 0.88 | 85.7 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 23 | 48.37 | 30.94 | 0.99 | 24.2 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 19 | 76.69 | 53.11 | 1.19 | 28.4 | 1 | 肝和肝內膽管癌 | 6 | 26.35 | 10.54 | 1.09 | 21.4 |
| 2 | 肝和肝內膽管癌 | 12 | 25.24 | 15.16 | 0.66 | 12.6 | 2 | 口腔癌 | 9 | 36.33 | 24.80 | 1.21 | 13.4 | 2 | 女性乳房癌 | 4 | 17.56 | 10.87 | 1.04 | 14.3 |
| 3 | 口腔癌 | 9 | 18.93 | 12.73 | 1.18 | 9.5 | 3 | 肝和肝內膽管癌 | 6 | 24.22 | 17.24*- | 0.47 | 9.0 | 3 | 氣管、支氣管和肺癌 | 4 | 17.56 | 10.18 | 0.53 | 14.3 |
| 4 | 女性乳房癌 | 4 | 17.56 | 10.87 | 1.04 | 4.2 | 4 | 食道癌 | 6 | 24.22 | 15.08 | 1.42 | 9.0 | 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 3 | 13.17 | 5.27*- | 0.59 | 10.7 |
| 5 | 結腸、直腸和肛門癌 | 7 | 14.72 | 7.94 | 0.61 | 7.4 | 5 | 結腸、直腸和肛門癌 | 4 | 16.15 | 10.38 | 0.62 | 6.0 | 5 | 胃癌 | 2 | 8.78 | 3.99 | 1.08 | 7.1 |
| 6 | 食道癌 | 6 | 12.62 | 7.72 | 1.40 | 6.3 | 6 | 胃癌 | 4 | 16.15 | 8.50 | 1.46 | 6.0 | 6 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 1 | 4.39 | 3.97 | 0.94 | 3.6 |
| 7 | 胃癌 | 6 | 12.62 | 5.69 | 1.31 | 6.3 | 7 | 鼻咽癌 | 3 | 12.11 | 8.64 | 1.85 | 4.5 | 7 | 鼻咽癌 | 1 | 4.39 | 2.78 | 3.48 | 3.6 |
| 8 | 鼻咽癌 | 4 | 8.41 | 5.63 | 2.14 | 4.2 | 8 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 2 | 8.07 | 5.47 | 1.38 | 3.0 | 8 | 間皮和軟組織癌 | 1 | 4.39 | 2.03 | 2.52 | 3.6 |
| 9 | 前列腺(攝護腺)癌 | 2 | 8.07 | 5.43 | 0.61 | 2.1 | 9 | 前列腺(攝護腺)癌 | 2 | 8.07 | 5.43 | 0.61 | 3.0 | 9 | 甲狀腺癌 | 1 | 4.39 | 1.21 | 5.51 | 3.6 |
| 10 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 1 | 4.39 | 3.97 | 0.94 | 1.1 | 10 | 白血病 | 1 | 4.04 | 4.96 | 0.81 | 1.5 | 10 | 胰臟癌 | 1 | 4.39 | 1.21*- | 0.70 | 3.6 |
| | 其他非十大癌症死因 | 21 | 44.17 | 26.30 | 0.83 | 22.1 | | 其他非十大癌症死因 | 11 | 44.40 | 28.11 | 0.99 | 16.4 | | 其他非十大癌症死因 | 4 | 17.56 | 10.10*- | 0.40 | 14.3 |
| 11 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 2 | 4.21 | 2.70 | 0.80 | 2.1 | 11 | 胰臟癌 | 1 | 4.04 | 3.51 | 0.46 | 1.5 | | | | | | | |
| 12 | 胰臟癌 | 2 | 4.21 | 2.61 | 0.56 | 2.1 | 12 | 喉癌 | 1 | 4.04 | 2.55 | 1.64 | 1.5 | | | | | | | |
| 13 | 白血病 | 1 | 2.10 | 2.61 | 0.42 | 1.1 | 13 | 鼻腔、中耳和副鼻竇癌 | 1 | 4.04 | 2.52 | 9.02 | 1.5 | | | | | | | |
| 14 | 鼻腔、中耳和副鼻竇癌 | 1 | 2.10 | 1.36 | 6.81 | 1.1 | 14 | 腦癌 | 1 | 4.04 | 2.43 | 1.62 | 1.5 | | | | | | | |
| 15 | 喉癌 | 1 | 2.10 | 1.33 | 1.55 | 1.1 | 15 | 膀胱癌 | 1 | 4.04 | 2.15 | 0.79 | 1.5 | | | | | | | |

附 註：1. 彰化縣福興鄉年中人口數 計47,548人 男性24,775人 女性22,774人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣秀水鄉癌症死亡原因

民國105年(2016年)

| 合 計 | | | | | | | 男 性 | | | | | | 女 性 | | | | | | | |
|--------|------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------|------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------|------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|
| 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死 亡 人 數 | 每十萬 死 亡 率 | 標 準 化 死 亡 率 | 標 準 死 亡 比 | 死 亡 百 分 比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死 亡 人 數 | 每十萬 死 亡 率 | 標 準 化 死 亡 率 | 標 準 死 亡 比 | 死 亡 百 分 比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死 亡 人 數 | 每十萬 死 亡 率 | 標 準 化 死 亡 率 | 標 準 死 亡 比 | 死 亡 百 分 比 % |
| | 所有癌症死因 | 71 | 180.44 | 117.72 | 0.88 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 48 | 236.17 | 170.22 | 0.92 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 23 | 120.90 | 67.58 | 0.81 | 100.0 |
| | 十大癌症死因 | 56 | 142.32 | 93.25 | 1.01 | 78.9 | | 十大癌症死因 | 41 | 201.73 | 146.25 | 0.95 | 85.4 | | 十大癌症死因 | 20 | 105.13 | 57.74 | 1.00 | 87.0 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 16 | 40.66 | 27.00 | 0.91 | 22.5 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 11 | 54.12 | 38.80 | 0.92 | 22.9 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 5 | 26.28 | 16.50 | 0.89 | 21.7 |
| 2 | 肝和肝內膽管癌 | 11 | 27.96 | 20.33 | 0.79 | 15.5 | 2 | 肝和肝內膽管癌 | 8 | 39.36 | 30.53 | 0.81 | 16.7 | 2 | 結腸、直腸和肛門癌 | 4 | 21.03 | 7.36 | 1.04 | 17.4 |
| 3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 8 | 20.33 | 11.00 | 0.92 | 11.3 | 3 | 食道癌 | 4 | 19.68 | 14.31 | 1.19 | 8.3 | 3 | 肝和肝內膽管癌 | 3 | 15.77 | 10.09 | 0.73 | 13.0 |
| 4 | 食道癌 | 4 | 10.17 | 7.31 | 1.16 | 5.6 | 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 4 | 19.68 | 12.39 | 0.81 | 8.3 | 4 | 腎臟癌 | 2 | 10.51 | 6.33 | 5.19 | 8.7 |
| 5 | 膀胱癌 | 4 | 10.17 | 6.21 | 3.29 | 5.6 | 5 | 膀胱癌 | 3 | 14.76 | 11.02 | 3.20 | 6.3 | 5 | 膽囊和其他膽道癌 | 2 | 10.51 | 5.30 | 3.75 | 8.7 |
| 6 | 胰臟癌 | 4 | 10.17 | 6.21 | 1.45 | 5.6 | 6 | 胰臟癌 | 3 | 14.76 | 11.02 | 1.81 | 6.3 | 6 | 卵巢癌 | 1 | 5.26 | 4.49 | 0.97 | 4.3 |
| 7 | 前列腺(攝護腺)癌 | 2 | 9.84 | 6.67 | 0.85 | 2.8 | 7 | 胃癌 | 3 | 14.76 | 9.30 | 1.48 | 6.3 | 7 | 女性乳房癌 | 1 | 5.26 | 3.69*- | 0.33 | 4.3 |
| 8 | 腎臟癌 | 3 | 7.62 | 5.52 | 4.50 | 4.2 | 8 | 口腔癌 | 2 | 9.84 | 7.49*- | 0.34 | 4.2 | 8 | 膀胱癌 | 1 | 5.26 | 1.99 | 3.65 | 4.3 |
| 9 | 胃癌 | 3 | 7.62 | 4.37 | 0.87 | 4.2 | 9 | 前列腺(攝護腺)癌 | 2 | 9.84 | 6.67 | 0.85 | 4.2 | 9 | 胰臟癌 | 1 | 5.26 | 1.99 | 0.91 | 4.3 |
| 10 | 卵巢癌 | 1 | 5.26 | 4.49 | 0.97 | 1.4 | 10 | 腎臟癌 | 1 | 4.92 | 4.73 | 3.49 | 2.1 | | | | | | | |
| | 其他非十大癌症死因 | 15 | 38.12 | 24.46*- | 0.59* | 21.1 | | 其他非十大癌症死因 | 7 | 34.44 | 23.97 | 0.78 | 14.6 | | 其他非十大癌症死因 | 3 | 15.77 | 9.85*- | 0.36 | 13.0 |
| 11 | 女性乳房癌 | 1 | 5.26 | 3.69*- | 0.33 | 1.4 | 11 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 1 | 4.92 | 4.73 | 0.91 | 2.1 | | | | | | | |
| 12 | 口腔癌 | 2 | 5.08 | 3.67*- | 0.33 | 2.8 | 12 | 甲狀腺癌 | 1 | 4.92 | 2.87 | 6.49 | 2.1 | | | | | | | |
| 13 | 膽囊和其他膽道癌 | 2 | 5.08 | 2.74 | 2.17 | 2.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 1 | 2.54 | 2.30 | 0.53 | 1.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 甲狀腺癌 | 1 | 2.54 | 1.18 | 3.42 | 1.4 | | | | | | | | | | | | | | |

附 註：1. 彰化縣秀水鄉年中人口數 計39,348人 男性20,324人 女性19,024人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣花壇鄉癌症死亡原因

民國105年(2016年)

| 合 計 | | | | | | | 男 性 | | | | | | 女 性 | | | | | | | |
|--------|------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------|------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------|------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|
| 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死 亡 人 數 | 每十萬 死 亡 率 | 標 準 化 死 亡 率 | 標 準 死 亡 比 | 死 亡 百 分 比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死 亡 人 數 | 每十萬 死 亡 率 | 標 準 化 死 亡 率 | 標 準 死 亡 比 | 死 亡 百 分 比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死 亡 人 數 | 每十萬 死 亡 率 | 標 準 化 死 亡 率 | 標 準 死 亡 比 | 死 亡 百 分 比 % |
| | 所有癌症死因 | 96 | 208.41 | 133.35 | 1.00 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 61 | 257.69 | 176.34 | 0.98 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 35 | 156.31 | 92.28 | 1.05 | 100.0 |
| | 十大癌症死因 | 83 | 180.19 | 115.82 | 1.10 | 86.5 | | 十大癌症死因 | 57 | 240.79 | 166.05 | 1.12 | 93.4 | | 十大癌症死因 | 32 | 142.91 | 85.50 | 1.29 | 91.4 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 24 | 52.10 | 33.33 | 1.16 | 25.0 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 16 | 67.59 | 46.61 | 1.12 | 26.2 | 1 | 肝和肝內膽管癌 | 10 | 44.66 | 25.37 | 2.07 | 28.6 |
| 2 | 肝和肝內膽管癌 | 18 | 39.08 | 24.48 | 1.08 | 18.8 | 2 | 口腔癌 | 9 | 38.02 | 25.11 | 1.27 | 14.8 | 2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 8 | 35.73 | 21.25 | 1.22 | 22.9 |
| 3 | 口腔癌 | 9 | 19.54 | 12.55 | 1.21 | 9.4 | 3 | 肝和肝內膽管癌 | 8 | 33.80 | 23.44 | 0.68 | 13.1 | 3 | 女性乳房癌 | 3 | 13.40 | 9.69 | 0.79 | 8.6 |
| 4 | 食道癌 | 8 | 17.37 | 11.76 | 1.91 | 8.3 | 4 | 食道癌 | 8 | 33.80 | 23.43 | 1.99 | 13.1 | 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 3 | 13.40 | 7.29 | 0.68 | 8.6 |
| 5 | 結腸、直腸和肛門癌 | 8 | 17.37 | 11.60 | 0.78 | 8.3 | 5 | 結腸、直腸和肛門癌 | 5 | 21.12 | 15.29 | 0.86 | 8.2 | 5 | 胃癌 | 2 | 8.93 | 4.66 | 1.24 | 5.7 |
| 6 | 前列腺(攝護腺)癌 | 4 | 16.90 | 11.62 | 1.44 | 4.2 | 6 | 前列腺(攝護腺)癌 | 4 | 16.90 | 11.62 | 1.44 | 6.6 | 6 | 黑色素瘤和其他皮膚癌 | 2 | 8.93 | 3.17 | 13.73* | 5.7 |
| 7 | 女性乳房癌 | 3 | 13.40 | 9.69 | 0.79 | 3.1 | 7 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 3 | 12.67 | 7.58 | 2.34 | 4.9 | 7 | 白血病 | 1 | 4.47 | 4.34 | 0.94 | 2.9 |
| 8 | 胰臟癌 | 3 | 6.51 | 4.67 | 0.90 | 3.1 | 8 | 胰臟癌 | 2 | 8.45 | 6.39 | 1.01 | 3.3 | 8 | 間皮和軟組織癌 | 1 | 4.47 | 3.57 | 2.77 | 2.9 |
| 9 | 胃癌 | 3 | 6.51 | 3.83 | 0.74 | 3.1 | 9 | 膽囊和其他膽道癌 | 1 | 4.22 | 3.65 | 2.21 | 1.6 | 9 | 膽囊和其他膽道癌 | 1 | 4.47 | 3.08 | 1.56 | 2.9 |
| 10 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 3 | 6.51 | 3.47 | 1.36 | 3.1 | 10 | 鼻咽癌 | 1 | 4.22 | 2.92 | 0.66 | 1.6 | 10 | 胰臟癌 | 1 | 4.47 | 3.08 | 0.75 | 2.9 |
| | 其他非十大癌症死因 | 13 | 28.22 | 17.53*- | 0.64 | 13.5 | | 其他非十大癌症死因 | 4 | 16.90 | 10.29*- | 0.35* | 6.6 | | 其他非十大癌症死因 | 3 | 13.40 | 6.78*- | 0.34 | 8.6 |
| 11 | 卵巢癌 | 1 | 4.47 | 2.67 | 0.80 | 1.0 | 11 | 胃癌 | 1 | 4.22 | 2.70 | 0.41 | 1.6 | 11 | 卵巢癌 | 1 | 4.47 | 2.67 | 0.80 | 2.9 |
| 12 | 膽囊和其他膽道癌 | 2 | 4.34 | 3.31 | 1.85 | 2.1 | 12 | 白血病 | 1 | 4.22 | 2.53 | 0.88 | 1.6 | | | | | | | |
| 13 | 白血病 | 2 | 4.34 | 3.08 | 0.91 | 2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 黑色素瘤和其他皮膚癌 | 2 | 4.34 | 1.98 | 4.54 | 2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 間皮和軟組織癌 | 1 | 2.17 | 1.81 | 1.57 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | |

附 註：1. 彰化縣花壇鄉年中人口數 計46,063人 男性23,672人 女性22,391人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣芬園鄉癌症死亡原因

民國105年(2016年)

| 合 計 | | | | | | | 男 性 | | | | | | 女 性 | | | | | | | |
|-----|------------------------------|----------|------------------|------------|-----------|----------------|-----|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|----|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|
| 順位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % |
| | 所有癌症死因 | 56 | 233.90 | 110.76 | 0.87 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 42 | 333.55 | 175.72 | 0.99 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 14 | 123.35 | 46.37*- | 0.62 | 100.0 |
| | 十大癌症死因 | 49 | 204.66 | 98.25 | 1.01 | 87.5 | | 十大癌症死因 | 38 | 301.78 | 161.77 | 1.12 | 90.5 | | 十大癌症死因 | 14 | 123.35 | 46.37 | 1.15 | 100.0 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 17 | 71.00 | 29.98 | 1.17 | 30.4 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 13 | 103.24 | 50.62 | 1.27 | 31.0 | 1 | 女性乳房癌 | 4 | 35.24 | 22.97 | 1.85 | 28.6 |
| 2 | 女性乳房癌 | 4 | 35.24 | 22.97 | 1.85 | 7.1 | 2 | 口腔癌 | 5 | 39.71 | 21.96 | 1.16 | 11.9 | 2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 4 | 35.24 | 10.18 | 0.87 | 28.6 |
| 3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 6 | 25.06 | 11.05 | 0.84 | 10.7 | 3 | 肝和肝內膽管癌 | 5 | 39.71 | 20.94 | 0.62 | 11.9 | 3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 3 | 26.43 | 6.63 | 0.96 | 21.4 |
| 4 | 口腔癌 | 5 | 20.88 | 11.63 | 1.15 | 8.9 | 4 | 胰臟癌 | 4 | 31.77 | 14.92 | 3.02 | 9.5 | 4 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 1 | 8.81 | 2.49 | 1.59 | 7.1 |
| 5 | 肝和肝內膽管癌 | 5 | 20.88 | 9.93*- | 0.45 | 8.9 | 5 | 食道癌 | 3 | 23.82 | 16.22 | 1.22 | 7.1 | 5 | 卵巢癌 | 1 | 8.81 | 2.49 | 1.35 | 7.1 |
| 6 | 胰臟癌 | 5 | 20.88 | 7.87 | 2.30 | 8.9 | 6 | 結腸、直腸和肛門癌 | 3 | 23.82 | 13.46 | 0.74 | 7.1 | 6 | 胰臟癌 | 1 | 8.81 | 1.61 | 1.16 | 7.1 |
| 7 | 食道癌 | 3 | 12.53 | 8.87 | 1.22 | 5.4 | 7 | 胃癌 | 2 | 15.88 | 10.44 | 1.13 | 4.8 | | | | | | | |
| 8 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 1 | 8.81 | 2.49 | 1.59 | 1.8 | 8 | 膀胱癌 | 1 | 7.94 | 5.42 | 1.20 | 2.4 | | | | | | | |
| 9 | 卵巢癌 | 1 | 8.81 | 2.49 | 1.35 | 1.8 | 9 | 小腸癌 | 1 | 7.94 | 4.28 | 11.64 | 2.4 | | | | | | | |
| 10 | 胃癌 | 2 | 8.35 | 5.49 | 0.69 | 3.6 | 10 | 鼻咽癌 | 1 | 7.94 | 3.50 | 1.04 | 2.4 | | | | | | | |
| | 其他非十大癌症死因 | 7 | 29.24 | 12.50*- | 0.45* | 12.5 | | 其他非十大癌症死因 | 4 | 31.77 | 13.96*- | 0.47 | 9.5 | | 其他非十大癌症死因 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 11 | 膀胱癌 | 1 | 4.18 | 2.69 | 0.95 | 1.8 | 11 | 黑色素瘤和其他皮膚癌 | 1 | 7.94 | 2.96 | 4.86 | 2.4 | | | | | | | |
| 12 | 小腸癌 | 1 | 4.18 | 2.31 | 5.01 | 1.8 | 12 | 喉癌 | 1 | 7.94 | 2.96 | 2.55 | 2.4 | | | | | | | |
| 13 | 鼻咽癌 | 1 | 4.18 | 1.73 | 0.93 | 1.8 | 13 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 1 | 7.94 | 2.96 | 1.12 | 2.4 | | | | | | | |
| 14 | 黑色素瘤和其他皮膚癌 | 1 | 4.18 | 1.04 | 3.02 | 1.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 喉癌 | 1 | 4.18 | 1.04 | 2.49 | 1.8 | | | | | | | | | | | | | | |

附 註：1. 彰化縣芬園鄉年中人口數 計23,942人 男性12,592人 女性11,350人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣大村鄉癌症死亡原因

民國105年(2016年)

| 合 計 | | | | | | | 男 性 | | | | | | 女 性 | | | | | | | |
|--------|------------------------------|----------|------------------|------------|-----------|----------------|--------|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|--------|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|
| 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % |
| | 所有癌症死因 | 82 | 223.76 | 135.67 | 1.05 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 52 | 273.80 | 188.35 | 1.03 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 30 | 169.93 | 87.19 | 1.08 | 100.0 |
| | 十大癌症死因 | 66 | 180.10 | 109.25 | 1.15 | 80.5 | | 十大癌症死因 | 47 | 247.47 | 170.91 | 1.13 | 90.4 | | 十大癌症死因 | 26 | 147.28 | 75.58 | 1.26 | 86.7 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 25 | 68.22 | 37.63 | 1.46 | 30.5 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 18 | 94.78 | 63.89 | 1.56 | 34.6 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 7 | 39.65 | 13.27 | 1.27 | 23.3 |
| 2 | 肝和肝內膽管癌 | 13 | 35.47 | 21.80 | 0.96 | 15.9 | 2 | 肝和肝內膽管癌 | 8 | 42.12 | 29.84 | 0.84 | 15.4 | 2 | 肝和肝內膽管癌 | 5 | 28.32 | 13.54 | 1.23 | 16.7 |
| 3 | 卵巢癌 | 4 | 22.66 | 15.69 | 3.95* | 4.9 | 3 | 口腔癌 | 7 | 36.86 | 24.97 | 1.21 | 13.5 | 3 | 卵巢癌 | 4 | 22.66 | 15.69 | 3.95* | 13.3 |
| 4 | 口腔癌 | 7 | 19.10 | 12.58 | 1.16 | 8.5 | 4 | 食道癌 | 5 | 26.33 | 18.14 | 1.53 | 9.6 | 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 3 | 16.99 | 10.79 | 0.80 | 10.0 |
| 5 | 結腸、直腸和肛門癌 | 5 | 13.64 | 8.71 | 0.59 | 6.1 | 5 | 胃癌 | 2 | 10.53 | 7.91 | 1.02 | 3.8 | 5 | 女性乳房癌 | 2 | 11.33 | 6.47 | 0.66 | 6.7 |
| 6 | 食道癌 | 5 | 13.64 | 8.56 | 1.48 | 6.1 | 6 | 結腸、直腸和肛門癌 | 2 | 10.53 | 6.83*- | 0.42 | 3.8 | 6 | 骨和關節軟骨癌 | 1 | 5.66 | 3.74 | 8.85 | 3.3 |
| 7 | 女性乳房癌 | 2 | 11.33 | 6.47 | 0.66 | 2.4 | 7 | 膀胱癌 | 2 | 10.53 | 6.00 | 2.22 | 3.8 | 7 | 胃癌 | 1 | 5.66 | 3.74 | 0.73 | 3.3 |
| 8 | 胃癌 | 3 | 8.19 | 5.61 | 0.90 | 3.7 | 8 | 鼻咽癌 | 1 | 5.27 | 4.84 | 0.81 | 1.9 | 8 | 子宮體癌 | 1 | 5.66 | 3.45 | 2.09 | 3.3 |
| 9 | 子宮體癌 | 1 | 5.66 | 3.45 | 2.09 | 1.2 | 9 | 白血病 | 1 | 5.27 | 4.42 | 1.09 | 1.9 | 9 | 膽囊和其他膽道癌 | 1 | 5.66 | 2.85 | 1.88 | 3.3 |
| 10 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 1 | 5.66 | 2.05 | 1.22 | 1.2 | 10 | 胰臟癌 | 1 | 5.27 | 4.08 | 0.62 | 1.9 | 10 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 1 | 5.66 | 2.05 | 1.22 | 3.3 |
| | 其他非十大癌症死因 | 16 | 43.66 | 26.43 | 0.76 | 19.5 | | 其他非十大癌症死因 | 5 | 26.33 | 17.45 | 0.55 | 9.6 | | 其他非十大癌症死因 | 4 | 22.66 | 11.61 | 0.55 | 13.3 |
| 11 | 白血病 | 2 | 5.46 | 3.50 | 1.11 | 2.4 | 11 | 間皮和軟組織癌 | 1 | 5.27 | 3.50 | 4.41 | 1.9 | 11 | 白血病 | 1 | 5.66 | 1.78 | 1.13 | 3.3 |
| 12 | 膀胱癌 | 2 | 5.46 | 2.44 | 1.70 | 2.4 | 12 | 主唾液腺癌 | 1 | 5.27 | 3.33 | 7.20 | 1.9 | | | | | | | |
| 13 | 鼻咽癌 | 1 | 2.73 | 2.38 | 0.69 | 1.2 | 13 | 甲狀腺癌 | 1 | 5.27 | 3.17 | 6.64 | 1.9 | | | | | | | |
| 14 | 胰臟癌 | 1 | 2.73 | 2.19 | 0.37 | 1.2 | 14 | 腎臟癌 | 1 | 5.27 | 3.17 | 3.67 | 1.9 | | | | | | | |
| 15 | 骨和關節軟骨癌 | 1 | 2.73 | 1.76 | 6.84 | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | |

附 註：1. 彰化縣大村鄉年中人口數 計36,646人 男性18,992人 女性17,654人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埔鹽鄉癌症死亡原因

民國105年(2016年)

| 合 計 | | | | | | | 男 性 | | | | | | 女 性 | | | | | | | |
|--------|------------------------------|----------|------------------|------------|-----------|----------------|--------|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|--------|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|
| 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % |
| | 所有癌症死因 | 80 | 243.40 | 127.70 | 0.93 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 59 | 341.71 | 197.35 | 1.06 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 21 | 134.60 | 63.90 | 0.69 | 100.0 |
| | 十大癌症死因 | 58 | 176.46 | 90.51 | 0.90 | 72.5 | | 十大癌症死因 | 48 | 278.00 | 158.45 | 1.04 | 81.4 | | 十大癌症死因 | 18 | 115.37 | 56.62 | 1.09 | 85.7 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 21 | 63.89 | 30.75 | 1.08 | 26.3 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 21 | 121.63 | 65.62 | 1.57 | 35.6 | 1 | 肝和肝內膽管癌 | 5 | 32.05 | 16.40 | 1.09 | 23.8 |
| 2 | 前列腺(攝護腺)癌 | 5 | 28.96 | 16.63 | 1.74 | 6.3 | 2 | 結腸、直腸和肛門癌 | 6 | 34.75 | 18.32 | 1.13 | 10.2 | 2 | 結腸、直腸和肛門癌 | 3 | 19.23 | 14.81 | 0.70 | 14.3 |
| 3 | 肝和肝內膽管癌 | 9 | 27.38 | 15.58 | 0.60 | 11.3 | 3 | 前列腺(攝護腺)癌 | 5 | 28.96 | 16.63 | 1.74 | 8.5 | 3 | 女性乳房癌 | 2 | 12.82 | 7.91 | 0.69 | 9.5 |
| 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 9 | 27.38 | 15.21 | 0.94 | 11.3 | 4 | 肝和肝內膽管癌 | 4 | 23.17 | 14.41*- | 0.38* | 6.8 | 4 | 胃癌 | 2 | 12.82 | 4.86 | 1.29 | 9.5 |
| 5 | 女性乳房癌 | 2 | 12.82 | 7.91 | 0.69 | 2.5 | 5 | 食道癌 | 3 | 17.38 | 10.83 | 0.94 | 5.1 | 5 | 子宮體癌 | 1 | 6.41 | 4.26 | 2.39 | 4.8 |
| 6 | 胃癌 | 4 | 12.17 | 4.67 | 1.03 | 5.0 | 6 | 胰臟癌 | 2 | 11.58 | 7.87 | 1.15 | 3.4 | 6 | 卵巢癌 | 1 | 6.41 | 2.42 | 1.00 | 4.8 |
| 7 | 食道癌 | 3 | 9.13 | 5.87 | 0.94 | 3.8 | 7 | 黑色素瘤和其他皮膚癌 | 2 | 11.58 | 6.68 | 7.46 | 3.4 | 7 | 甲狀腺癌 | 1 | 6.41 | 1.78 | 6.02 | 4.8 |
| 8 | 口腔癌 | 3 | 9.13 | 3.58*- | 0.52 | 3.8 | 8 | 口腔癌 | 2 | 11.58 | 6.11*- | 0.35 | 3.4 | 8 | 白血病 | 1 | 6.41 | 1.78 | 1.12 | 4.8 |
| 9 | 子宮體癌 | 1 | 6.41 | 4.26 | 2.39 | 1.3 | 9 | 胃癌 | 2 | 11.58 | 4.61 | 0.86 | 3.4 | 9 | 間皮和軟組織癌 | 1 | 6.41 | 1.20 | 3.02 | 4.8 |
| 10 | 卵巢癌 | 1 | 6.41 | 2.42 | 1.00 | 1.3 | 10 | 白血病 | 1 | 5.79 | 7.36 | 1.05 | 1.7 | 10 | 口腔癌 | 1 | 6.41 | 1.20 | 2.71 | 4.8 |
| | 其他非十大癌症死因 | 22 | 66.93 | 37.19 | 1.03 | 27.5 | | 其他非十大癌症死因 | 11 | 63.71 | 38.90 | 1.15 | 18.6 | | 其他非十大癌症死因 | 3 | 19.23 | 7.28*- | 0.21* | 14.3 |
| 11 | 白血病 | 2 | 6.08 | 4.90 | 1.08 | 2.5 | 11 | 腦癌 | 1 | 5.79 | 5.28 | 2.11 | 1.7 | 11 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 1 | 6.41 | 1.20 | 1.13 | 4.8 |
| 12 | 胰臟癌 | 2 | 6.08 | 3.93 | 0.69 | 2.5 | 12 | 鼻咽癌 | 1 | 5.79 | 3.76 | 0.80 | 1.7 | | | | | | | |
| 13 | 黑色素瘤和其他皮膚癌 | 2 | 6.08 | 3.32 | 4.54 | 2.5 | 13 | 喉癌 | 1 | 5.79 | 3.74 | 1.94 | 1.7 | | | | | | | |
| 14 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 2 | 6.08 | 1.81 | 0.98 | 2.5 | 14 | 腎臟癌 | 1 | 5.79 | 2.30 | 3.54 | 1.7 | | | | | | | |
| 15 | 腦癌 | 1 | 3.04 | 2.88 | 1.29 | 1.3 | 15 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 1 | 5.79 | 2.30 | 0.84 | 1.7 | | | | | | | |

附 註：1. 彰化縣埔鹽鄉年中人口數 計32,868人 男性17,266人 女性15,602人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埔心鄉癌症死亡原因

民國105年(2016年)

| 合 計 | | | | | | | 男 性 | | | | | | 女 性 | | | | | | | |
|--------|------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------|------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------|------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|
| 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死 亡 人 數 | 每十萬 死 亡 率 | 標 準 化 死 亡 率 | 標 準 死 亡 比 | 死 亡 百 分 比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死 亡 人 數 | 每十萬 死 亡 率 | 標 準 化 死 亡 率 | 標 準 死 亡 比 | 死 亡 百 分 比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死 亡 人 數 | 每十萬 死 亡 率 | 標 準 化 死 亡 率 | 標 準 死 亡 比 | 死 亡 百 分 比 % |
| | 所有癌症死因 | 91 | 261.42 | 156.24 | 1.18 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 59 | 328.73 | 215.41 | 1.18 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 32 | 189.76 | 101.63 | 1.18 | 100.0 |
| | 十大癌症死因 | 74 | 212.58 | 127.93*+ | 1.32* | 81.3 | | 十大癌症死因 | 53 | 295.30 | 195.52 | 1.31 | 89.8 | | 十大癌症死因 | 28 | 166.04 | 92.08 | 1.35 | 87.5 |
| 1 | 肝和肝內膽管癌 | 19 | 54.58 | 34.40 | 1.42 | 20.9 | 1 | 肝和肝內膽管癌 | 15 | 83.57 | 57.21 | 1.59 | 25.4 | 1 | 女性乳房癌 | 5 | 29.65 | 20.26 | 1.71 | 15.6 |
| 2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 17 | 48.84 | 25.91 | 1.01 | 18.7 | 2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 12 | 66.86 | 41.96 | 1.04 | 20.3 | 2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 5 | 29.65 | 11.63 | 0.93 | 15.6 |
| 3 | 女性乳房癌 | 5 | 29.65 | 20.26 | 1.71 | 5.5 | 3 | 口腔癌 | 6 | 33.43 | 21.71 | 1.09 | 10.2 | 3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 4 | 23.72 | 13.19 | 1.09 | 12.5 |
| 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 10 | 28.73 | 17.08 | 1.20 | 11.0 | 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 6 | 33.43 | 20.86 | 1.28 | 10.2 | 4 | 肝和肝內膽管癌 | 4 | 23.72 | 11.13 | 1.01 | 12.5 |
| 5 | 口腔癌 | 7 | 20.11 | 12.24 | 1.22 | 7.7 | 5 | 胰臟癌 | 4 | 22.29 | 13.87 | 2.53 | 6.8 | 5 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 3 | 17.79 | 9.41 | 3.98 | 9.4 |
| 6 | 胰臟癌 | 6 | 17.24 | 9.28 | 2.27 | 6.6 | 6 | 膀胱癌 | 3 | 16.71 | 12.70 | 3.30 | 5.1 | 6 | 腦癌 | 2 | 11.86 | 9.99 | 7.10 | 6.3 |
| 7 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 4 | 11.49 | 6.70 | 2.24 | 4.4 | 7 | 前列腺(攝護腺)癌 | 2 | 11.14 | 9.19 | 0.87 | 3.4 | 7 | 胰臟癌 | 2 | 11.86 | 5.71 | 1.87 | 6.3 |
| 8 | 前列腺(攝護腺)癌 | 2 | 11.14 | 9.19 | 0.87 | 2.2 | 8 | 食道癌 | 2 | 11.14 | 7.12 | 0.64 | 3.4 | 8 | 膽囊和其他膽道癌 | 1 | 5.93 | 4.02 | 1.92 | 3.1 |
| 9 | 膀胱癌 | 3 | 8.62 | 6.22 | 2.57 | 3.3 | 9 | 鼻咽癌 | 2 | 11.14 | 6.34 | 1.67 | 3.4 | 9 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 1 | 5.93 | 3.66 | 1.26 | 3.1 |
| 10 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 1 | 5.93 | 3.66 | 1.26 | 1.1 | 10 | 胸腺癌 | 1 | 5.57 | 4.55 | 18.69 | 1.7 | 10 | 胃癌 | 1 | 5.93 | 3.08 | 0.75 | 3.1 |
| | 其他非十大癌症死因 | 17 | 48.84 | 28.32 | 0.82 | 18.7 | | 其他非十大癌症死因 | 6 | 33.43 | 19.89 | 0.63 | 10.2 | | 其他非十大癌症死因 | 4 | 23.72 | 9.55*- | 0.62 | 12.5 |
| 11 | 腦癌 | 2 | 5.75 | 4.77 | 2.66 | 2.2 | 11 | 喉癌 | 1 | 5.57 | 3.60 | 2.24 | 1.7 | 11 | 口腔癌 | 1 | 5.93 | 2.08 | 3.44 | 3.1 |
| 12 | 食道癌 | 2 | 5.75 | 3.46 | 0.62 | 2.2 | 12 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 1 | 5.57 | 3.52 | 0.96 | 1.7 | 12 | 小腸癌 | 1 | 5.93 | 1.76 | 7.83 | 3.1 |
| 13 | 鼻咽癌 | 2 | 5.75 | 2.84 | 1.44 | 2.2 | 13 | 主唾液腺癌 | 1 | 5.57 | 3.10 | 7.03 | 1.7 | | | | | | | |
| 14 | 胸腺癌 | 1 | 2.87 | 2.47 | 9.48 | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 膽囊和其他膽道癌 | 1 | 2.87 | 1.99 | 1.12 | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | |

附 註：1. 彰化縣埔心鄉年中人口數 計34,810人 男性17,948人 女性16,863人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣永靖鄉癌症死亡原因

民國105年(2016年)

| 合 計 | | | | | | | 男 性 | | | | | | | 女 性 | | | | | | |
|-----|------------------------------|----------|------------------|------------|-----------|----------------|-----|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|-----|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|
| 順位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % |
| | 所有癌症死因 | 105 | 277.20 | 161.62 | 1.22 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 70 | 355.76 | 227.16 | 1.26 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 35 | 192.28 | 99.33 | 1.14 | 100.0 |
| | 十大癌症死因 | 85 | 224.40 | 132.45*+ | 1.29* | 81.0 | | 十大癌症死因 | 62 | 315.10 | 204.08*+ | 1.38* | 88.6 | | 十大癌症死因 | 29 | 159.31 | 86.27 | 1.20 | 82.9 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 24 | 63.36 | 36.13 | 1.26 | 22.9 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 19 | 96.56 | 61.70 | 1.46 | 27.1 | 1 | 結腸、直腸和肛門癌 | 5 | 27.47 | 11.24 | 1.21 | 14.3 |
| 2 | 肝和肝內膽管癌 | 18 | 47.52 | 28.51 | 1.20 | 17.1 | 2 | 肝和肝內膽管癌 | 14 | 71.15 | 45.81 | 1.32 | 20.0 | 2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 5 | 27.47 | 10.58 | 0.82 | 14.3 |
| 3 | 前列腺(攝護腺)癌 | 6 | 30.49 | 16.88 | 2.28 | 5.7 | 3 | 口腔癌 | 9 | 45.74 | 28.61 | 1.48 | 12.9 | 3 | 女性乳房癌 | 4 | 21.97 | 14.24 | 1.24 | 11.4 |
| 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 11 | 29.04 | 15.34 | 1.17 | 10.5 | 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 6 | 30.49 | 18.73 | 1.14 | 8.6 | 4 | 肝和肝內膽管癌 | 4 | 21.97 | 11.96 | 0.88 | 11.4 |
| 5 | 口腔癌 | 9 | 23.76 | 14.49 | 1.42 | 8.6 | 5 | 前列腺(攝護腺)癌 | 6 | 30.49 | 16.88 | 2.28 | 8.6 | 5 | 胰臟癌 | 3 | 16.48 | 10.37 | 2.49 | 8.6 |
| 6 | 女性乳房癌 | 4 | 21.97 | 14.24 | 1.24 | 3.8 | 6 | 食道癌 | 3 | 15.25 | 9.22 | 0.87 | 4.3 | 6 | 胃癌 | 3 | 16.48 | 6.70 | 2.00 | 8.6 |
| 7 | 胃癌 | 4 | 10.56 | 4.67 | 1.07 | 3.8 | 7 | 鼻咽癌 | 2 | 10.16 | 7.17 | 1.52 | 2.9 | 7 | 白血病 | 2 | 10.99 | 8.62 | 2.11 | 5.7 |
| 8 | 白血病 | 3 | 7.92 | 8.55 | 1.55 | 2.9 | 8 | 白血病 | 1 | 5.08 | 8.51 | 1.01 | 1.4 | 8 | 卵巢癌 | 1 | 5.49 | 4.90 | 0.91 | 2.9 |
| 9 | 胰臟癌 | 3 | 7.92 | 5.09 | 1.01 | 2.9 | 9 | 腦癌 | 1 | 5.08 | 3.73 | 1.97 | 1.4 | 9 | 膽囊和其他膽道癌 | 1 | 5.49 | 3.83 | 1.71 | 2.9 |
| 10 | 鼻咽癌 | 3 | 7.92 | 5.05 | 1.94 | 2.9 | 10 | 膀胱癌 | 1 | 5.08 | 3.73 | 0.97 | 1.4 | 10 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 1 | 5.49 | 3.83 | 1.18 | 2.9 |
| | 其他非十大癌症死因 | 20 | 52.80 | 29.18 | 0.98 | 19.0 | | 其他非十大癌症死因 | 8 | 40.66 | 23.08 | 0.73 | 11.4 | | 其他非十大癌症死因 | 6 | 32.96 | 13.07 | 0.93 | 17.1 |
| 11 | 食道癌 | 3 | 7.92 | 4.57 | 0.84 | 2.9 | 11 | 胸腺癌 | 1 | 5.08 | 3.11 | 16.57 | 1.4 | 11 | 鼻咽癌 | 1 | 5.49 | 2.57 | 4.25 | 2.9 |
| 12 | 卵巢癌 | 1 | 5.49 | 4.90 | 0.91 | 1.0 | 12 | 黑色素瘤和其他皮膚癌 | 1 | 5.08 | 2.75 | 3.77 | 1.4 | 12 | 膀胱癌 | 1 | 5.49 | 1.81 | 3.32 | 2.9 |
| 13 | 膀胱癌 | 2 | 5.28 | 2.94 | 1.50 | 1.9 | 13 | 胃癌 | 1 | 5.08 | 2.75 | 0.45 | 1.4 | 13 | 間皮和軟組織癌 | 1 | 5.49 | 1.56 | 3.11 | 2.9 |
| 14 | 膽囊和其他膽道癌 | 1 | 2.64 | 2.00 | 0.99 | 1.0 | 14 | 喉癌 | 1 | 5.08 | 2.62 | 2.01 | 1.4 | | | | | | | |
| 15 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 1 | 2.64 | 2.00 | 0.50 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | |

附 註：1. 彰化縣永靖鄉年中人口數 計37,879人 男性19,676人 女性18,203人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣社頭鄉癌症死亡原因

民國105年(2016年)

| 合 計 | | | | | | | 男 性 | | | | | | | 女 性 | | | | | | |
|--------|------------------------------|----------|------------------|------------|-----------|----------------|--------|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|--------|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|
| 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % |
| | 所有癌症死因 | 85 | 195.78 | 115.56 | 0.86 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 58 | 260.09 | 166.91 | 0.91 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 27 | 127.85 | 65.13 | 0.77 | 100.0 |
| | 十大癌症死因 | 71 | 163.53 | 97.78 | 1.04 | 83.5 | | 十大癌症死因 | 52 | 233.18 | 150.04 | 1.02 | 89.7 | | 十大癌症死因 | 24 | 113.65 | 61.11 | 1.04 | 88.9 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 19 | 43.76 | 22.32 | 0.87 | 22.4 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 14 | 62.78 | 37.30 | 0.94 | 24.1 | 1 | 結腸、直腸和肛門癌 | 6 | 28.41 | 11.18 | 1.27 | 22.2 |
| 2 | 肝和肝內膽管癌 | 13 | 29.94 | 21.97 | 0.76 | 15.3 | 2 | 口腔癌 | 11 | 49.33 | 33.63 | 1.57 | 19.0 | 2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 5 | 23.68 | 9.46 | 0.72 | 18.5 |
| 3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 12 | 27.64 | 13.46 | 1.12 | 14.1 | 3 | 肝和肝內膽管癌 | 10 | 44.84 | 29.61 | 0.82 | 17.2 | 3 | 肝和肝內膽管癌 | 3 | 14.21 | 15.36 | 0.59 | 11.1 |
| 4 | 口腔癌 | 11 | 25.34 | 17.38 | 1.52 | 12.9 | 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 6 | 26.91 | 16.41 | 1.00 | 10.3 | 4 | 白血病 | 3 | 14.21 | 9.25 | 2.79 | 11.1 |
| 5 | 胃癌 | 5 | 11.52 | 5.57 | 1.17 | 5.9 | 5 | 鼻咽癌 | 3 | 13.45 | 6.92 | 1.96 | 5.2 | 5 | 胃癌 | 2 | 9.47 | 4.58 | 1.16 | 7.4 |
| 6 | 白血病 | 4 | 9.21 | 6.45 | 1.81 | 4.7 | 6 | 胃癌 | 3 | 13.45 | 6.79 | 1.18 | 5.2 | 6 | 腦癌 | 1 | 4.74 | 3.24 | 2.67 | 3.7 |
| 7 | 鼻咽癌 | 3 | 6.91 | 3.30 | 1.69 | 3.5 | 7 | 食道癌 | 2 | 8.97 | 6.18 | 0.51 | 3.4 | 7 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 1 | 4.74 | 3.24 | 1.00 | 3.7 |
| 8 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 1 | 4.74 | 3.24 | 1.00 | 1.2 | 8 | 腦癌 | 1 | 4.48 | 5.74 | 1.72 | 1.7 | 8 | 卵巢癌 | 1 | 4.74 | 2.12 | 0.81 | 3.7 |
| 9 | 卵巢癌 | 1 | 4.74 | 2.12 | 0.81 | 1.2 | 9 | 白血病 | 1 | 4.48 | 3.92 | 0.88 | 1.7 | 9 | 膀胱癌 | 1 | 4.74 | 1.34 | 2.98 | 3.7 |
| 10 | 腦癌 | 2 | 4.61 | 4.58 | 2.10 | 2.4 | 10 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 1 | 4.48 | 3.55 | 0.74 | 1.7 | 10 | 腎臟癌 | 1 | 4.74 | 1.34 | 2.12 | 3.7 |
| | 其他非十大癌症死因 | 14 | 32.25 | 17.78*- | 0.46* | 16.5 | | 其他非十大癌症死因 | 6 | 26.91 | 16.87*- | 0.47 | 10.3 | | 其他非十大癌症死因 | 3 | 14.21 | 4.03*- | 0.25* | 11.1 |
| 11 | 食道癌 | 2 | 4.61 | 3.18 | 0.49 | 2.4 | 11 | 腎臟癌 | 1 | 4.48 | 3.18 | 2.92 | 1.7 | 11 | 膽囊和其他膽道癌 | 1 | 4.74 | 1.34 | 1.47 | 3.7 |
| 12 | 腎臟癌 | 2 | 4.61 | 2.49 | 2.46 | 2.4 | 12 | 心臟、縱隔和胸(肋)膜癌 | 1 | 4.48 | 2.99 | 9.98 | 1.7 | | | | | | | |
| 13 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 1 | 2.30 | 1.74 | 0.43 | 1.2 | 13 | 鼻腔、中耳和副鼻竇癌 | 1 | 4.48 | 2.65 | 10.00 | 1.7 | | | | | | | |
| 14 | 心臟、縱隔和胸(肋)膜癌 | 1 | 2.30 | 1.57 | 7.35 | 1.2 | 14 | 胰臟癌 | 1 | 4.48 | 2.52 | 0.50 | 1.7 | | | | | | | |
| 15 | 鼻腔、中耳和副鼻竇癌 | 1 | 2.30 | 1.38 | 7.47 | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | |

附 註：1. 彰化縣社頭鄉年中人口數 計43,417人 男性22,300人 女性21,118人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣二水鄉癌症死亡原因

民國105年(2016年)

| 合 計 | | | | | | | 男 性 | | | | | | | 女 性 | | | | | | |
|-----|------------------------------|----------|------------------|------------|-----------|----------------|-----|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|----------|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|
| 順位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % |
| | 所有癌症死因 | 44 | 282.70 | 108.60 | 0.88 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 21 | 257.48 | 107.95*- | 0.64* | 100.0 | | 所有癌症死因 | 23 | 310.48 | 112.91 | 1.30 | 100.0 |
| | 十大癌症死因 | 40 | 257.00 | 100.42 | 1.13 | 90.9 | | 十大癌症死因 | 21 | 257.48 | 107.95 | 0.91 | 100.0 | | 十大癌症死因 | 22 | 296.98 | 110.62 | 1.76* | 95.7 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 12 | 77.10 | 22.73 | 1.04 | 27.3 | 1 | 肝和肝內膽管癌 | 6 | 73.57 | 31.18 | 0.98 | 28.6 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 9 | 121.49 | 28.77 | 2.45* | 39.1 |
| 2 | 肝和肝內膽管癌 | 8 | 51.40 | 23.16 | 0.91 | 18.2 | 2 | 胃癌 | 4 | 49.04 | 23.29 | 2.85 | 19.0 | 2 | 結腸、直腸和肛門癌 | 4 | 54.00 | 20.20 | 1.63 | 17.4 |
| 3 | 前列腺(攝護腺)癌 | 3 | 36.78 | 10.78 | 1.66 | 6.8 | 3 | 氣管、支氣管和肺癌 | 3 | 36.78 | 14.51*- | 0.37 | 14.3 | 3 | 肝和肝內膽管癌 | 2 | 27.00 | 17.05 | 0.73 | 8.7 |
| 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 5 | 32.13 | 13.06 | 0.90 | 11.4 | 4 | 前列腺(攝護腺)癌 | 3 | 36.78 | 10.78 | 1.66 | 14.3 | 4 | 女性乳房癌 | 2 | 27.00 | 16.04 | 1.25 | 8.7 |
| 5 | 女性乳房癌 | 2 | 27.00 | 16.04 | 1.25 | 4.5 | 5 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 2 | 24.52 | 8.68 | 2.90 | 9.5 | 5 | 子宮體癌 | 1 | 13.50 | 13.14 | 4.24 | 4.3 |
| 6 | 胃癌 | 4 | 25.70 | 11.34 | 1.75 | 9.1 | 6 | 食道癌 | 1 | 12.26 | 9.63 | 0.57 | 4.8 | 6 | 白血病 | 1 | 13.50 | 6.69 | 1.93 | 4.3 |
| 7 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 3 | 19.28 | 5.42 | 2.53 | 6.8 | 7 | 結腸、直腸和肛門癌 | 1 | 12.26 | 6.28 | 0.32 | 4.8 | 7 | 腎臟癌 | 1 | 13.50 | 3.76 | 4.15 | 4.3 |
| 8 | 子宮體癌 | 1 | 13.50 | 13.14 | 4.24 | 2.3 | 8 | 間皮和軟組織癌 | 1 | 12.26 | 3.59 | 8.05 | 4.8 | 8 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 1 | 13.50 | 2.68 | 2.01 | 4.3 |
| 9 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 1 | 13.50 | 2.68 | 2.01 | 2.3 | | | | | | | 9 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 1 | 13.50 | 2.29 | 2.00 | 4.3 | |
| 10 | 食道癌 | 1 | 6.43 | 5.56 | 0.56 | 2.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他非十大癌症死因 | 4 | 25.70 | 8.18*- | 0.28* | 9.1 | | 其他非十大癌症死因 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | | 其他非十大癌症死因 | 1 | 13.50 | 2.29*- | 0.19 | 4.3 |
| 11 | 白血病 | 1 | 6.43 | 3.24 | 0.96 | 2.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 腎臟癌 | 1 | 6.43 | 2.02 | 2.46 | 2.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 間皮和軟組織癌 | 1 | 6.43 | 1.54 | 3.28 | 2.3 | | | | | | | | | | | | | | |

附 註：1. 彰化縣二水鄉年中人口數 計15,564人 男性8,156人 女性7,408人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣田尾鄉癌症死亡原因

民國105年(2016年)

| 合 計 | | | | | | | 男 性 | | | | | | | 女 性 | | | | | | |
|--------|------------------------------|----------|------------------|------------|-----------|----------------|--------|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|--------------|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|
| 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % |
| | 所有癌症死因 | 72 | 261.18 | 144.35 | 1.05 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 42 | 294.70 | 178.41 | 0.94 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 30 | 225.31 | 105.17 | 1.24 | 100.0 |
| | 十大癌症死因 | 59 | 214.02 | 120.27 | 1.21 | 81.9 | | 十大癌症死因 | 41 | 287.68 | 174.01 | 1.15 | 97.6 | | 十大癌症死因 | 25 | 187.76 | 96.36 | 1.44 | 83.3 |
| 1 | 肝和肝內膽管癌 | 17 | 61.67 | 37.06 | 1.43 | 23.6 | 1 | 肝和肝內膽管癌 | 13 | 91.22 | 55.43 | 1.54 | 31.0 | 1 | 女性乳房癌 | 5 | 37.55 | 23.99 | 2.10 | 16.7 |
| 2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 15 | 54.41 | 27.83 | 0.97 | 20.8 | 2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 10 | 70.17 | 40.14 | 0.94 | 23.8 | 2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 5 | 37.55 | 15.06 | 1.02 | 16.7 |
| 3 | 女性乳房癌 | 5 | 37.55 | 23.99 | 2.10 | 6.9 | 3 | 口腔癌 | 4 | 28.07 | 19.66 | 0.86 | 9.5 | 3 | 肝和肝內膽管癌 | 4 | 30.04 | 18.09 | 1.10 | 13.3 |
| 4 | 卵巢癌 | 3 | 22.53 | 9.47 | 3.67 | 4.2 | 4 | 胰臟癌 | 3 | 21.05 | 12.58 | 2.14 | 7.1 | 4 | 卵巢癌 | 3 | 22.53 | 9.47 | 3.67 | 10.0 |
| 5 | 前列腺(攝護腺)癌 | 3 | 21.05 | 11.83 | 1.33 | 4.2 | 5 | 前列腺(攝護腺)癌 | 3 | 21.05 | 11.83 | 1.33 | 7.1 | 5 | 結腸、直腸和肛門癌 | 3 | 22.53 | 6.69 | 0.89 | 10.0 |
| 6 | 結腸、直腸和肛門癌 | 5 | 18.14 | 8.93 | 0.66 | 6.9 | 6 | 結腸、直腸和肛門癌 | 2 | 14.03 | 9.49 | 0.47 | 4.8 | 6 | 間皮和軟組織癌 | 1 | 7.51 | 5.42 | 3.89 | 3.3 |
| 7 | 口腔癌 | 4 | 14.51 | 10.41 | 0.84 | 5.6 | 7 | 胃癌 | 2 | 14.03 | 8.41 | 1.09 | 4.8 | 7 | 腦癌 | 1 | 7.51 | 5.26 | 3.97 | 3.3 |
| 8 | 胰臟癌 | 4 | 14.51 | 7.57 | 1.72 | 5.6 | 8 | 膀胱癌 | 2 | 14.03 | 7.14 | 2.30 | 4.8 | 8 | 骨和關節軟骨癌 | 1 | 7.51 | 5.25 | 12.28 | 3.3 |
| 9 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 1 | 7.51 | 1.68 | 1.45 | 1.4 | 9 | 鼻咽癌 | 1 | 7.02 | 4.86 | 0.98 | 2.4 | 9 | 白血病 | 1 | 7.51 | 5.03 | 1.36 | 3.3 |
| 10 | 腦癌 | 2 | 7.26 | 4.96 | 3.14 | 2.8 | 10 | 黑色素瘤和其他皮膚癌 | 1 | 7.02 | 4.47 | 4.65 | 2.4 | 10 | 胰臟癌 | 1 | 7.51 | 2.11 | 1.07 | 3.3 |
| | 其他非十大癌症死因 | 13 | 47.16 | 24.08*- | 0.66 | 18.1 | | 其他非十大癌症死因 | 1 | 7.02 | 4.40*- | 0.11* | 2.4 | | 其他非十大癌症死因 | 5 | 37.55 | 8.81*- | 0.72 | 16.7 |
| 11 | 胃癌 | 2 | 7.26 | 4.19 | 0.66 | 2.8 | 11 | 腦癌 | 1 | 7.02 | 4.40 | 2.55 | 2.4 | 11 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 1 | 7.51 | 1.68 | 1.46 | 3.3 |
| 12 | 膀胱癌 | 2 | 7.26 | 3.37 | 1.81 | 2.8 | | | | | | | 12 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 1 | 7.51 | 1.68 | 1.45 | 3.3 | |
| 13 | 鼻咽癌 | 1 | 3.63 | 2.53 | 0.86 | 1.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 間皮和軟組織癌 | 1 | 3.63 | 2.43 | 2.24 | 1.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 骨和關節軟骨癌 | 1 | 3.63 | 2.41 | 9.23 | 1.4 | | | | | | | | | | | | | | |

附 註：1. 彰化縣田尾鄉年中人口數 計27,567人 男性14,252人 女性13,315人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣埤頭鄉癌症死亡原因

民國105年(2016年)

| 合 計 | | | | | | | 男 性 | | | | | | | 女 性 | | | | | | |
|--------|------------------------------|----------|------------------|------------|-----------|----------------|--------|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|--------|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|
| 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % |
| | 所有癌症死因 | 82 | 265.95 | 138.75 | 1.03 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 51 | 318.17 | 181.42 | 1.00 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 31 | 209.40 | 98.01 | 1.08 | 100.0 |
| | 十大癌症死因 | 67 | 217.30 | 113.57 | 1.23 | 81.7 | | 十大癌症死因 | 44 | 274.50 | 157.75 | 1.12 | 86.3 | | 十大癌症死因 | 29 | 195.89 | 92.83 | 1.29 | 93.5 |
| 1 | 肝和肝內膽管癌 | 21 | 68.11 | 35.59 | 1.51 | 25.6 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 14 | 87.34 | 49.23 | 1.15 | 27.5 | 1 | 肝和肝內膽管癌 | 9 | 60.79 | 28.40 | 2.08 | 29.0 |
| 2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 19 | 61.62 | 32.04 | 1.05 | 23.2 | 2 | 肝和肝內膽管癌 | 12 | 74.86 | 43.84 | 1.24 | 23.5 | 2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 5 | 33.77 | 15.08 | 0.85 | 16.1 |
| 3 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 3 | 20.26 | 7.35 | 3.71 | 3.7 | 3 | 鼻咽癌 | 3 | 18.72 | 13.09 | 2.56 | 5.9 | 3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 3 | 20.26 | 10.14 | 0.75 | 9.7 |
| 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 6 | 19.46 | 8.39 | 0.68 | 7.3 | 4 | 白血病 | 3 | 18.72 | 12.05 | 3.43 | 5.9 | 4 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 3 | 20.26 | 7.35 | 3.71 | 9.7 |
| 5 | 白血病 | 5 | 16.22 | 9.46 | 2.91 | 6.1 | 5 | 胃癌 | 3 | 18.72 | 9.05 | 1.42 | 5.9 | 5 | 胰臟癌 | 2 | 13.51 | 8.18 | 1.80 | 6.5 |
| 6 | 胃癌 | 5 | 16.22 | 7.01 | 1.39 | 6.1 | 6 | 結腸、直腸和肛門癌 | 3 | 18.72 | 8.33 | 0.62 | 5.9 | 6 | 白血病 | 2 | 13.51 | 6.77 | 2.34 | 6.5 |
| 7 | 鼻咽癌 | 3 | 9.73 | 7.04 | 2.23 | 3.7 | 7 | 腦癌 | 2 | 12.48 | 7.96 | 4.45 | 3.9 | 7 | 胃癌 | 2 | 13.51 | 5.40 | 1.37 | 6.5 |
| 8 | 胰臟癌 | 3 | 9.73 | 5.82 | 1.11 | 3.7 | 8 | 口腔癌 | 2 | 12.48 | 7.89*- | 0.38 | 3.9 | 8 | 女性乳房癌 | 1 | 6.75 | 4.73 | 0.36 | 3.2 |
| 9 | 女性乳房癌 | 1 | 6.75 | 4.73 | 0.36 | 1.2 | 9 | 胰臟癌 | 1 | 6.24 | 3.63 | 0.62 | 2.0 | 9 | 子宮體癌 | 1 | 6.75 | 4.30 | 2.45 | 3.2 |
| 10 | 子宮體癌 | 1 | 6.75 | 4.30 | 2.45 | 1.2 | 10 | 膀胱癌 | 1 | 6.24 | 2.67 | 1.00 | 2.0 | 10 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 1 | 6.75 | 2.47 | 1.19 | 3.2 |
| | 其他非十大癌症死因 | 15 | 48.65 | 25.18*- | 0.59* | 18.3 | | 其他非十大癌症死因 | 7 | 43.67 | 23.68*- | 0.58 | 13.7 | | 其他非十大癌症死因 | 2 | 13.51 | 5.18*- | 0.32 | 6.5 |
| 11 | 口腔癌 | 2 | 6.49 | 4.26*- | 0.37 | 2.4 | 11 | 食道癌 | 1 | 6.24 | 2.67*- | 0.34 | 2.0 | 11 | 鼻腔、中耳和副鼻竇癌 | 1 | 6.75 | 1.30 | 28.33 | 3.2 |
| 12 | 腦癌 | 2 | 6.49 | 4.13 | 2.75 | 2.4 | 12 | 喉癌 | 1 | 6.24 | 2.54 | 2.08 | 2.0 | | | | | | | |
| 13 | 前列腺(攝護腺)癌 | 1 | 6.24 | 2.54*- | 0.39 | 1.2 | 13 | 前列腺(攝護腺)癌 | 1 | 6.24 | 2.54*- | 0.39 | 2.0 | | | | | | | |
| 14 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 1 | 3.24 | 1.38 | 0.53 | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 膀胱癌 | 1 | 3.24 | 1.13 | 0.76 | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | |

附 註：1. 彰化縣埤頭鄉年中人口數 計30,833人 男性16,029人 女性14,804人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣芳苑鄉癌症死亡原因

民國105年(2016年)

| 合 計 | | | | | | | 男 性 | | | | | | 女 性 | | | | | | | |
|--------|------------------------------|----------|------------------|------------|-----------|----------------|--------|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|--------|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|
| 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % |
| | 所有癌症死因 | 131 | 383.09 | 182.58*+ | 1.26* | 100.0 | | 所有癌症死因 | 87 | 480.98 | 250.44*+ | 1.28* | 100.0 | | 所有癌症死因 | 44 | 273.16 | 113.66 | 1.17 | 100.0 |
| | 十大癌症死因 | 106 | 309.98 | 150.24*+ | 1.37* | 80.9 | | 十大癌症死因 | 80 | 442.28 | 229.32*+ | 1.40* | 92.0 | | 十大癌症死因 | 37 | 229.70 | 103.52*+ | 1.46* | 84.1 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 30 | 87.73 | 40.00 | 1.23 | 22.9 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 22 | 121.63 | 61.87 | 1.33 | 25.3 | 1 | 肝和肝內膽管癌 | 11 | 68.29 | 35.64 | 1.90 | 25.0 |
| 2 | 肝和肝內膽管癌 | 27 | 78.96 | 38.84 | 1.48 | 20.6 | 2 | 肝和肝內膽管癌 | 16 | 88.46 | 44.44 | 1.25 | 18.4 | 2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 8 | 49.66 | 18.97 | 1.02 | 18.2 |
| 3 | 口腔癌 | 15 | 43.86 | 29.14*+ | 2.29* | 11.5 | 3 | 口腔癌 | 15 | 82.93 | 51.67*+ | 2.31* | 17.2 | 3 | 膽囊和其他膽道癌 | 3 | 18.62 | 6.70 | 4.04 | 6.8 |
| 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 8 | 23.39 | 9.81 | 0.68 | 6.1 | 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 6 | 33.17 | 15.93 | 0.93 | 6.9 | 4 | 胃癌 | 3 | 18.62 | 3.24 | 1.56 | 6.8 |
| 5 | 胃癌 | 8 | 23.39 | 6.53 | 1.65 | 6.1 | 5 | 胃癌 | 5 | 27.64 | 10.26 | 1.72 | 5.7 | 5 | 卵巢癌 | 2 | 12.42 | 11.35 | 1.68 | 4.5 |
| 6 | 前列腺(攝護腺)癌 | 4 | 22.11 | 7.20 | 1.08 | 3.1 | 6 | 食道癌 | 4 | 22.11 | 13.51 | 1.09 | 4.6 | 6 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 2 | 12.42 | 7.54 | 1.93 | 4.5 |
| 7 | 白血病 | 5 | 14.62 | 8.14 | 2.30 | 3.8 | 7 | 前列腺(攝護腺)癌 | 4 | 22.11 | 7.20 | 1.08 | 4.6 | 7 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 2 | 12.42 | 6.49 | 1.83 | 4.5 |
| 8 | 胰臟癌 | 5 | 14.62 | 6.70 | 1.43 | 3.8 | 8 | 白血病 | 3 | 16.59 | 12.34 | 2.70 | 3.4 | 8 | 胰臟癌 | 2 | 12.42 | 5.34 | 1.41 | 4.5 |
| 9 | 卵巢癌 | 2 | 12.42 | 11.35 | 1.68 | 1.5 | 9 | 胰臟癌 | 3 | 16.59 | 8.05 | 1.43 | 3.4 | 9 | 女性乳房癌 | 2 | 12.42 | 4.56*- | 0.61 | 4.5 |
| 10 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 2 | 12.42 | 7.54 | 1.93 | 1.5 | 10 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 2 | 11.06 | 4.05 | 1.37 | 2.3 | 10 | 白血病 | 2 | 12.42 | 3.69 | 1.88 | 4.5 |
| | 其他非十大癌症死因 | 25 | 73.11 | 32.34 | 0.93 | 19.1 | | 其他非十大癌症死因 | 7 | 38.70 | 21.12 | 0.67 | 8.0 | | 其他非十大癌症死因 | 7 | 43.46 | 10.14*- | 0.58 | 15.9 |
| 11 | 女性乳房癌 | 2 | 12.42 | 4.56*- | 0.61 | 1.5 | 11 | 鼻咽癌 | 1 | 5.53 | 3.33 | 0.68 | 1.1 | 11 | 結腸、直腸和肛門癌 | 2 | 12.42 | 3.69*- | 0.38 | 4.5 |
| 12 | 食道癌 | 4 | 11.70 | 7.54 | 1.09 | 3.1 | 12 | 甲狀腺癌 | 1 | 5.53 | 2.84 | 3.89 | 1.1 | 12 | 膀胱癌 | 1 | 6.21 | 1.36 | 2.49 | 2.3 |
| 13 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 4 | 11.70 | 4.69 | 1.59 | 3.1 | 13 | 膀胱癌 | 1 | 5.53 | 2.84 | 0.72 | 1.1 | 13 | 腦癌 | 1 | 6.21 | 0.94 | 2.73 | 2.3 |
| 14 | 膽囊和其他膽道癌 | 3 | 8.77 | 3.52 | 2.30 | 2.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 膀胱癌 | 2 | 5.85 | 2.16 | 1.12 | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | |

附 註：1. 彰化縣芳苑鄉年中人口數 計34,196人 男性18,088人 女性16,108人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣大城鄉癌症死亡原因

民國105年(2016年)

| 合 計 | | | | | | | 男 性 | | | | | | | 女 性 | | | | | | |
|-----|------------------------------|----------|------------------|------------|-----------|----------------|-----|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|-----|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|
| 順位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % |
| | 所有癌症死因 | 75 | 431.03 | 188.85*+ | 1.30* | 100.0 | | 所有癌症死因 | 56 | 594.16 | 274.35*+ | 1.49* | 100.0 | | 所有癌症死因 | 19 | 238.24 | 82.82 | 0.91 | 100.0 |
| | 十大癌症死因 | 68 | 390.80 | 173.83*+ | 1.53* | 90.7 | | 十大癌症死因 | 52 | 551.72 | 257.04*+ | 1.71* | 92.9 | | 十大癌症死因 | 19 | 238.24 | 82.82 | 1.22 | 100.0 |
| 1 | 肝和肝內膽管癌 | 28 | 160.92 | 58.49*+ | 2.72* | 37.3 | 1 | 肝和肝內膽管癌 | 20 | 212.20 | 86.87*+ | 2.78* | 35.7 | 1 | 肝和肝內膽管癌 | 8 | 100.31 | 28.60 | 2.44* | 42.1 |
| 2 | 口腔癌 | 11 | 63.22 | 42.80*+ | 3.12* | 14.7 | 2 | 口腔癌 | 11 | 116.71 | 68.81*+ | 3.05* | 19.6 | 2 | 女性乳房癌 | 2 | 25.08 | 14.95 | 1.12 | 10.5 |
| 3 | 氣管、支氣管和肺癌 | 9 | 51.72 | 16.87 | 0.66 | 12.0 | 3 | 氣管、支氣管和肺癌 | 7 | 74.27 | 29.84 | 0.75 | 12.5 | 3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 2 | 25.08 | 4.74*- | 0.68 | 10.5 |
| 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 6 | 34.48 | 13.07 | 0.93 | 8.0 | 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 4 | 42.44 | 18.99 | 1.13 | 7.1 | 4 | 氣管、支氣管和肺癌 | 2 | 25.08 | 4.28*- | 0.45 | 10.5 |
| 5 | 女性乳房癌 | 2 | 25.08 | 14.95 | 1.12 | 2.7 | 5 | 食道癌 | 3 | 31.83 | 16.72 | 1.49 | 5.4 | 5 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 1 | 12.54 | 11.27 | 1.66 | 5.3 |
| 6 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 3 | 17.24 | 10.24 | 2.17 | 4.0 | 6 | 胰臟癌 | 2 | 21.22 | 11.54 | 1.73 | 3.6 | 6 | 胃癌 | 1 | 12.54 | 10.56 | 0.93 | 5.3 |
| 7 | 食道癌 | 3 | 17.24 | 9.24 | 1.53 | 4.0 | 7 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 2 | 21.22 | 11.09 | 2.46 | 3.6 | 7 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 1 | 12.54 | 2.96 | 1.73 | 5.3 |
| 8 | 胰臟癌 | 3 | 17.24 | 8.10 | 1.54 | 4.0 | 8 | 前列腺(攝護腺)癌 | 1 | 10.61 | 6.01 | 0.49 | 1.8 | 8 | 胰臟癌 | 1 | 12.54 | 2.96 | 1.24 | 5.3 |
| 9 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 1 | 12.54 | 2.96 | 1.73 | 1.3 | 9 | 甲狀腺癌 | 1 | 10.61 | 3.83 | 7.14 | 1.8 | 9 | 甲狀腺癌 | 1 | 12.54 | 2.50 | 8.60 | 5.3 |
| 10 | 胃癌 | 2 | 11.49 | 6.37 | 0.74 | 2.7 | 10 | 白血病 | 1 | 10.61 | 3.32 | 1.64 | 1.8 | | | | | | | |
| | 其他非十大癌症死因 | 7 | 40.23 | 15.02*- | 0.52 | 9.3 | | 其他非十大癌症死因 | 4 | 42.44 | 17.31*- | 0.55 | 7.1 | | 其他非十大癌症死因 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 11 | 甲狀腺癌 | 2 | 11.49 | 2.62 | 7.76 | 2.7 | 11 | 胃癌 | 1 | 10.61 | 3.32 | 0.63 | 1.8 | | | | | | | |
| 12 | 前列腺(攝護腺)癌 | 1 | 10.61 | 6.01 | 0.49 | 1.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 白血病 | 1 | 5.75 | 1.57 | 0.85 | 1.3 | | | | | | | | | | | | | | |

附 註：1. 彰化縣大城鄉年中人口數 計17,400人 男性9,425人 女性7,975人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣竹塘鄉癌症死亡原因

民國105年(2016年)

| 合 計 | | | | | | | 男 性 | | | | | | | 女 性 | | | | | | |
|-----|------------------------------|----------|------------------|------------|-----------|----------------|-----|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|-----|------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------------|
| 順位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % | 順位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 標準化 死亡率 | 標準 死亡比 | 死亡 百分比 % |
| | 所有癌症死因 | 61 | 391.93 | 178.16 | 1.27 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 42 | 511.76 | 264.92 | 1.38 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 19 | 258.22 | 87.91 | 1.07 | 100.0 |
| | 十大癌症死因 | 50 | 321.25 | 145.85 | 1.35 | 82.0 | | 十大癌症死因 | 36 | 438.65 | 235.06*+ | 1.49* | 85.7 | | 十大癌症死因 | 17 | 231.04 | 80.56 | 1.43 | 89.5 |
| 1 | 肝和肝內膽管癌 | 18 | 115.65 | 46.18 | 2.12* | 29.5 | 1 | 肝和肝內膽管癌 | 15 | 182.77 | 83.83*+ | 2.59* | 35.7 | 1 | 結腸、直腸和肛門癌 | 5 | 67.95 | 15.71 | 1.99 | 26.3 |
| 2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 11 | 70.68 | 26.79 | 0.98 | 18.0 | 2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 8 | 97.48 | 45.29 | 1.08 | 19.0 | 2 | 肝和肝內膽管癌 | 3 | 40.77 | 12.56 | 1.08 | 15.8 |
| 3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 8 | 51.40 | 18.31 | 1.48 | 13.1 | 3 | 口腔癌 | 3 | 36.55 | 23.50 | 1.00 | 7.1 | 3 | 氣管、支氣管和肺癌 | 3 | 40.77 | 7.79 | 0.81 | 15.8 |
| 4 | 口腔癌 | 4 | 25.70 | 16.93 | 1.32 | 6.6 | 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 3 | 36.55 | 19.83 | 1.04 | 7.1 | 4 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 2 | 27.18 | 17.23 | 3.92 | 10.5 |
| 5 | 前列腺(攝護腺)癌 | 2 | 24.37 | 8.77 | 1.26 | 3.3 | 5 | 前列腺(攝護腺)癌 | 2 | 24.37 | 8.77 | 1.26 | 4.8 | 5 | 女性乳房癌 | 1 | 13.59 | 10.00 | 0.66 | 5.3 |
| 6 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 3 | 19.28 | 10.71 | 2.59 | 4.9 | 6 | 胃癌 | 1 | 12.18 | 18.14 | 0.78 | 2.4 | 6 | 卵巢癌 | 1 | 13.59 | 7.43 | 1.78 | 5.3 |
| 7 | 女性乳房癌 | 1 | 13.59 | 10.00 | 0.66 | 1.6 | 7 | 食道癌 | 1 | 12.18 | 10.84 | 0.59 | 2.4 | 7 | 口腔癌 | 1 | 13.59 | 6.17 | 4.66 | 5.3 |
| 8 | 卵巢癌 | 1 | 13.59 | 7.43 | 1.78 | 1.6 | 8 | 間皮和軟組織癌 | 1 | 12.18 | 9.77 | 8.57 | 2.4 | 8 | 小腸癌 | 1 | 13.59 | 3.67 | 11.45 | 5.3 |
| 9 | 胃癌 | 1 | 6.43 | 9.35 | 0.45 | 1.6 | 9 | 腎臟癌 | 1 | 12.18 | 8.21 | 6.47 | 2.4 | | | | | | | |
| 10 | 食道癌 | 1 | 6.43 | 6.24 | 0.59 | 1.6 | 10 | 腦癌 | 1 | 12.18 | 6.87 | 4.00 | 2.4 | | | | | | | |
| | 其他非十大癌症死因 | 11 | 70.68 | 32.31 | 0.99 | 18.0 | | 其他非十大癌症死因 | 6 | 73.11 | 29.87 | 0.96 | 14.3 | | 其他非十大癌症死因 | 2 | 27.18 | 7.34*- | 0.34 | 10.5 |
| 11 | 間皮和軟組織癌 | 1 | 6.43 | 5.62 | 3.38 | 1.6 | 11 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 1 | 12.18 | 4.59 | 1.55 | 2.4 | | | | | | | |
| 12 | 腎臟癌 | 1 | 6.43 | 5.01 | 2.57 | 1.6 | 12 | 膽囊和其他膽道癌 | 1 | 12.18 | 4.18 | 4.17 | 2.4 | | | | | | | |
| 13 | 腦癌 | 1 | 6.43 | 4.07 | 2.41 | 1.6 | 13 | 鼻咽癌 | 1 | 12.18 | 4.18 | 1.47 | 2.4 | | | | | | | |
| 14 | 小腸癌 | 1 | 6.43 | 2.04 | 6.93 | 1.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 膽囊和其他膽道癌 | 1 | 6.43 | 1.62 | 1.66 | 1.6 | | | | | | | | | | | | | | |

附 註：1. 彰化縣竹塘鄉年中人口數 計15,564人 男性8,207人 女性7,358人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

彰化縣溪州鄉癌症死亡原因

民國105年(2016年)

| 合 計 | | | | | | | 男 性 | | | | | | 女 性 | | | | | | | |
|--------|------------------------------|------------|--------------------|----------------|--------------|-------------------|--------|------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------|------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死 亡 人 數 | 每十萬 人口 死 亡 率 | 標 準 化 死 亡 率 | 標 準 死 亡 比 | 死 亡 百 分 比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死 亡 人 數 | 每十萬 男 性 人 口 死 亡 率 | 標 準 化 死 亡 率 | 標 準 死 亡 比 | 死 亡 百 分 比 % | 順 位 | 癌 症 死 亡 原 因 (ICD-10分類) | 死 亡 人 數 | 每十萬 女 性 人 口 死 亡 率 | 標 準 化 死 亡 率 | 標 準 死 亡 比 | 死 亡 百 分 比 % |
| | 所有癌症死因 | 82 | 269.16 | 133.20 | 0.98 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 53 | 332.33 | 178.32 | 0.99 | 100.0 | | 所有癌症死因 | 29 | 199.77 | 91.61 | 0.97 | 100.0 |
| | 十大癌症死因 | 69 | 226.49 | 116.92 | 1.13 | 84.1 | | 十大癌症死因 | 49 | 307.25 | 167.32 | 1.20 | 92.5 | | 十大癌症死因 | 25 | 172.21 | 85.38 | 1.16 | 86.2 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 17 | 55.80 | 25.44 | 0.89 | 20.7 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 11 | 68.97 | 33.71 | 0.85 | 20.8 | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 6 | 41.33 | 21.68 | 0.97 | 20.7 |
| 2 | 肝和肝內膽管癌 | 12 | 39.39 | 19.99 | 0.82 | 14.6 | 2 | 肝和肝內膽管癌 | 9 | 56.43 | 30.02 | 0.88 | 17.0 | 2 | 胃癌 | 4 | 27.55 | 14.59 | 2.66 | 13.8 |
| 3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 10 | 32.82 | 15.51 | 1.09 | 12.2 | 3 | 口腔癌 | 7 | 43.89 | 29.15 | 1.28 | 13.2 | 3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 4 | 27.55 | 9.96 | 0.97 | 13.8 |
| 4 | 口腔癌 | 9 | 29.54 | 18.56 | 1.62 | 11.0 | 4 | 食道癌 | 6 | 37.62 | 24.02 | 1.94 | 11.3 | 4 | 肝和肝內膽管癌 | 3 | 20.67 | 8.50 | 0.65 | 10.3 |
| 5 | 食道癌 | 7 | 22.98 | 14.76 | 2.25 | 8.5 | 5 | 結腸、直腸和肛門癌 | 6 | 37.62 | 20.24 | 1.19 | 11.3 | 5 | 子宮體癌 | 2 | 13.78 | 9.45 | 4.83 | 6.9 |
| 6 | 胃癌 | 5 | 16.41 | 8.53 | 1.34 | 6.1 | 6 | 鼻咽癌 | 3 | 18.81 | 10.19 | 2.44 | 5.7 | 6 | 口腔癌 | 2 | 13.78 | 6.86 | 6.04 | 6.9 |
| 7 | 子宮體癌 | 2 | 13.78 | 9.45 | 4.83 | 2.4 | 7 | 白血病 | 2 | 12.54 | 6.13 | 2.21 | 3.8 | 7 | 食道癌 | 1 | 6.89 | 4.05 | 6.44 | 3.4 |
| 8 | 鼻咽癌 | 3 | 9.85 | 5.03 | 2.14 | 3.7 | 8 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 2 | 12.54 | 5.24 | 1.77 | 3.8 | 8 | 間皮和軟組織癌 | 1 | 6.89 | 4.02 | 3.31 | 3.4 |
| 9 | 膽囊和其他膽道癌 | 3 | 9.85 | 2.95 | 2.98 | 3.7 | 9 | 膽囊和其他膽道癌 | 2 | 12.54 | 5.00 | 4.89 | 3.8 | 9 | 女性乳房癌 | 1 | 6.89 | 4.02 | 0.36 | 3.4 |
| 10 | 女性乳房癌 | 1 | 6.89 | 4.02 | 0.36 | 1.2 | 10 | 喉癌 | 1 | 6.27 | 3.62 | 1.97 | 1.9 | 10 | 胰臟癌 | 1 | 6.89 | 2.25 | 0.86 | 3.4 |
| | 其他非十大癌症死因 | 13 | 42.67 | 16.28*- | 0.59 | 15.9 | | 其他非十大癌症死因 | 4 | 25.08 | 11.00*- | 0.31* | 7.5 | | 其他非十大癌症死因 | 4 | 27.55 | 6.23*- | 0.48 | 13.8 |
| 11 | 白血病 | 2 | 6.56 | 2.91 | 1.12 | 2.4 | 11 | 胃癌 | 1 | 6.27 | 2.75 | 0.45 | 1.9 | 11 | 黑色素瘤和其他皮膚癌 | 1 | 6.89 | 1.46 | 6.18 | 3.4 |
| 12 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 2 | 6.56 | 1.95 | 1.02 | 2.4 | 12 | 前列腺(攝護腺)癌 | 1 | 6.27 | 2.74 | 0.37 | 1.9 | 12 | 膽囊和其他膽道癌 | 1 | 6.89 | 1.46 | 1.72 | 3.4 |
| 13 | 前列腺(攝護腺)癌 | 1 | 6.27 | 2.74 | 0.37 | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 喉癌 | 1 | 3.28 | 1.91 | 1.86 | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 間皮和軟組織癌 | 1 | 3.28 | 1.91 | 1.92 | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | |

附 註：1. 彰化縣溪州鄉年中人口數 計30,465人 男性15,948人 女性14,517人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O. 世界人口年齡結構為基準。「*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率($\alpha=0.05$)。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。*表示與彰化縣死亡率有顯著不同($\alpha=0.05$)。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計