

# 彰化縣彰化市主要死亡原因

## 民國108年(2019年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	1,561	671.42	362.55*-	0.90*	100.0		所有死亡原因	900	785.35	482.78*-	0.90*	100.0		所有死亡原因	661	560.67	261.43*-	0.93	100.0
	十大主要死因	1,234	530.77	285.52*-	0.93*	79.1		十大主要死因	731	637.88	386.40*-	0.93	81.2		十大主要死因	503	426.65	202.41	0.95	76.1
1	惡性腫瘤	459	197.42	115.11	0.93	29.4	1	惡性腫瘤	284	247.82	154.92	0.93	31.6	1	惡性腫瘤	175	148.44	81.70	0.94	26.5
2	肺炎	165	70.97	32.97	1.07	10.6	2	肺炎	98	85.52	46.94	1.07	10.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	70	59.37	24.91	0.89	10.6
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	147	63.23	32.71*-	0.86	9.4	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	77	67.19	41.18	0.86	8.6	3	肺炎	67	56.83	22.61	1.09	10.1
4	腦血管疾病	95	40.86	20.57	0.88	6.1	4	慢性下呼吸道疾病	61	53.23	30.01	1.11	6.8	4	糖尿病	42	35.62	16.41	0.83	6.4
5	糖尿病	90	38.71	20.24	0.99	5.8	5	腦血管疾病	54	47.12	27.56	0.86	6.0	5	腦血管疾病	41	34.78	14.95	0.92	6.2
6	慢性下呼吸道疾病	83	35.70	17.18	1.10	5.3	6	糖尿病	48	41.89	24.98	1.22	5.3	6	高血壓性疾病	33	27.99	12.01	1.11	5.0
7	事故傷害	54	23.23	14.57*-	0.63*	3.5	7	事故傷害	37	32.29	21.87*-	0.61*	4.1	7	慢性下呼吸道疾病	22	18.66	7.55	1.05	3.3
8	高血壓性疾病	50	21.51	10.78	0.92	3.2	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	28	24.43	14.25	1.10	3.1	8	慢性肝病及肝硬化	19	16.12	7.96	1.72*	2.9
9	慢性肝病及肝硬化	46	19.79	11.80	1.06	2.9	9	慢性肝病及肝硬化	27	23.56	15.76	0.88	3.0	9	事故傷害	17	14.42	8.45	0.73	2.6
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	45	19.36	9.59	0.90	2.9	10	高血壓性疾病	17	14.83	8.93	0.72	1.9	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	17	14.42	5.86*-	0.70	2.6
	其他非十大死因	327	140.65	77.03*-	0.82*	20.9		其他非十大死因	169	147.47	96.38*-	0.79*	18.8		其他非十大死因	158	134.02	59.02*-	0.87	23.9
11	血管性及未明示之癱瘓症	33	14.19	5.98*+	1.68*	2.1	11	血管性及未明示之癱瘓症	16	13.96	7.35*+	2.03*	1.8	11	血管性及未明示之癱瘓症	17	14.42	4.95	1.47	2.6
12	蓄意自我傷害(自殺)	23	9.89	7.57*-	0.65*	1.5	12	蓄意自我傷害(自殺)	15	13.09	11.12	0.64	1.7	12	帕金森病	9	7.63	3.90	1.63	1.4
13	敗血症	20	8.60	4.35	0.70	1.3	13	敗血症	13	11.34	7.22	0.87	1.4	13	蓄意自我傷害(自殺)	8	6.79	3.99	0.73	1.2
14	帕金森病	16	6.88	3.65	1.42	1.0	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	10	8.73	6.68	1.15	1.1	14	敗血症	7	5.94	1.93*-	0.52	1.1
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	15	6.45	4.38	0.96	1.0	15	主動脈瘤及剝離	9	7.85	5.32	1.23	1.0	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	4.24	2.28	0.74	0.8

附 註：1. 彰化縣彰化市年中人口數 計232,494.0人 男性114,599.0人 女性117,895.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣鹿港鎮主要死亡原因

## 民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	640	736.70	406.05	1.00	100.0		所有死亡原因	376	852.65	550.47	1.02	100.0		所有死亡原因	264	617.17	272.61	0.98	100.0
	十大主要死因	496	570.94	307.11	1.03	77.5		十大主要死因	292	662.16	430.98	1.00	77.7		十大主要死因	214	500.28	208.98	1.09	81.1
1	惡性腫瘤	190	218.71	124.55	1.06	29.7	1	惡性腫瘤	120	272.12	173.39	1.07	31.9	1	惡性腫瘤	70	163.64	78.77	1.05	26.5
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	68	78.27	40.04	1.06	10.6	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	31	70.30	45.68	0.93	8.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	37	86.50	31.64	1.20	14.0
3	腦血管疾病	43	49.50	26.40	1.07	6.7	3	肺炎	26	58.96	35.16	0.76	6.9	3	糖尿病	19	44.42	21.01	0.99	7.2
4	肺炎	41	47.19	22.76*-	0.70*	6.4	4	腦血管疾病	25	56.69	36.75	1.08	6.6	4	腦血管疾病	18	42.08	17.68	1.05	6.8
5	糖尿病	38	43.74	24.17	1.12	5.9	5	事故傷害	20	45.35	35.85	0.88	5.3	5	肺炎	15	35.07	12.35*-	0.62	5.7
6	慢性下呼吸道疾病	30	34.53	16.01	1.05	4.7	6	糖尿病	19	43.09	27.67	1.30	5.1	6	衰老/老邁	13	30.39	10.44*+	3.36*	4.9
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	24	27.63	13.24	1.28	3.8	7	慢性下呼吸道疾病	18	40.82	23.81	0.89	4.8	7	慢性下呼吸道疾病	12	28.05	10.46	1.46	4.5
8	事故傷害	23	26.48	20.89	0.73	3.6	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	13	29.48	17.88	1.37	3.5	8	高血壓性疾病	11	25.72	10.05	0.95	4.2
9	衰老/老邁	22	25.32	10.54*+	3.17*	3.4	9	慢性肝病及肝硬化	11	24.94	17.07	0.95	2.9	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	25.72	9.45	1.19	4.2
10	高血壓性疾病	17	19.57	8.53	0.83	2.7	10	蓄意自我傷害(自殺)	9	20.41	17.72	1.00	2.4	10	敗血症	8	18.70	7.14	1.53	3.0
	其他非十大死因	144	165.76	98.94	0.91	22.5		其他非十大死因	84	190.48	119.49	1.06	22.3		其他非十大死因	50	116.89	63.63	0.69*	18.9
11	蓄意自我傷害(自殺)	14	16.12	12.81	1.07	2.2	11	衰老/老邁	9	20.41	10.97	2.94*	2.4	11	蓄意自我傷害(自殺)	5	11.69	7.65	1.26	1.9
12	敗血症	12	13.81	6.51	1.11	1.9	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	6	13.61	10.05	2.36	1.6	12	事故傷害	3	7.01	6.61	0.36	1.1
13	慢性肝病及肝硬化	11	12.66	8.05	0.70	1.7	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	6	13.61	8.79	1.86	1.6	13	主動脈瘤及剝離	3	7.01	3.13	2.89	1.1
14	主動脈瘤及剝離	9	10.36	5.45	2.39*	1.4	14	主動脈瘤及剝離	6	13.61	8.17	2.22	1.6	14	疝氣及腸阻塞	2	4.68	3.29	1.93	0.8
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	8	9.21	5.07	1.39	1.3	15	高血壓性疾病	6	13.61	7.07	0.68	1.6	15	結核病	2	4.68	2.35	2.62	0.8

附 註：1. 彰化縣鹿港鎮年中人口數 計86,874.5人 男性44,098.5人 女性42,776.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣和美鎮主要死亡原因

## 民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	601	662.95	390.51	0.96	100.0		所有死亡原因	339	735.80	505.11	0.93	100.0		所有死亡原因	262	587.65	290.42	1.02	100.0
	十大主要死因	457	504.10	300.23	0.95	76.0		十大主要死因	262	568.68	391.05	0.93	77.3		十大主要死因	200	448.59	224.94	1.04	76.3
1	惡性腫瘤	178	196.35	124.19	0.99	29.6	1	惡性腫瘤	105	227.90	156.89	0.93	31.0	1	惡性腫瘤	73	163.74	95.05	1.11	27.9
2	肺炎	69	76.11	37.80	1.26	11.5	2	肺炎	35	75.97	49.06	1.10	10.3	2	肺炎	34	76.26	29.90	1.49*	13.0
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	39	43.02	25.37*-	0.63*	6.5	3	事故傷害	27	58.60	44.95	1.16	8.0	3	糖尿病	26	58.32	25.94	1.43	9.9
4	事故傷害	33	36.40	27.42	1.05	5.5	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	24	52.09	35.86	0.73	7.1	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	33.64	14.97*-	0.52*	5.7
5	糖尿病	32	35.30	19.46	0.99	5.3	5	腦血管疾病	19	41.24	28.36	0.85	5.6	5	腦血管疾病	12	26.92	12.71	0.75	4.6
6	腦血管疾病	31	34.20	19.36	0.80	5.2	6	慢性肝病及肝硬化	15	32.56	23.79	1.23	4.4	6	高血壓性疾病	11	24.67	11.22	1.01	4.2
7	慢性下呼吸道疾病	22	24.27	13.02	0.82	3.7	7	慢性下呼吸道疾病	14	30.39	19.40	0.74	4.1	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	24.67	9.96	1.26	4.2
8	高血壓性疾病	21	23.16	12.19	1.08	3.5	8	高血壓性疾病	10	21.71	13.85	1.16	2.9	8	慢性下呼吸道疾病	8	17.94	8.88	1.04	3.1
9	慢性肝病及肝硬化	17	18.75	13.14	1.05	2.8	9	敗血症	7	15.19	9.47	1.32	2.1	9	事故傷害	6	13.46	10.74	0.73	2.3
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	15	16.55	8.29	0.84	2.5	10	糖尿病	6	13.02	9.42*-	0.42*	1.8	10	蓄意自我傷害(自殺)	4	8.97	5.57	0.98	1.5
	其他非十大死因	144	158.84	90.28	1.00	24.0		其他非十大死因	77	167.13	114.06	0.95	22.7		其他非十大死因	62	139.06	65.47	0.94	23.7
11	敗血症	11	12.13	6.41	1.07	1.8	11	主動脈瘤及剝離	6	13.02	8.77	2.22	1.8	11	敗血症	4	8.97	4.52	0.81	1.5
12	蓄意自我傷害(自殺)	9	9.93	7.55	0.66	1.5	12	蓄意自我傷害(自殺)	5	10.85	9.37	0.53	1.5	12	血管性及未明示之癱瘓症	4	8.97	3.84	0.91	1.5
13	血管性及未明示之癱瘓症	9	9.93	5.20	1.28	1.5	13	血管性及未明示之癱瘓症	5	10.85	7.33	1.91	1.5	13	衰老/老邁	4	8.97	3.11	1.11	1.5
14	主動脈瘤及剝離	8	8.82	4.99	2.17	1.3	14	結核病	5	10.85	6.99	2.56	1.5	14	帕金森病	3	6.73	3.68	1.52	1.1
15	衰老/老邁	7	7.72	3.75	1.09	1.2	15	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	8.68	5.07*-	0.44	1.2	15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	6.73	2.40	1.99	1.1

附 註：1. 彰化縣和美鎮年中人口數 計90,656.0人 男性46,072.0人 女性44,584.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣北斗鎮主要死亡原因

## 民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	269	806.98	408.89	1.01	100.0		所有死亡原因	163	970.70	568.48	1.06	100.0		所有死亡原因	106	640.79	260.40	0.95	100.0
	十大主要死因	211	632.99	314.79	1.04	78.4		十大主要死因	131	780.13	452.38	1.09	80.4		十大主要死因	83	501.75	194.04	1.05	78.3
1	惡性腫瘤	73	219.00	116.93	0.98	27.1	1	惡性腫瘤	40	238.21	143.91	0.85	24.5	1	惡性腫瘤	33	199.49	91.30	1.19	31.1
2	腦血管疾病	22	66.00	30.13	1.30	8.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	83.37	50.60	1.02	8.6	2	高血壓性疾病	11	66.50	19.49	2.26*	10.4
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	63.00	32.00	0.79	7.8	3	肺炎	14	83.37	43.33	0.98	8.6	3	腦血管疾病	10	60.45	20.06	1.40	9.4
4	高血壓性疾病	21	63.00	26.68*+	2.46*	7.8	4	腦血管疾病	12	71.46	40.00	1.23	7.4	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	7	42.32	14.25*-	0.55	6.6
5	糖尿病	18	54.00	22.98	1.27	6.7	5	慢性下呼吸道疾病	11	65.51	34.56	1.28	6.7	5	糖尿病	7	42.32	14.08	0.87	6.6
6	肺炎	18	54.00	22.94	0.73	6.7	6	糖尿病	11	65.51	33.88	1.79	6.7	6	肺炎	4	24.18	6.95*-	0.39	3.8
7	慢性下呼吸道疾病	13	39.00	17.78	1.08	4.8	7	高血壓性疾病	10	59.55	32.85	2.72*	6.1	7	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	18.14	9.14	4.44	2.8
8	事故傷害	9	27.00	15.50*-	0.70	3.3	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	41.69	24.48	1.75	4.3	8	事故傷害	3	18.14	8.40	0.86	2.8
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	27.00	13.79	1.14	3.3	9	蓄意自我傷害(自殺)	6	35.73	26.11	1.69	3.7	9	衰老/老邁	3	18.14	4.85	1.87	2.8
10	蓄意自我傷害(自殺)	7	21.00	16.07	1.35	2.6	10	事故傷害	6	35.73	22.65	0.65	3.7	10	敗血症	2	12.09	5.51	0.92	1.9
	其他非十大死因	58	174.00	94.10	0.92	21.6		其他非十大死因	32	190.57	116.11	0.94	19.6		其他非十大死因	23	139.04	66.36	0.69	21.7
11	慢性肝病及肝硬化	5	15.00	9.27	0.79	1.9	11	慢性肝病及肝硬化	4	23.82	16.06	0.86	2.5	11	慢性下呼吸道疾病	2	12.09	4.94	0.58	1.9
12	敗血症	5	15.00	7.37	1.11	1.9	12	敗血症	3	17.87	9.57	1.28	1.8	12	病毒性肝炎	2	12.09	4.77	6.99	1.9
13	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	9.00	4.79	2.16	1.1	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	11.91	6.31	1.46	1.2	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	12.09	3.72	2.29	1.9
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	9.00	4.14	1.56	1.1	14	結核病	2	11.91	5.85	2.25	1.2	14	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	12.09	3.72*-	0.52	1.9
15	衰老/老邁	3	9.00	3.07	1.03	1.1	15	腸道感染症	1	5.96	4.14	13.09	0.6	15	蓄意自我傷害(自殺)	1	6.05	6.40	0.62	0.9

附 註：1. 彰化縣北斗鎮年中人口數 計33,334.5人 男性16,792.0人 女性16,542.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣員林市主要死亡原因

## 民國108年(2019年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	856	685.08	389.18	0.95	100.0		所有死亡原因	477	769.23	495.70*-	0.91*	100.0		所有死亡原因	379	602.17	293.23	1.02	100.0
	十大主要死因	648	518.61	290.10*-	0.93	75.7		十大主要死因	364	587.00	372.14*-	0.88*	76.3		十大主要死因	284	451.23	216.97	1.04	74.9
1	惡性腫瘤	247	197.68	115.41	0.94	28.9	1	惡性腫瘤	140	225.77	141.62*-	0.86	29.4	1	惡性腫瘤	107	170.01	93.91	1.10	28.2
2	肺炎	87	69.63	34.37	1.10	10.2	2	肺炎	51	82.24	47.56	1.07	10.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	44	69.91	28.49	1.07	11.6
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	83	66.43	34.79	0.93	9.7	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	39	62.89	39.65	0.83	8.2	3	肺炎	36	57.20	24.54	1.13	9.5
4	腦血管疾病	62	49.62	27.95	1.10	7.2	4	事故傷害	36	58.06	44.86	1.11	7.5	4	腦血管疾病	31	49.25	23.22	1.35	8.2
5	事故傷害	46	36.82	26.52	1.02	5.4	5	腦血管疾病	31	49.99	32.37	0.94	6.5	5	高血壓性疾病	14	22.24	9.34	0.90	3.7
6	慢性下呼吸道疾病	32	25.61	12.16	0.82	3.7	6	慢性下呼吸道疾病	20	32.25	18.84	0.70	4.2	6	糖尿病	13	20.65	9.23*-	0.50*	3.4
7	糖尿病	26	20.81	11.19*-	0.55*	3.0	7	糖尿病	13	20.96	13.06*-	0.62	2.7	7	慢性下呼吸道疾病	12	19.07	6.87	1.11	3.2
8	高血壓性疾病	24	19.21	10.35	0.85	2.8	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	13	20.96	12.04	0.97	2.7	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	17.48	7.20	0.87	2.9
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	24	19.21	9.33	0.92	2.8	9	慢性肝病及肝硬化	11	17.74	11.39*-	0.66	2.3	9	事故傷害	10	15.89	8.94	0.83	2.6
10	慢性肝病及肝硬化	17	13.61	8.03	0.74	2.0	10	高血壓性疾病	10	16.13	10.75	0.81	2.1	10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	6	9.53	5.21	2.05	1.6
	其他非十大死因	208	166.47	99.09	1.00	24.3		其他非十大死因	113	182.23	123.56	1.01	23.7		其他非十大死因	95	150.94	76.27	0.98	25.1
11	敗血症	13	10.40	5.70	0.87	1.5	11	蓄意自我傷害(自殺)	9	14.51	11.78	0.71	1.9	11	慢性肝病及肝硬化	6	9.53	4.98	1.05	1.6
12	蓄意自我傷害(自殺)	11	8.80	7.29	0.59	1.3	12	敗血症	8	12.90	7.81	1.02	1.7	12	敗血症	5	7.94	3.97	0.72	1.3
13	衰老/老邁	10	8.00	3.68	1.09	1.2	13	衰老/老邁	6	9.68	5.66	1.41	1.3	13	血管性及未明示之癱瘓症	5	7.94	2.94	0.83	1.3
14	主動脈瘤及剝離	8	6.40	3.42	1.48	0.9	14	主動脈瘤及剝離	4	6.45	4.10	1.02	0.8	14	主動脈瘤及剝離	4	6.36	2.57	2.89	1.1
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	7	5.60	3.15	1.06	0.8	15	皮膚及皮下組織疾病	3	4.84	2.91	1.17	0.6	15	衰老/老邁	4	6.36	2.12	0.82	1.1

附 註：1. 彰化縣員林市年中人口數 計124,949.0人 男性62,010.0人 女性62,939.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣溪湖鎮主要死亡原因

## 民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	444	803.26	456.33	1.06	100.0		所有死亡原因	268	959.10	645.78*+	1.15*	100.0		所有死亡原因	176	643.93	280.17	0.95	100.0
	十大主要死因	328	593.40	337.91	1.02	73.9		十大主要死因	200	715.74	485.09	1.11	74.6		十大主要死因	133	486.61	201.94	0.99	75.6
1	惡性腫瘤	113	204.43	126.33	0.97	25.5	1	惡性腫瘤	72	257.67	175.77	1.01	26.9	1	惡性腫瘤	41	150.01	80.47	0.93	23.3
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	42	75.98	36.42	0.99	9.5	2	事故傷害	28	100.20	77.14*+	1.93*	10.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	76.83	26.58	0.97	11.9
3	肺炎	35	63.32	30.01	0.89	7.9	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	75.15	46.85	1.00	7.8	3	肺炎	18	65.86	23.85	1.03	10.2
4	事故傷害	31	56.08	42.78*+	1.54*	7.0	4	慢性下呼吸道疾病	17	60.84	37.67	1.34	6.3	4	糖尿病	14	51.22	18.52	1.07	8.0
5	慢性下呼吸道疾病	22	39.80	20.42	1.15	5.0	5	肺炎	17	60.84	37.14	0.80	6.3	5	腦血管疾病	10	36.59	10.37	0.85	5.7
6	糖尿病	21	37.99	18.94	0.95	4.7	6	腦血管疾病	11	39.37	24.46	0.76	4.1	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	25.61	8.96	1.09	4.0
7	腦血管疾病	21	37.99	18.12	0.79	4.7	7	蓄意自我傷害(自殺)	10	35.79	29.91	1.75	3.7	7	衰老/老邁	7	25.61	7.21	2.46	4.0
8	蓄意自我傷害(自殺)	15	27.14	20.99	1.79	3.4	8	慢性肝病及肝硬化	8	28.63	21.55	1.09	3.0	8	蓄意自我傷害(自殺)	5	18.29	12.46	1.90	2.8
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	15	27.14	12.43	1.21	3.4	9	高血壓性疾病	8	28.63	17.88	1.44	3.0	9	慢性下呼吸道疾病	5	18.29	7.17	0.86	2.8
10	高血壓性疾病	13	23.52	11.46	0.95	2.9	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	28.63	16.73	1.34	3.0	10	高血壓性疾病	5	18.29	6.36	0.61	2.8
	其他非十大死因	116	209.86	118.42	1.16	26.1		其他非十大死因	68	243.35	160.69	1.28	25.4		其他非十大死因	43	157.32	78.24	0.84	24.4
11	衰老/老邁	10	18.09	6.87	2.09	2.3	11	糖尿病	7	25.05	17.52	0.76	2.6	11	血管性及未明示之癱瘓症	5	18.29	6.10	1.45	2.8
12	慢性肝病及肝硬化	9	16.28	11.55	0.90	2.0	12	敗血症	6	21.47	15.15	1.72	2.2	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	14.63	5.26	2.88	2.3
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	7	12.66	6.62	2.33	1.6	13	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	4	14.31	9.10	3.78*	1.5	13	事故傷害	3	10.98	10.66	0.54	1.7
14	敗血症	6	10.85	6.66	0.84	1.4	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	10.74	7.60	1.88	1.1	14	胃及十二指腸潰瘍	2	7.32	2.82	2.86	1.1
15	血管性及未明示之癱瘓症	6	10.85	4.36	1.16	1.4	15	帕金森病	3	10.74	7.06	2.24	1.1	15	膽結石及其他膽囊疾患	2	7.32	2.29	2.43	1.1

附 註：1. 彰化縣溪湖鎮年中人口數 計55,275.0人 男性27,943.0人 女性27,332.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣田中鎮主要死亡原因

## 民國108年(2019年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	421	1,017.1 0	451.56	1.07	100.0		所有死亡原因	279	1,311.8 3	651.64*+	1.15*	100.0		所有死亡原因	142	705.59	254.69	0.91	100.0
	十大主要死因	351	847.99	369.57*+	1.16*	83.4		十大主要死因	231	1,086.1 4	544.41*+	1.22*	82.8		十大主要死因	121	601.24	213.37	1.04	85.2
1	惡性腫瘤	99	239.18	118.41	0.93	23.5	1	惡性腫瘤	66	310.33	162.19	0.94	23.7	1	惡性腫瘤	33	163.98	75.59	0.88	23.2
2	肺炎	53	128.04	45.12*+	1.37*	12.6	2	肺炎	36	169.27	70.27*+	1.41	12.9	2	肺炎	17	84.47	21.90	1.16	12.0
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	44	106.30	47.06	1.09	10.5	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	28	131.65	69.05	1.28	10.0	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	79.50	24.77	0.87	11.3
4	慢性下呼吸道疾病	38	91.81	33.40*+	2.02*	9.0	4	慢性下呼吸道疾病	28	131.65	53.00*+	1.85*	10.0	4	腦血管疾病	12	59.63	19.67	1.20	8.5
5	腦血管疾病	37	89.39	35.53	1.46*	8.8	5	腦血管疾病	25	117.55	52.69	1.58*	9.0	5	糖尿病	10	49.69	16.87	0.89	7.0
6	糖尿病	21	50.73	20.38	0.99	5.0	6	慢性肝病及肝硬化	11	51.72	38.22	1.71	3.9	6	慢性下呼吸道疾病	10	49.69	15.46	2.02	7.0
7	高血壓性疾病	18	43.49	16.04	1.36	4.3	7	糖尿病	11	51.72	23.78	1.13	3.9	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	39.75	15.11	1.46	5.6
8	慢性肝病及肝硬化	14	33.82	22.81	1.62	3.3	8	高血壓性疾病	10	47.02	21.72	1.62	3.6	8	高血壓性疾病	8	39.75	10.19	1.15	5.6
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	14	33.82	11.69	1.16	3.3	9	事故傷害	9	42.32	30.16	0.68	3.2	9	事故傷害	4	19.88	7.66	0.86	2.8
10	事故傷害	13	31.41	19.14	0.74	3.1	10	蓄意自我傷害(自殺)	7	32.91	23.35	1.45	2.5	10	慢性肝病及肝硬化	3	14.91	6.13	1.34	2.1
	其他非十大死因	70	169.11	82.00	0.76*	16.6		其他非十大死因	48	225.69	107.23	0.88	17.2		其他非十大死因	21	104.35	41.32*-	0.52*	14.8
11	蓄意自我傷害(自殺)	9	21.74	15.01	1.31	2.1	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	28.21	8.48	0.89	2.2	11	蓄意自我傷害(自殺)	2	9.94	5.89	0.95	1.4
12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	7.25	3.55	0.85	0.7	12	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	14.11	4.70	2.54	1.1	12	敗血症	1	4.97	2.94	0.32	0.7
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	7.25	2.93	1.08	0.7	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	9.40	5.01	0.94	0.7	13	膽結石及其他膽囊疾患	1	4.97	2.04	1.42	0.7
14	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	7.25	2.21	1.40	0.7	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	9.40	4.75	1.26	0.7	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	4.97	2.04	0.70	0.7
15	疝氣及腸阻塞	3	7.25	2.03	2.99	0.7	15	疝氣及腸阻塞	2	9.40	3.14	5.05	0.7	15	動脈粥樣硬化	1	4.97	1.61	14.60	0.7

附 註：1. 彰化縣田中鎮年中人口數 計41,392.5人 男性21,267.5人 女性20,125.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣二林鎮主要死亡原因

## 民國108年(2019年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	530	1,053.5 5	452.51	1.05	100.0		所有死亡原因	290	1,121.0 8	591.20	1.04	100.0		所有死亡原因	240	982.12	322.49	1.06	100.0
	十大主要死因	422	838.87	354.86*+	1.12*	79.6		十大主要死因	241	931.65	496.00	1.11	83.1		十大主要死因	185	757.05	236.85	1.13	77.1
1	惡性腫瘤	140	278.30	131.20	1.05	26.4	1	惡性腫瘤	88	340.19	178.90	1.06	30.3	1	惡性腫瘤	52	212.79	89.97	1.03	21.7
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	91	180.89	66.37*+	1.75*	17.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	41	158.50	77.00*+	1.65*	14.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	50	204.61	53.29*+	1.82*	20.8
3	肺炎	42	83.49	26.32	0.84	7.9	3	事故傷害	23	88.91	67.26	1.46	7.9	3	肺炎	19	77.75	18.01	0.85	7.9
4	腦血管疾病	35	69.57	27.19	1.07	6.6	4	肺炎	23	88.91	36.93	0.84	7.9	4	糖尿病	17	69.57	27.18	1.03	7.1
5	事故傷害	27	53.67	36.40	1.22	5.1	5	腦血管疾病	19	73.45	39.37	1.06	6.6	5	腦血管疾病	16	65.47	13.43	1.08	6.7
6	糖尿病	23	45.72	19.27	0.83	4.3	6	慢性下呼吸道疾病	14	54.12	22.02	0.85	4.8	6	敗血症	9	36.83	7.26	1.97	3.8
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	17	33.79	14.51	1.09	3.2	7	慢性肝病及肝硬化	11	42.52	24.66	1.42	3.8	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	32.74	8.74	0.99	3.3
8	慢性下呼吸道疾病	17	33.79	10.44*-	0.69	3.2	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	34.79	19.42	1.20	3.1	8	高血壓性疾病	6	24.55	6.93	0.57	2.5
9	慢性肝病及肝硬化	15	29.82	15.33	1.41	2.8	9	蓄意自我傷害(自殺)	7	27.06	19.24	1.20	2.4	9	事故傷害	4	16.37	6.08*-	0.63	1.7
10	敗血症	15	29.82	7.82	1.68	2.8	10	糖尿病	6	23.19	11.20*-	0.53	2.1	10	慢性肝病及肝硬化	4	16.37	5.96	1.30	1.7
	其他非十大死因	108	214.69	97.65	0.85	20.4		其他非十大死因	49	189.42	95.20	0.81	16.9		其他非十大死因	55	225.07	85.63	0.88	22.9
11	高血壓性疾病	11	21.87	8.41	0.64	2.1	11	敗血症	6	23.19	8.74	1.38	2.1	11	蓄意自我傷害(自殺)	3	12.28	4.56	1.10	1.3
12	蓄意自我傷害(自殺)	10	19.88	11.93	1.18	1.9	12	高血壓性疾病	5	19.33	9.67	0.74	1.7	12	血管性及未明示之癱瘓症	3	12.28	2.06	0.68	1.3
13	衰老/老邁	6	11.93	3.85	0.95	1.1	13	衰老/老邁	4	15.46	6.75	1.54	1.4	13	慢性下呼吸道疾病	3	12.28	2.06*-	0.40	1.3
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	5	9.94	3.86	1.11	0.9	14	帕金森病	4	15.46	6.56	2.30	1.4	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	8.18	5.14	0.99	0.8
15	帕金森病	5	9.94	3.33	1.38	0.9	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	11.60	4.24	1.21	1.0	15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	8.18	3.10	1.38	0.8

附 註：1. 彰化縣二林鎮年中人口數 計50,305.5人 男性25,868.5人 女性24,437.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計



# 彰化縣線西鄉主要死亡原因

## 民國108年(2019年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	140	833.53	465.00	1.07	100.0		所有死亡原因	87	1,008.81	611.96	1.10	100.0		所有死亡原因	53	648.48	317.78	1.00	100.0
	十大主要死因	110	654.92	357.83	1.16	78.6		十大主要死因	68	788.50	477.61	1.19	78.2		十大主要死因	42	513.89	260.46	1.13	79.2
1	惡性腫瘤	47	279.83	176.94	1.29	33.6	1	惡性腫瘤	30	347.87	228.50	1.26	34.5	1	惡性腫瘤	17	208.00	120.65	1.31	32.1
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	83.35	36.88	1.06	10.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	9	104.36	56.79	1.26	10.3	2	糖尿病	5	61.18	21.78	1.32	9.4
3	糖尿病	10	59.54	28.56	1.44	7.1	3	肺炎	7	81.17	38.98	0.92	8.0	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	5	61.18	16.85	0.82	9.4
4	肺炎	9	53.58	22.59	0.74	6.4	4	糖尿病	5	57.98	33.72	1.60	5.7	4	高血壓性疾病	4	48.94	20.19	1.75	7.5
5	腦血管疾病	7	41.68	19.22	0.85	5.0	5	腦血管疾病	4	46.38	24.24	0.80	4.6	5	腦血管疾病	3	36.71	14.71	0.89	5.7
6	高血壓性疾病	6	35.72	14.97	1.41	4.3	6	事故傷害	3	34.79	29.08	0.64	3.4	6	蓄意自我傷害(自殺)	2	24.47	17.45	2.56	3.8
7	蓄意自我傷害(自殺)	5	29.77	17.63	1.90	3.6	7	蓄意自我傷害(自殺)	3	34.79	19.08	1.61	3.4	7	肺炎	2	24.47	10.10	0.42	3.8
8	事故傷害	4	23.82	17.44	0.64	2.9	8	皮膚及皮下組織疾病	3	34.79	16.17	7.25*	3.4	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	24.47	6.74	1.10	3.8
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	23.82	11.83	1.03	2.9	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	23.19	16.13	0.96	2.3	9	敗血症	1	12.24	22.80	0.97	1.9
10	皮膚及皮下組織疾病	4	23.82	11.77	6.70*	2.9	10	敗血症	2	23.19	14.93	1.66	2.3	10	皮膚及皮下組織疾病	1	12.24	9.18	5.06	1.9
	其他非十大死因	30	178.61	107.17	0.82	21.4		其他非十大死因	19	220.32	134.35	0.85	21.8		其他非十大死因	11	134.59	57.32	0.70	20.8
11	敗血症	3	17.86	19.01	1.35	2.1	11	慢性肝病及肝硬化	2	23.19	12.92	0.83	2.3	11	慢性肝病及肝硬化	1	12.24	7.19	1.30	1.9
12	慢性肝病及肝硬化	3	17.86	9.71	0.95	2.1	12	慢性下呼吸道疾病	2	23.19	10.31*-	0.45	2.3	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	12.24	4.16	2.00	1.9
13	慢性下呼吸道疾病	3	17.86	6.69*-	0.51	2.1	13	高血壓性疾病	2	23.19	9.88	1.03	2.3	13	慢性下呼吸道疾病	1	12.24	4.16	0.62	1.9
14	胃及十二指腸潰瘍	1	5.95	3.48	2.28	0.7	14	胃及十二指腸潰瘍	1	11.60	7.19	4.30	1.1	14	事故傷害	1	12.24	4.16*-	0.61	1.9
15	動脈粥樣硬化	1	5.95	2.34	24.99	0.7	15	動脈粥樣硬化	1	11.60	5.37	71.79	1.1	15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	12.24	3.37	3.15	1.9

附 註：1. 彰化縣線西鄉年中人口數 計16,796.5人 男性8,623.5人 女性8,173.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣伸港鄉主要死亡原因

## 民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	255	683.92	420.90	0.99	100.0		所有死亡原因	151	795.07	557.68	1.00	100.0		所有死亡原因	104	568.52	287.14	0.98	100.0
	十大主要死因	213	571.28	356.36	1.09	83.5		十大主要死因	134	705.56	499.72	1.14	88.7		十大主要死因	81	442.79	224.48	1.06	77.9
1	惡性腫瘤	69	185.06	115.48	0.95	27.1	1	惡性腫瘤	49	258.00	180.68	1.07	32.5	1	惡性腫瘤	20	109.33	55.90*-	0.75	19.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	35	93.87	55.79	1.37	13.7	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	94.78	67.34	1.33	11.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	17	92.93	41.41	1.41	16.3
3	肺炎	25	67.05	34.77	1.09	9.8	3	肺炎	18	94.78	61.64	1.34	11.9	3	糖尿病	13	71.07	36.46	1.72	12.5
4	事故傷害	17	45.59	34.73	1.31	6.7	4	事故傷害	13	68.45	53.50	1.36	8.6	4	肺炎	7	38.27	13.07	0.74	6.7
5	糖尿病	17	45.59	26.66	1.27	6.7	5	慢性肝病及肝硬化	9	47.39	36.14	1.83	6.0	5	腦血管疾病	6	32.80	17.21	0.89	5.8
6	腦血管疾病	15	40.23	24.10	0.94	5.9	6	腦血管疾病	9	47.39	32.59	0.97	6.0	6	蓄意自我傷害(自殺)	5	27.33	21.22	2.98	4.8
7	蓄意自我傷害(自殺)	10	26.82	22.85	1.79	3.9	7	蓄意自我傷害(自殺)	5	26.33	23.63	1.28	3.3	7	高血壓性疾病	5	27.33	11.89	1.11	4.8
8	高血壓性疾病	10	26.82	13.82	1.23	3.9	8	高血壓性疾病	5	26.33	16.05	1.39	3.3	8	事故傷害	4	21.87	15.15	1.17	3.8
9	慢性肝病及肝硬化	9	24.14	18.49	1.39	3.5	9	糖尿病	4	21.06	14.85	0.69	2.6	9	慢性下呼吸道疾病	2	10.93	6.23	0.63	1.9
10	慢性下呼吸道疾病	6	16.09	9.67	0.54	2.4	10	慢性下呼吸道疾病	4	21.06	13.31*-	0.50	2.6	10	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	10.93	5.93	1.99	1.9
	其他非十大死因	42	112.65	64.54*-	0.68*	16.5		其他非十大死因	17	89.51	57.96*-	0.53*	11.3		其他非十大死因	23	125.73	62.66	0.77	22.1
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	8.05	4.09*-	0.40	1.2	11	敗血症	2	10.53	6.53	0.90	1.3	11	貧血	2	10.93	3.49	7.36	1.9
12	敗血症	3	8.05	3.87	0.70	1.2	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	10.53	6.53	0.53	1.3	12	帕金森病	2	10.93	3.49	2.41	1.9
13	帕金森病	3	8.05	3.27	1.79	1.2	13	血管性及未明示之癱瘓症	2	10.53	5.80	1.77	1.3	13	源於周產期的特定病況	1	5.47	9.47	14.09	1.0
14	流行性感冒	2	5.36	4.87	3.20	0.8	14	流行性感冒	1	5.27	5.00	2.88	0.7	14	流行性感冒	1	5.47	5.04	3.62	1.0
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	5.36	3.16	0.87	0.8	15	主動脈瘤及剝離	1	5.27	3.11	0.91	0.7	15	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	5.47	2.17*-	0.28	1.0

附 註：1.彰化縣伸港鄉年中人口數 計37,285.0人 男性18,992.0人 女性18,293.0人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣福興鄉主要死亡原因

## 民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	346	737.68	369.34*-	0.90*	100.0		所有死亡原因	206	843.02	499.19	0.92	100.0		所有死亡原因	140	623.11	240.12*-	0.85	100.0
	十大主要死因	274	584.17	290.13	0.98	79.2		十大主要死因	163	667.05	398.79	0.99	79.1		十大主要死因	117	520.74	193.68	1.00	83.6
1	惡性腫瘤	86	183.35	101.19*-	0.82	24.9	1	惡性腫瘤	57	233.26	143.60	0.85	27.7	1	惡性腫瘤	29	129.07	62.06	0.75	20.7
2	衰老/老邁	33	70.36	23.48*+	7.26*	9.5	2	衰老/老邁	20	81.85	37.44*+	10.03*	9.7	2	肺炎	16	71.21	21.61	1.03	11.4
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	29	61.83	30.16	0.74	8.4	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	73.66	43.03	0.89	8.7	3	糖尿病	13	57.86	17.14	1.10	9.3
4	肺炎	28	59.70	22.93	0.76	8.1	4	事故傷害	17	69.57	51.47	1.27	8.3	4	衰老/老邁	13	57.86	14.27*+	5.09*	9.3
5	事故傷害	26	55.43	36.31	1.44	7.5	5	腦血管疾病	14	57.29	32.56	0.99	6.8	5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	11	48.96	17.06*-	0.57	7.9
6	腦血管疾病	24	51.17	26.09	0.98	6.9	6	肺炎	12	49.11	24.14*-	0.56*	5.8	6	腦血管疾病	10	44.51	20.01	0.94	7.1
7	糖尿病	24	51.17	22.92	1.17	6.9	7	糖尿病	11	45.02	26.31	1.25	5.3	7	事故傷害	9	40.06	18.83	1.86	6.4
8	高血壓性疾病	11	23.45	11.87	0.86	3.2	8	蓄意自我傷害(自殺)	5	20.46	15.66	0.94	2.4	8	高血壓性疾病	6	26.70	8.52	0.82	4.3
9	敗血症	7	14.92	7.44	1.05	2.0	9	高血壓性疾病	5	20.46	13.77	0.91	2.4	9	血管性及未明示之癱呆症	6	26.70	8.20	1.95	4.3
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	12.79	7.74	0.52	1.7	10	慢性肝病及肝硬化	4	16.37	10.82	0.59	1.9	10	敗血症	4	17.80	5.97	1.22	2.9
	其他非十大死因	72	153.51	79.20*-	0.68*	20.8		其他非十大死因	43	175.97	100.39*-	0.72*	20.9		其他非十大死因	23	102.37	46.44*-	0.49*	16.4
11	血管性及未明示之癱呆症	6	12.79	4.64	1.22	1.7	11	敗血症	3	12.28	8.06	0.88	1.5	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	13.35	8.74	0.52	2.1
12	蓄意自我傷害(自殺)	5	10.66	8.33	0.67	1.4	12	慢性下呼吸道疾病	3	12.28	7.74*-	0.24*	1.5	12	帕金森病	2	8.90	4.18	1.53	1.4
13	慢性肝病及肝硬化	4	8.53	5.62*-	0.45	1.2	13	主動脈瘤及剝離	3	12.28	7.31	1.85	1.5	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	4.45	2.78	0.66	0.7
14	主動脈瘤及剝離	4	8.53	4.84	1.80	1.2	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	12.28	7.17	1.55	1.5	14	主動脈瘤及剝離	1	4.45	2.08	1.57	0.7
15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	8.53	4.66	1.16	1.2	15	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	12.28	7.09	0.51	1.5	15	慢性下呼吸道疾病	1	4.45	0.99*-	0.19	0.7

附 註：1. 彰化縣福興鄉年中人口數 計46,903.5人 男性24,436.0人 女性22,467.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣秀水鄉主要死亡原因

## 民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	283	722.31	394.50	0.99	100.0		所有死亡原因	153	757.09	499.08	0.91	100.0		所有死亡原因	130	685.29	292.77	1.09	100.0
	十大主要死因	210	535.99	290.37	0.97	74.2		十大主要死因	113	559.16	370.00	0.87	73.9		十大主要死因	101	532.42	222.97	1.16	77.7
1	惡性腫瘤	71	181.21	107.53	0.88	25.1	1	惡性腫瘤	46	227.62	154.55	0.89	30.1	1	惡性腫瘤	25	131.79	64.00	0.85	19.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	25	63.81	31.30	0.88	8.8	2	肺炎	14	69.28	44.04	0.93	9.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	84.34	29.62	1.17	12.3
3	肺炎	25	63.81	30.84	0.96	8.8	3	事故傷害	9	44.53	31.68	0.86	5.9	3	腦血管疾病	11	57.99	23.97	1.45	8.5
4	腦血管疾病	19	48.49	24.42	1.06	6.7	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	9	44.53	29.80	0.60	5.9	4	肺炎	11	57.99	20.21	1.02	8.5
5	事故傷害	15	38.28	25.55	1.06	5.3	5	慢性下呼吸道疾病	9	44.53	27.11	1.00	5.9	5	糖尿病	9	47.44	21.42	1.06	6.9
6	高血壓性疾病	13	33.18	16.71	1.43	4.6	6	腦血管疾病	8	39.59	24.55	0.77	5.2	6	高血壓性疾病	8	42.17	15.92	1.56	6.2
7	糖尿病	12	30.63	16.83	0.80	4.2	7	慢性肝病及肝硬化	5	24.74	17.40	0.93	3.3	7	事故傷害	6	31.63	21.11	1.61	4.6
8	慢性下呼吸道疾病	11	28.08	14.98	0.87	3.9	8	高血壓性疾病	5	24.74	15.83	1.25	3.3	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	31.63	12.50	1.47	4.6
9	敗血症	10	25.52	11.52	2.09*	3.5	9	敗血症	5	24.74	15.31	2.01	3.3	9	敗血症	5	26.36	7.86	2.16	3.8
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	22.97	10.69	1.08	3.2	10	糖尿病	3	14.84	9.74*-	0.45	2.0	10	血管性及未明示之癱瘓症	4	21.09	6.37	1.91	3.1
	其他非十大死因	73	186.32	104.13	1.06	25.8		其他非十大死因	40	197.93	129.08	1.07	26.1		其他非十大死因	29	152.87	69.80	0.91	22.3
11	慢性肝病及肝硬化	6	15.31	11.34	0.85	2.1	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	14.84	8.72	0.70	2.0	11	蓄意自我傷害(自殺)	2	10.54	10.57	1.12	1.5
12	結核病	4	10.21	4.00	3.10	1.4	12	皮膚及皮下組織疾病	3	14.84	8.45	3.65	2.0	12	慢性下呼吸道疾病	2	10.54	3.85	0.55	1.5
13	血管性及未明示之癱瘓症	4	10.21	4.00	1.20	1.4	13	結核病	3	14.84	8.12	3.17	2.0	13	慢性肝病及肝硬化	1	5.27	4.56	0.58	0.8
14	蓄意自我傷害(自殺)	3	7.66	7.06	0.50	1.1	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病 肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	9.90	6.66	1.71	1.3	14	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	5.27	3.27	6.84	0.8
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	7.66	4.15	1.45	1.1	15	結核病	1	4.95	4.65	1.34	0.7	15	結核病	1	5.27	1.48	2.93	0.8

附 註：1.彰化縣秀水鄉年中人口數 計39,179.5人 男性20,209.0人 女性18,970.5人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣花壇鄉主要死亡原因

## 民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	352	770.07	446.46	1.05	100.0		所有死亡原因	210	895.45	593.61	1.05	100.0		所有死亡原因	142	638.00	308.86	1.04	100.0
	十大主要死因	271	592.87	339.61	1.05	77.0		十大主要死因	168	716.36	464.70	1.07	80.0		十大主要死因	106	476.25	227.92	1.05	74.6
1	惡性腫瘤	103	225.33	132.94	1.07	29.3	1	惡性腫瘤	66	281.43	178.73	1.07	31.4	1	惡性腫瘤	37	166.24	91.35	1.06	26.1
2	肺炎	36	78.76	38.37	1.21	10.2	2	肺炎	20	85.28	50.60	1.11	9.5	2	肺炎	16	71.89	28.03	1.33	11.3
3	事故傷害	24	52.50	39.97	1.43	6.8	3	事故傷害	16	68.22	56.16	1.29	7.6	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	53.92	21.89	0.78	8.5
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	45.94	22.57*-	0.63*	6.0	4	腦血管疾病	13	55.43	35.54	1.04	6.2	4	事故傷害	8	35.94	23.04	1.82	5.6
5	糖尿病	20	43.75	24.22	1.14	5.7	5	糖尿病	13	55.43	35.39	1.66	6.2	5	高血壓性疾病	8	35.94	13.05	1.39	5.6
6	腦血管疾病	19	41.57	23.76	0.91	5.4	6	慢性下呼吸道疾病	10	42.64	28.16	0.93	4.8	6	糖尿病	7	31.45	14.79	0.73	4.9
7	高血壓性疾病	15	32.82	15.91	1.42	4.3	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	38.38	24.19	1.77	4.3	7	腦血管疾病	6	26.96	14.67	0.70	4.2
8	慢性下呼吸道疾病	14	30.63	16.66	0.96	4.0	8	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	9	38.38	23.00*-	0.50*	4.3	8	衰老/老邁	5	22.46	7.30	2.65	3.5
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	26.25	15.28	1.24	3.4	9	高血壓性疾病	7	29.85	18.47	1.46	3.3	9	慢性下呼吸道疾病	4	17.97	6.44	0.99	2.8
10	慢性肝病及肝硬化	7	15.31	9.94	0.82	2.0	10	慢性肝病及肝硬化	5	21.32	14.46	0.77	2.4	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	13.48	7.34	0.65	2.1
	其他非十大死因	81	177.20	106.85	1.04	23.0		其他非十大死因	42	179.09	128.91	0.98	20.0		其他非十大死因	36	161.75	80.94	1.02	25.4
11	衰老/老邁	7	15.31	6.56	1.99	2.0	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	17.06	10.75	2.88	1.9	11	敗血症	3	13.48	5.08	1.15	2.1
12	蓄意自我傷害(自殺)	5	10.94	9.69	0.70	1.4	12	蓄意自我傷害(自殺)	3	12.79	10.02	0.60	1.4	12	帕金森病	3	13.48	4.08	2.84	2.1
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	10.94	6.84	2.05	1.4	13	先天性畸形變形及染色體異常	2	8.53	16.98	5.03	1.0	13	血管性及未明示之癱瘓症	3	13.48	4.08	1.30	2.1
14	帕金森病	5	10.94	4.41	2.29	1.4	14	胃及十二指腸潰瘍	2	8.53	6.03	3.40	1.0	14	蓄意自我傷害(自殺)	2	8.99	9.50	0.94	1.4
15	血管性及未明示之癱瘓症	4	8.75	3.81	1.04	1.1	15	衰老/老邁	2	8.53	4.88	1.22	1.0	15	慢性肝病及肝硬化	2	8.99	5.06	0.98	1.4

附 註：1. 彰化縣花壇鄉年中人口數 計45,709.5人 男性23,452.5人 女性22,257.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣芬園鄉主要死亡原因

## 民國108年(2019年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	255	1,085.89	442.54	1.08	100.0		所有死亡原因	151	1,222.67	601.10	1.09	100.0		所有死亡原因	104	934.16	277.33	1.02	100.0
	十大主要死因	206	877.23	348.15	1.17*	80.8		十大主要死因	123	995.95	479.52	1.22*	81.5		十大主要死因	86	772.48	227.77	1.16	82.7
1	惡性腫瘤	68	289.57	135.97	1.09	26.7	1	惡性腫瘤	50	404.86	210.93	1.23	33.1	1	惡性腫瘤	18	161.68	53.76*-	0.80	17.3
2	肺炎	27	114.98	34.32	1.13	10.6	2	腦血管疾病	15	121.46	55.69	1.69	9.9	2	肺炎	16	143.72	34.15	1.58	15.4
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	25	106.46	46.98	1.02	9.8	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	105.26	46.21	1.05	8.6	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	107.79	50.56	0.97	11.5
4	腦血管疾病	24	102.20	35.61	1.57*	9.4	4	肺炎	11	89.07	34.48	0.79	7.3	4	糖尿病	10	89.82	24.04	1.37	9.6
5	糖尿病	17	72.39	27.22	1.33	6.7	5	慢性下呼吸道疾病	8	64.78	24.08	0.96	5.3	5	腦血管疾病	9	80.84	15.27	1.36	8.7
6	高血壓性疾病	13	55.36	18.27	1.60	5.1	6	慢性肝病及肝硬化	7	56.68	34.79	1.83	4.6	6	高血壓性疾病	7	62.88	15.62	1.49	6.7
7	慢性下呼吸道疾病	13	55.36	15.71	1.13	5.1	7	糖尿病	7	56.68	28.99	1.27	4.6	7	慢性下呼吸道疾病	5	44.91	8.36	1.49	4.8
8	慢性肝病及肝硬化	8	34.07	20.62	1.59	3.1	8	高血壓性疾病	6	48.58	20.34	1.74	4.0	8	敗血症	3	26.95	11.97	1.44	2.9
9	血管性及未明示之癱瘓症	6	25.55	6.67	1.83	2.4	9	蓄意自我傷害(自殺)	3	24.29	15.04	1.05	2.0	9	事故傷害	3	26.95	9.71	1.08	2.9
10	事故傷害	5	21.29	6.78*-	0.49	2.0	10	血管性及未明示之癱瘓症	3	24.29	8.97	2.41	2.0	10	血管性及未明示之癱瘓症	3	26.95	4.32	1.46	2.9
	其他非十大死因	49	208.66	94.39	0.82	19.2		其他非十大死因	28	226.72	121.58	0.76	18.5		其他非十大死因	18	161.68	49.57*-	0.65	17.3
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	21.29	5.49*-	0.69	2.0	11	源於周產期的特定病況	2	16.19	31.30	24.81*	1.3	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	26.95	4.32	0.83	2.9
12	蓄意自我傷害(自殺)	4	17.03	10.19	1.00	1.6	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	16.19	7.16	2.17	1.3	12	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	8.98	4.86	11.05	1.0
13	敗血症	4	17.03	7.66	0.95	1.6	13	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	16.19	6.32	0.53	1.3	13	蓄意自我傷害(自殺)	1	8.98	4.86	0.81	1.0
14	源於周產期的特定病況	2	8.52	16.04	16.46*	0.8	14	衰老/老邁	2	16.19	4.93	1.47	1.3	14	慢性肝病及肝硬化	1	8.98	2.60	0.73	1.0
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	8.52	3.55	1.22	0.8	15	事故傷害	2	16.19	4.93*-	0.26*	1.3	15	流行性感胃	1	8.98	1.44	4.13	1.0

附 註：1.彰化縣芬園鄉年中人口數 計23,483.0人 男性12,350.0人 女性11,133.0人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣大村鄉主要死亡原因

## 民國108年(2019年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	297	801.71	449.77	1.04	100.0		所有死亡原因	170	889.87	591.64	1.04	100.0		所有死亡原因	127	707.84	319.90	1.05	100.0
	十大主要死因	215	580.36	332.27	1.05	72.4		十大主要死因	137	717.13	472.76	1.10	80.6		十大主要死因	81	451.45	215.44	1.01	63.8
1	惡性腫瘤	93	251.04	146.89	1.17	31.3	1	惡性腫瘤	59	308.84	199.74	1.18	34.7	1	惡性腫瘤	34	189.50	100.30	1.16	26.8
2	肺炎	28	75.58	33.13	1.07	9.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	104.69	69.38	1.37	11.8	2	肺炎	13	72.46	25.56	1.16	10.2
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	24	64.78	37.99	0.84	8.1	3	肺炎	15	78.52	45.06	1.03	8.8	3	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	44.59	18.01	1.92	6.3
4	事故傷害	17	45.89	30.17	1.24	5.7	4	事故傷害	11	57.58	41.91	1.09	6.5	4	事故傷害	6	33.44	18.60	1.64	4.7
5	腦血管疾病	17	45.89	23.81	0.95	5.7	5	腦血管疾病	11	57.58	36.70	1.09	6.5	5	腦血管疾病	6	33.44	13.13	0.78	4.7
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	26.99	12.41	1.20	3.4	6	蓄意自我傷害(自殺)	7	36.64	31.17	1.71	4.1	6	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	4	22.29	10.19*-	0.28*	3.1
7	蓄意自我傷害(自殺)	9	24.29	20.59	1.54	3.0	7	慢性下呼吸道疾病	7	36.64	25.39	0.81	4.1	7	敗血症	3	16.72	10.27	1.25	2.4
8	慢性下呼吸道疾病	8	21.59	12.02	0.63	2.7	8	慢性肝病及肝硬化	3	15.70	11.19	0.57	1.8	8	高血壓性疾病	3	16.72	4.19*-	0.57	2.4
9	慢性肝病及肝硬化	5	13.50	9.15	0.71	1.7	9	糖尿病	2	10.47	6.14*-	0.31	1.2	9	蓄意自我傷害(自殺)	2	11.15	8.94	1.13	1.6
10	敗血症	4	10.80	6.09	0.84	1.3	10	結核病	2	10.47	6.07	2.20	1.2	10	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	11.15	6.25	2.73	1.6
	其他非十大死因	82	221.35	117.50	1.03	27.6		其他非十大死因	33	172.74	118.88	0.87	19.4		其他非十大死因	46	256.38	104.47	1.13	36.2
11	糖尿病	4	10.80	4.94*-	0.27*	1.3	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	10.47	6.07	1.42	1.2	11	慢性肝病及肝硬化	2	11.15	6.25	1.15	1.6
12	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	3	8.10	4.31	2.06	1.0	12	主動脈瘤及剝離	2	10.47	6.06	1.66	1.2	12	糖尿病	2	11.15	4.51*-	0.23*	1.6
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	8.10	3.46	1.18	1.0	13	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	10.47	5.75	0.48	1.2	13	胃及十二指腸潰瘍	1	5.57	3.27	2.14	0.8
14	高血壓性疾病	3	8.10	2.75*-	0.33*	1.0	14	源於周產期的特定病況	1	5.23	8.67	6.86	0.6	14	病毒性肝炎	1	5.57	1.40	3.35	0.8
15	主動脈瘤及剝離	2	5.40	3.08	1.20	0.7	15	先天性畸形變形及染色體異常	1	5.23	8.67	2.77	0.6	15	流行性感冒	1	5.57	1.40	3.32	0.8

附 註：1. 彰化縣大村鄉年中人口數 計37,046.0人 男性19,103.5人 女性17,942.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣埔鹽鄉主要死亡原因

## 民國108年(2019年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	287	887.94	389.82	0.90	100.0		所有死亡原因	161	947.73	484.41	0.88	100.0		所有死亡原因	126	821.76	294.94	0.90	100.0
	十大主要死因	226	699.21	308.48	0.93	78.7		十大主要死因	126	741.70	377.62	0.91	78.3		十大主要死因	104	678.28	254.85	1.00	82.5
1	惡性腫瘤	80	247.51	125.63	0.96	27.9	1	惡性腫瘤	52	306.10	160.55	0.96	32.3	1	惡性腫瘤	28	182.61	92.26	0.91	22.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	31	95.91	33.58	0.94	10.8	2	肺炎	13	76.52	32.06	0.71	8.1	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	123.92	33.31	1.11	15.1
3	腦血管疾病	22	68.07	27.36	1.06	7.7	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	70.64	32.55	0.73	7.5	3	糖尿病	15	97.83	28.21	1.49	11.9
4	糖尿病	21	64.97	23.02	1.21	7.3	4	腦血管疾病	11	64.75	33.39	0.94	6.8	4	腦血管疾病	11	71.74	19.99	1.20	8.7
5	肺炎	20	61.88	19.12*-	0.62*	7.0	5	事故傷害	9	52.98	38.58	0.87	5.6	5	高血壓性疾病	8	52.18	17.75	1.23	6.3
6	事故傷害	16	49.50	33.21	1.15	5.6	6	慢性下呼吸道疾病	9	52.98	20.38	0.82	5.6	6	事故傷害	7	45.65	28.16	1.83	5.6
7	慢性下呼吸道疾病	11	34.03	12.50	0.71	3.8	7	糖尿病	6	35.32	16.39	0.81	3.7	7	肺炎	7	45.65	7.39*-	0.50	5.6
8	高血壓性疾病	10	30.94	13.67	0.92	3.5	8	慢性肝病及肝硬化	5	29.43	18.28	0.98	3.1	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	32.61	12.99	1.01	4.0
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	24.75	10.65	0.81	2.8	9	敗血症	5	29.43	14.11	1.73	3.1	9	慢性下呼吸道疾病	2	13.04	9.82	0.43	1.6
10	敗血症	7	21.66	9.75	1.23	2.4	10	帕金森病	4	23.55	11.33	3.46	2.5	10	敗血症	2	13.04	4.97	0.70	1.6
	其他非十大死因	61	188.73	81.34	0.80	21.3		其他非十大死因	35	206.03	106.79	0.78	21.7		其他非十大死因	22	143.48	40.09*-	0.61*	17.5
11	慢性肝病及肝硬化	5	15.47	9.68	0.74	1.7	11	蓄意自我傷害(自殺)	3	17.66	11.30	0.77	1.9	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	13.04	4.80	1.60	1.6
12	帕金森病	5	15.47	6.14	2.19	1.7	12	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	17.66	8.72	0.60	1.9	12	膽結石及其他膽囊疾患	2	13.04	3.58	3.07	1.6
13	蓄意自我傷害(自殺)	4	12.38	7.22	0.73	1.4	13	血管性及未明示之癱瘓症	3	17.66	6.21	1.87	1.9	13	衰老/老邁	2	13.04	2.11	0.86	1.6
14	血管性及未明示之癱瘓症	4	12.38	3.32	0.91	1.4	14	高血壓性疾病	2	11.77	7.29	0.44	1.2	14	蓄意自我傷害(自殺)	1	6.52	1.79*-	0.59	0.8
15	結核病	3	9.28	2.95	1.94	1.0	15	結核病	2	11.77	4.80	1.76	1.2	15	貧血	1	6.52	1.06	2.37	0.8

附 註：1. 彰化縣埔鹽鄉年中人口數 計32,321.5人 男性16,988.5人 女性15,333.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計



# 彰化縣埔心鄉主要死亡原因

## 民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	297	854.92	448.95	1.09	100.0		所有死亡原因	182	1,018.92	621.05	1.14	100.0		所有死亡原因	115	681.36	282.73	1.01	100.0
	十大主要死因	235	676.45	358.28	1.13	79.1		十大主要死因	151	845.37	513.89	1.20*	83.0		十大主要死因	90	533.24	224.83	1.06	78.3
1	惡性腫瘤	98	282.10	161.14*+	1.28*	33.0	1	惡性腫瘤	69	386.29	233.41*+	1.41*	37.9	1	惡性腫瘤	29	171.82	92.83	1.04	25.2
2	肺炎	28	80.60	34.47	1.11	9.4	2	肺炎	17	95.17	51.60	1.17	9.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	11	65.17	24.38	0.83	9.6
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	27	77.72	42.47	0.98	9.1	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	89.58	59.55	1.12	8.8	3	肺炎	11	65.17	19.63	1.04	9.6
4	腦血管疾病	20	57.57	27.39	1.16	6.7	4	腦血管疾病	11	61.58	35.80	1.10	6.0	4	腦血管疾病	9	53.32	19.31	1.24	7.8
5	糖尿病	15	43.18	22.19	1.05	5.1	5	蓄意自我傷害(自殺)	9	50.39	34.62	2.32*	4.9	5	糖尿病	8	47.40	21.48	0.99	7.0
6	慢性下呼吸道疾病	12	34.54	16.10	0.98	4.0	6	慢性下呼吸道疾病	8	44.79	24.34	0.92	4.4	6	高血壓性疾病	6	35.55	11.38	1.20	5.2
7	蓄意自我傷害(自殺)	9	25.91	17.89	1.63	3.0	7	糖尿病	7	39.19	23.44	1.11	3.8	7	事故傷害	5	29.62	9.89	1.43	4.3
8	事故傷害	9	25.91	15.35	0.68	3.0	8	慢性肝病及肝硬化	6	33.59	21.98	1.19	3.3	8	慢性下呼吸道疾病	4	23.70	10.44	1.13	3.5
9	高血壓性疾病	9	25.91	13.01	1.02	3.0	9	事故傷害	4	22.39	18.34*-	0.41	2.2	9	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	23.70	7.50	1.01	3.5
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	23.03	8.27	1.00	2.7	10	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	22.39	10.81	0.98	2.2	10	敗血症	3	17.77	7.98	1.33	2.6
	其他非十大死因	62	178.47	90.67	0.96	20.9		其他非十大死因	31	173.55	107.16	0.91	17.0		其他非十大死因	25	148.12	57.90	0.86	21.7
11	慢性肝病及肝硬化	6	17.27	11.29	0.90	2.0	11	高血壓性疾病	3	16.80	12.32	0.78	1.6	11	皮膚及皮下組織疾病	3	17.77	5.21	6.76*	2.6
12	敗血症	5	14.39	6.82	1.08	1.7	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	16.80	9.29	2.72	1.6	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	11.85	3.75	2.30	1.7
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	14.39	6.76	2.54	1.7	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	11.20	6.28	1.43	1.1	13	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	11.85	2.91	2.89	1.7
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	8.64	4.50	1.23	1.0	14	敗血症	2	11.20	5.99	0.84	1.1	14	血管性及未明示之癱瘓症	2	11.85	2.91	0.96	1.7
15	皮膚及皮下組織疾病	3	8.64	3.19	2.42	1.0	15	先天性畸形變形及染色體異常	1	5.60	12.77	3.53	0.5	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	5.92	3.34	0.94	0.9

附 註：1. 彰化縣埔心鄉年中人口數 計34,739.5人 男性17,861.5人 女性16,878.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣永靖鄉主要死亡原因

## 民國108年(2019年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	343	931.91	468.85	1.13*	100.0		所有死亡原因	186	976.84	573.01	1.05	100.0		所有死亡原因	157	883.71	362.33*+	1.24*	100.0
	十大主要死因	259	703.69	345.44	1.11	75.5		十大主要死因	148	777.27	454.36	1.06	79.6		十大主要死因	112	630.42	254.17	1.25*	71.3
1	惡性腫瘤	95	258.11	141.70	1.12	27.7	1	惡性腫瘤	65	341.37	201.50	1.21	34.9	1	惡性腫瘤	30	168.86	83.87	0.97	19.1
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	34	92.38	39.66	1.12	9.9	2	事故傷害	14	73.53	49.50	1.32	7.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	112.57	37.06	1.37	12.7
3	肺炎	27	73.36	28.34	0.96	7.9	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	73.53	39.99	0.88	7.5	3	糖尿病	16	90.06	31.59	1.75*	10.2
4	糖尿病	23	62.49	28.58	1.42	6.7	4	肺炎	14	73.53	36.82	0.84	7.5	4	肺炎	13	73.17	22.17	1.12	8.3
5	事故傷害	20	54.34	37.14	1.39	5.8	5	慢性下呼吸道疾病	10	52.52	24.48	1.01	5.4	5	慢性肝病及肝硬化	8	45.03	17.30	4.33*	5.1
6	慢性下呼吸道疾病	15	40.75	14.36	1.09	4.4	6	腦血管疾病	8	42.01	23.59	0.72	4.3	6	事故傷害	6	33.77	23.37	1.55	3.8
7	慢性肝病及肝硬化	13	35.32	17.14	1.81	3.8	7	糖尿病	7	36.76	22.17	0.99	3.8	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	33.77	13.79	1.36	3.8
8	腦血管疾病	12	32.60	15.85	0.62	3.5	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	31.51	16.02	1.30	3.2	8	慢性下呼吸道疾病	5	28.14	7.81	1.28	3.2
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	32.60	14.33	1.33	3.5	9	蓄意自我傷害(自殺)	5	26.26	24.62	1.21	2.7	9	腦血管疾病	4	22.51	9.19	0.49	2.5
10	高血壓性疾病	8	21.74	8.34	0.82	2.3	10	慢性肝病及肝硬化	5	26.26	15.67	0.92	2.7	10	帕金森病	4	22.51	8.02	3.98*	2.5
	其他非十大死因	84	228.22	123.41	1.20	24.5		其他非十大死因	38	199.57	118.65	1.00	20.4		其他非十大死因	45	253.29	108.16	1.21	28.7
11	蓄意自我傷害(自殺)	6	16.30	15.43	1.02	1.7	11	高血壓性疾病	4	21.01	10.25	0.94	2.2	11	高血壓性疾病	4	22.51	6.80	0.72	2.5
12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	6	16.30	6.54	2.20	1.7	12	敗血症	3	15.76	8.45	1.12	1.6	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	22.51	6.00	3.39	2.5
13	敗血症	5	13.58	6.13	0.97	1.5	13	皮膚及皮下組織疾病	2	10.50	7.62	2.23	1.1	13	敗血症	2	11.26	4.39	0.81	1.3
14	帕金森病	4	10.87	4.49	1.95	1.2	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	10.50	5.87	1.29	1.1	14	膽結石及其他膽囊疾患	2	11.26	3.63	3.45	1.3
15	血管性及未明示之癱瘓症	3	8.15	2.97	0.82	0.9	15	結核病	2	10.50	5.52	1.95	1.1	15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	11.26	3.21	2.60	1.3

附 註：1. 彰化縣永靖鄉年中人口數 計36,806.5人 男性19,041.0人 女性17,765.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣社頭鄉主要死亡原因

## 民國108年(2019年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	351	821.48	394.85	0.99	100.0		所有死亡原因	187	851.78	476.46*-	0.90	100.0		所有死亡原因	164	789.45	311.99	1.11	100.0
	十大主要死因	269	629.56	302.59	1.00	76.6		十大主要死因	152	692.36	390.88	0.95	81.3		十大主要死因	119	572.83	233.18	1.09	72.6
1	惡性腫瘤	85	198.93	107.04	0.86	24.2	1	惡性腫瘤	51	232.30	131.95	0.81	27.3	1	惡性腫瘤	34	163.67	82.46	0.95	20.7
2	肺炎	45	105.32	46.00*+	1.36	12.8	2	肺炎	20	91.10	51.99	1.01	10.7	2	肺炎	25	120.34	38.39*+	1.84*	15.2
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	38	88.93	38.95	1.06	10.8	3	慢性下呼吸道疾病	17	77.43	39.22	1.45	9.1	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	22	105.90	35.66	1.29	13.4
4	慢性下呼吸道疾病	22	51.49	21.98	1.36	6.3	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	72.88	39.59	0.85	8.6	4	糖尿病	8	38.51	11.96	0.76	4.9
5	腦血管疾病	21	49.15	25.98	0.93	6.0	5	腦血管疾病	14	63.77	38.81	1.06	7.5	5	腦血管疾病	7	33.70	13.96	0.74	4.3
6	事故傷害	17	39.79	24.12	1.02	4.8	6	事故傷害	14	63.77	37.98	1.14	7.5	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	28.88	10.32	1.18	3.7
7	糖尿病	14	32.77	13.40	0.74	4.0	7	糖尿病	6	27.33	14.36	0.72	3.2	7	高血壓性疾病	6	28.88	9.81	0.93	3.7
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	11	25.74	11.53	1.04	3.1	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	22.77	12.63	0.91	2.7	8	慢性下呼吸道疾病	5	24.07	8.03	1.10	3.0
9	高血壓性疾病	9	21.06	7.64	0.78	2.6	9	血管性及未明示之癱瘓症	5	22.77	10.57	2.97	2.7	9	蓄意自我傷害(自殺)	3	14.44	12.16	1.44	1.8
10	血管性及未明示之癱瘓症	7	16.38	5.95	1.62	2.0	10	慢性肝病及肝硬化	4	18.22	13.77	0.64	2.1	10	事故傷害	3	14.44	10.43	0.67	1.8
	其他非十大死因	82	191.91	92.26	0.95	23.4		其他非十大死因	35	159.42	85.58*-	0.73	18.7		其他非十大死因	45	216.62	78.82	1.18	27.4
11	慢性肝病及肝硬化	6	14.04	9.03	0.72	1.7	11	蓄意自我傷害(自殺)	3	13.66	6.57*-	0.63	1.6	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	9.63	6.27	1.46	1.2
12	蓄意自我傷害(自殺)	6	14.04	8.76	0.88	1.7	12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	13.66	6.39	2.10	1.6	12	慢性肝病及肝硬化	2	9.63	3.72	0.94	1.2
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	7.02	4.37	0.94	0.9	13	高血壓性疾病	3	13.66	5.91	0.59	1.6	13	敗血症	2	9.63	3.72	0.69	1.2
14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	7.02	2.75	1.18	0.9	14	主動脈瘤及剝離	2	9.11	4.58	1.31	1.1	14	血管性及未明示之癱瘓症	2	9.63	2.78	0.76	1.2
15	主動脈瘤及剝離	2	4.68	2.25	0.96	0.6	15	病毒性肝炎	1	4.55	3.32	4.14	0.5	15	阿茲海默病	1	4.81	3.30	3.77	0.6

附 註：1. 彰化縣社頭鄉年中人口數 計42,727.5人 男性21,953.5人 女性20,774.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣二水鄉主要死亡原因

## 民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	185	1,233.5 0	425.82	1.01	00.0		所有死亡原因	110	1,394.7 0	522.90	1.04	00.0		所有死亡原因	75	1,054.70	338.29	0.95	00.0
	十大主要死因	142	946.79	327.38	1.04	76.8		十大主要死因	86	1,090.4 0	424.21	1.09	78.2		十大主要死因	56	787.51	268.56	0.99	74.7
1	惡性腫瘤	39	260.03	109.88	0.82	21.1	1	惡性腫瘤	28	355.01	155.99	0.91	25.5	1	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	17	239.07	67.31	1.77*	22.7
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	31	206.69	69.69*+	1.63*	16.8	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	14	177.51	71.35	1.47	12.7	2	惡性腫瘤	11	154.69	63.23	0.63	14.7
3	肺炎	18	120.02	31.47	0.96	9.7	3	肺炎	13	164.83	53.76	1.16	11.8	3	高血壓性疾病	5	70.31	23.57	1.35	6.7
4	慢性下呼吸道疾病	14	93.35	21.26	1.52	7.6	4	慢性下呼吸道疾病	11	139.47	39.46	1.64	10.0	4	腦血管疾病	5	70.31	12.77	0.95	6.7
5	腦血管疾病	11	73.34	23.29	0.91	5.9	5	腦血管疾病	6	76.07	31.01	0.86	5.5	5	肺炎	5	70.31	11.18	0.64	6.7
6	高血壓性疾病	8	53.34	19.23	1.26	4.3	6	敗血症	4	50.72	15.99	2.33	3.6	6	糖尿病	4	56.25	21.48	0.68	5.3
7	糖尿病	6	40.01	15.18	0.59	3.2	7	慢性肝病及肝硬化	3	38.04	19.40	1.11	2.7	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	42.19	19.50	1.05	4.0
8	敗血症	6	40.01	9.89	1.81	3.2	8	高血壓性疾病	3	38.04	14.62	1.12	2.7	8	慢性下呼吸道疾病	3	42.19	8.17	1.14	4.0
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	33.34	12.55	0.86	2.7	9	血管性及未明示之癱呆症	2	25.36	12.24	1.98	1.8	9	敗血症	2	28.13	4.60	1.25	2.7
10	慢性肝病及肝硬化	4	26.67	14.95	1.10	2.2	10	事故傷害	2	25.36	10.39*-	0.36	1.8	10	先天性畸形變形及染色體異常	1	14.06	36.73	36.43	1.3
	其他非十大死因	43	286.70	98.44	0.91	23.2		其他非十大死因	24	304.30	98.70*-	0.88	21.8		其他非十大死因	19	267.19	69.74	0.86	25.3
11	事故傷害	3	20.00	8.06*-	0.40	1.6	11	糖尿病	2	25.36	9.73	0.46	1.8	11	慢性肝病及肝硬化	1	14.06	10.87	0.93	1.3
12	皮膚及皮下組織疾病	3	20.00	3.62	3.32	1.6	12	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	25.36	9.19	3.80	1.8	12	事故傷害	1	14.06	5.92	0.47	1.3
13	血管性及未明示之癱呆症	2	13.34	6.34	0.78	1.1	13	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	25.36	7.69	0.67	1.8	13	胃及十二指腸潰瘍	1	14.06	4.22	3.08	1.3
14	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	13.34	4.40	1.93	1.1	14	皮膚及皮下組織疾病	2	25.36	6.19	3.34	1.8	14	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	14.06	4.22	1.68	1.3
15	帕金森病	2	13.34	3.74	1.48	1.1	15	結核病	1	12.68	7.81	1.48	0.9	15	帕金森病	1	14.06	2.62	1.54	1.3

附 註：1. 彰化縣二水鄉年中人口數 計14,998.0人 男性7,887.0人 女性7,111.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣田尾鄉主要死亡原因

## 民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	275	1,012.37	453.54	1.10	100.0		所有死亡原因	148	1,057.44	559.83	1.03	100.0		所有死亡原因	127	964.46	351.25	1.17	100.0
	十大主要死因	212	780.44	353.38	1.13	77.1		十大主要死因	118	843.10	449.19	1.06	79.7		十大主要死因	96	729.04	263.16	1.20	75.6
1	惡性腫瘤	80	294.51	163.64*+	1.20	29.1	1	惡性腫瘤	50	357.24	204.61	1.17	33.8	1	惡性腫瘤	30	227.83	123.76	1.22	23.6
2	肺炎	26	95.71	30.12	1.05	9.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	13	92.88	51.75	1.01	8.8	2	肺炎	13	98.72	19.86	1.22	10.2
3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	25	92.03	39.59	0.97	9.1	3	肺炎	13	92.88	40.93	0.93	8.8	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	91.13	26.36	0.91	9.4
4	慢性下呼吸道疾病	22	80.99	27.58	1.85*	8.0	4	慢性下呼吸道疾病	12	85.74	37.94	1.44	8.1	4	慢性下呼吸道疾病	10	75.94	20.24	2.81*	7.9
5	腦血管疾病	15	55.22	19.55	0.93	5.5	5	腦血管疾病	8	57.16	24.32	0.88	5.4	5	腦血管疾病	7	53.16	16.67	0.99	5.5
6	糖尿病	13	47.86	18.54	0.96	4.7	6	糖尿病	6	42.87	21.74	1.05	4.1	6	糖尿病	7	53.16	13.27	0.89	5.5
7	慢性肝病及肝硬化	9	33.13	18.99	1.64	3.3	7	慢性肝病及肝硬化	5	35.72	25.24	1.21	3.4	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	37.97	11.21	1.31	3.9
8	高血壓性疾病	8	29.45	8.91	0.95	2.9	8	敗血症	4	28.58	13.37	1.80	2.7	8	事故傷害	4	30.38	14.77	1.30	3.1
9	事故傷害	7	25.77	16.60	0.63	2.5	9	高血壓性疾病	4	28.58	11.94	1.14	2.7	9	慢性肝病及肝硬化	4	30.38	10.58	2.73	3.1
10	敗血症	7	25.77	9.86	1.59	2.5	10	事故傷害	3	21.43	17.35*-	0.37	2.0	10	高血壓性疾病	4	30.38	6.43	0.80	3.1
	其他非十大死因	63	231.92	100.17	1.01	22.9		其他非十大死因	30	214.35	110.64	0.93	20.3		其他非十大死因	31	235.42	88.09	1.09	24.4
11	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	25.77	8.07	0.91	2.5	11	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	14.29	9.22	2.94	1.4	11	血管性及未明示之癱瘓症	3	22.78	8.79	1.40	2.4
12	蓄意自我傷害(自殺)	4	14.73	6.16	0.89	1.5	12	蓄意自我傷害(自殺)	2	14.29	6.64*-	0.64	1.4	12	敗血症	3	22.78	6.02	1.36	2.4
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	3	11.04	6.76	1.35	1.1	13	胃及十二指腸潰瘍	2	14.29	6.00	4.65	1.4	13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	15.19	8.82	2.03	1.6
14	血管性及未明示之癱瘓症	3	11.04	4.74	0.90	1.1	14	結核病	2	14.29	6.00	2.30	1.4	14	蓄意自我傷害(自殺)	2	15.19	6.20	1.43	1.6
15	胃及十二指腸潰瘍	3	11.04	3.84	3.53	1.1	15	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	14.29	5.30*-	0.52	1.4	15	衰老/老邁	2	15.19	2.80	1.13	1.6

附 註：1. 彰化縣田尾鄉年中人口數 計27,164.5人 男性13,996.0人 女性13,168.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣埤頭鄉主要死亡原因

## 民國108年(2019年)

合 計							男 性						女 性							
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	304	998.33	455.49	1.04	00.0		所有死亡原因	168	1,067.95	602.71	1.02	00.0		所有死亡原因	136	923.91	299.92	1.04	00.0
	十大主要死因	239	784.87	370.62*+	1.14	78.6		十大主要死因	143	909.03	510.94*+	1.17	85.1		十大主要死因	101	686.14	230.98	1.11	74.3
1	惡性腫瘤	84	275.85	138.43	1.08	27.6	1	惡性腫瘤	52	330.56	182.64	1.06	31.0	1	惡性腫瘤	32	217.39	93.41	1.10	23.5
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	31	101.80	43.56	1.02	10.2	2	肺炎	19	120.78	50.96	1.18	11.3	2	糖尿病	19	129.08	39.57*+	2.01*	14.0
3	肺炎	31	101.80	33.52	1.06	10.2	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	15	95.35	50.58	1.02	8.9	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	108.70	36.23	1.01	11.8
4	糖尿病	29	95.23	39.39*+	1.82*	9.5	4	慢性下呼吸道疾病	13	82.64	33.81	1.34	7.7	4	肺炎	12	81.52	21.54	0.93	8.8
5	慢性下呼吸道疾病	16	52.54	16.01	1.13	5.3	5	糖尿病	10	63.57	35.19	1.51	6.0	5	事故傷害	6	40.76	17.28	1.66	4.4
6	事故傷害	15	49.26	41.14	1.17	4.9	6	事故傷害	9	57.21	61.78	0.96	5.4	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	27.17	7.64	0.87	2.9
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	12	39.41	18.35	1.33	3.9	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	50.85	27.38	1.82	4.8	7	血管性及未明示之癱呆症	3	20.38	4.20	1.16	2.2
8	高血壓性疾病	8	26.27	11.04	0.80	2.6	8	慢性肝病及肝硬化	6	38.14	27.67	1.30	3.6	8	高血壓性疾病	3	20.38	4.20*-	0.50	2.2
9	蓄意自我傷害(自殺)	7	22.99	14.39	1.40	2.3	9	蓄意自我傷害(自殺)	6	38.14	24.27	1.73	3.6	9	敗血症	3	20.38	3.45	1.12	2.2
10	慢性肝病及肝硬化	6	19.70	14.81	0.96	2.0	10	高血壓性疾病	5	31.78	16.65	1.25	3.0	10	慢性下呼吸道疾病	3	20.38	3.45	0.70	2.2
	其他非十大死因	65	213.46	84.87*-	0.78*	21.4		其他非十大死因	25	158.92	91.76*-	0.59*	14.9		其他非十大死因	35	237.77	68.94	0.89	25.7
11	腦血管疾病	6	19.70	11.73*-	0.32*	2.0	11	腦血管疾病	4	25.43	19.03	0.38*	2.4	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	13.59	5.98	2.08	1.5
12	敗血症	6	19.70	6.81	1.15	2.0	12	敗血症	3	19.07	9.60	1.17	1.8	12	腦血管疾病	2	13.59	3.82*-	0.24*	1.5
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	9.85	3.86	1.46	1.0	13	先天性畸形變形及染色體異常	1	6.36	8.62	3.61	0.6	13	帕金森病	2	13.59	3.05	1.91	1.5
14	血管性及未明示之癱呆症	3	9.85	2.64	0.75	1.0	14	膽結石及其他膽囊疾患	1	6.36	3.88	2.52	0.6	14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	13.59	3.05	1.70	1.5
15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	2	6.57	3.41	1.24	0.7	15	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	1	6.36	3.88	1.28	0.6	15	蓄意自我傷害(自殺)	1	6.79	4.75	0.63	0.7

附 註：1. 彰化縣埤頭鄉年中人口數 計30,451.0人 男性15,731.0人 女性14,720.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣芳苑鄉主要死亡原因

## 民國108年(2019年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	411	1,234.75	453.66	1.03	100.0		所有死亡原因	240	1,366.74	603.34	1.06	100.0		所有死亡原因	171	1,087.37	292.92	0.96	100.0
	十大主要死因	297	892.27	330.47	1.00	72.3		十大主要死因	183	1,042.14	458.93	1.07	76.3		十大主要死因	115	731.27	203.39	0.87	67.3
1	惡性腫瘤	104	312.44	140.71	1.03	25.3	1	惡性腫瘤	65	370.16	180.10	1.00	27.1	1	惡性腫瘤	39	248.00	97.93	1.04	22.8
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	43	129.18	45.23	1.03	10.5	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	27	153.76	67.17	1.33	11.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	16	101.74	19.34	0.72	9.4
3	肺炎	34	102.15	29.82	0.81	8.3	3	肺炎	24	136.67	48.60	1.00	10.0	3	腦血管疾病	11	69.95	15.56	0.93	6.4
4	腦血管疾病	30	90.13	25.58	1.14	7.3	4	腦血管疾病	19	108.20	36.49	1.29	7.9	4	肺炎	10	63.59	14.17	0.55	5.8
5	事故傷害	23	69.10	40.46	1.42	5.6	5	事故傷害	18	102.51	67.19	1.52	7.5	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	50.87	16.06	1.24	4.7
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	15	45.06	16.60	1.18	3.6	6	慢性下呼吸道疾病	8	45.56	13.46*-	0.56	3.3	6	糖尿病	8	50.87	12.55	0.61	4.7
7	糖尿病	14	42.06	11.62*-	0.63	3.4	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	39.86	15.85	1.10	2.9	7	血管性及未明示之癱瘓症	7	44.51	5.67	1.90	4.1
8	慢性下呼吸道疾病	14	42.06	8.67*-	0.69	3.4	8	糖尿病	6	34.17	10.66*-	0.66	2.5	8	慢性下呼吸道疾病	6	38.15	5.78	0.98	3.5
9	敗血症	10	30.04	6.39	1.37	2.4	9	敗血症	5	28.47	9.31	1.37	2.1	9	事故傷害	5	31.79	10.65	1.07	2.9
10	血管性及未明示之癱瘓症	10	30.04	5.40	1.72	2.4	10	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	22.78	10.10	2.00	1.7	10	高血壓性疾病	5	31.79	5.68	0.59	2.9
	其他非十大死因	114	342.49	123.19	1.10	27.7		其他非十大死因	57	324.60	144.41	1.05	23.8		其他非十大死因	56	356.10	89.53	1.22	32.7
11	高血壓性疾病	9	27.04	8.35	0.64	2.2	11	高血壓性疾病	4	22.78	9.63	0.70	1.7	11	敗血症	5	31.79	4.05	1.36	2.9
12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	8	24.03	11.00	2.26	1.9	12	蓄意自我傷害(自殺)	3	17.08	9.60	0.70	1.3	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	25.44	12.66	2.57	2.3
13	蓄意自我傷害(自殺)	5	15.02	10.53	0.83	1.2	13	血管性及未明示之癱瘓症	3	17.08	4.55	1.39	1.3	13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	19.08	10.91	2.26	1.8
14	慢性肝病及肝硬化	4	12.02	5.43*-	0.51	1.0	14	慢性肝病及肝硬化	2	11.39	4.79*-	0.34	0.8	14	蓄意自我傷害(自殺)	2	12.72	9.84	1.05	1.2
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	9.01	4.76	1.08	0.7	15	先天性畸形變形及染色體異常	1	5.69	12.90	3.22	0.4	15	慢性肝病及肝硬化	2	12.72	6.06	0.86	1.2

附 註：1.彰化縣芳苑鄉年中人口數 計33,286.5人 男性17,560.0人 女性15,726.5人。

2.標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3.標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4.資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣大城鄉主要死亡原因

## 民國108年(2019年)

合 計							男 性							女 性						
順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順 位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	234	1,414.9 2	469.18	1.08	100.0		所有死亡原因	128	1,434.1 7	594.94	1.07	100.0		所有死亡原因	106	1,392.36	322.05	1.07	100.0
	十大主要死因	183	1,106.5 4	358.54	1.14	78.2		十大主要死因	100	1,120.4 5	464.38	1.07	78.1		十大主要死因	86	1,129.65	254.74	1.26*	81.1
1	惡性腫瘤	66	399.08	160.16	1.19	28.2	1	惡性腫瘤	39	436.97	186.29	1.11	30.5	1	惡性腫瘤	27	354.66	137.31	1.30	25.5
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	31	187.45	44.90	1.37	13.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	134.45	50.22	1.12	9.4	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	19	249.57	33.02	1.54	17.9
3	糖尿病	24	145.12	43.33*+	1.98*	10.3	3	糖尿病	11	123.25	54.03	2.22*	8.6	3	糖尿病	13	170.76	29.43	1.77	12.3
4	肺炎	16	96.75	23.02	0.71	6.8	4	腦血管疾病	9	100.84	41.60	1.15	7.0	4	肺炎	7	91.95	12.05	0.70	6.6
5	腦血管疾病	14	84.65	27.32	0.97	6.0	5	肺炎	9	100.84	33.89	0.73	7.0	5	腦血管疾病	5	65.68	11.23	0.76	4.7
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	48.37	12.79	1.15	3.4	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	56.02	18.96	1.50	3.9	6	血管性及未明示之癱呆症	5	65.68	8.26	2.48	4.7
7	慢性下呼吸道疾病	7	42.33	10.55	0.64	3.0	7	蓄意自我傷害(自殺)	4	44.82	30.36	1.78	3.1	7	慢性下呼吸道疾病	3	39.41	8.34	0.88	2.8
8	血管性及未明示之癱呆症	7	42.33	7.38	2.27	3.0	8	事故傷害	4	44.82	15.34*-	0.63	3.1	8	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	39.41	8.34	0.83	2.8
9	蓄意自我傷害(自殺)	5	30.23	16.58	1.60	2.1	9	慢性下呼吸道疾病	4	44.82	13.32*-	0.54	3.1	9	結核病	2	26.27	3.79	6.36	1.9
10	事故傷害	5	30.23	12.52*-	0.57	2.1	10	慢性肝病及肝硬化	3	33.61	20.37	0.95	2.3	10	敗血症	2	26.27	2.99	0.99	1.9
	其他非十大死因	51	308.38	110.64	0.90	21.8		其他非十大死因	28	313.73	130.55	1.07	21.9		其他非十大死因	20	262.71	67.31	0.66	18.9
11	慢性肝病及肝硬化	3	18.14	11.99	0.72	1.3	11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	22.41	11.48	2.51	1.6	11	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	1	13.14	20.24	35.94	0.9
12	高血壓性疾病	3	18.14	6.47	0.40	1.3	12	胃及十二指腸潰瘍	2	22.41	11.25	5.36	1.6	12	事故傷害	1	13.14	10.47	0.39	0.9
13	敗血症	3	18.14	5.69	0.76	1.3	13	高血壓性疾病	2	22.41	10.44	0.67	1.6	13	貧血	1	13.14	2.29	3.25	0.9
14	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	1	13.14	20.24	35.94	0.4	14	血管性及未明示之癱呆症	2	22.41	6.30	1.84	1.6	14	皮膚及皮下組織疾病	1	13.14	1.49	2.46	0.9
15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	2	12.09	6.63	1.32	0.9	15	帕金森病	2	22.41	6.18	2.56	1.6	15	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	1	13.14	1.49	1.18	0.9

附 註：1. 彰化縣大城鄉年中人口數 計16,538.0人 男性8,925.0人 女性7,613.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計



# 彰化縣竹塘鄉主要死亡原因

## 民國108年(2019年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	170	1,132.58	440.59	0.95	100.0		所有死亡原因	99	1,259.70	609.59	1.04	100.0		所有死亡原因	71	992.73	267.49	0.83	100.0
	十大主要死因	131	872.75	326.12	0.95	77.1		十大主要死因	81	1,030.67	464.43	1.08	81.8		十大主要死因	51	713.09	199.61	0.85	71.8
1	惡性腫瘤	41	273.15	117.29	0.89	24.1	1	惡性腫瘤	27	343.56	158.92	0.95	27.3	1	惡性腫瘤	14	195.75	70.19	0.79	19.7
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	17	113.26	40.35	0.90	10.0	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	11	139.97	61.05	1.30	11.1	2	腦血管疾病	8	111.86	39.53	1.41	11.3
3	肺炎	15	99.93	25.54	0.80	8.8	3	肺炎	11	139.97	52.57	1.16	11.1	3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	6	83.89	18.56	0.56	8.5
4	腦血管疾病	12	79.95	30.79	1.01	7.1	4	事故傷害	9	114.52	76.93	1.73	9.1	4	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	69.91	15.47	1.62	7.0
5	事故傷害	11	73.28	47.80	1.50	6.5	5	慢性下呼吸道疾病	6	76.35	25.37	1.05	6.1	5	糖尿病	4	55.93	9.02*-	0.64	5.6
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	59.96	16.52	1.58	5.3	6	腦血管疾病	4	50.90	22.57	0.65	4.0	6	高血壓性疾病	4	55.93	7.77	0.98	5.6
7	慢性下呼吸道疾病	8	53.30	11.34	0.88	4.7	7	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	50.90	17.68	1.54	4.0	7	肺炎	4	55.93	6.53*-	0.45	5.6
8	糖尿病	7	46.64	15.49	0.70	4.1	8	糖尿病	3	38.17	18.80	0.76	3.0	8	事故傷害	2	27.96	13.55	0.92	2.8
9	高血壓性疾病	7	46.64	12.17	1.11	4.1	9	慢性肝病及肝硬化	3	38.17	15.63	1.17	3.0	9	帕金森病	2	27.96	12.31	2.85	2.8
10	慢性肝病及肝硬化	4	26.65	8.84	1.14	2.4	10	高血壓性疾病	3	38.17	14.91	1.30	3.0	10	蓄意自我傷害(自殺)	2	27.96	6.69	2.27	2.8
	其他非十大死因	39	259.83	114.47	0.92	22.9		其他非十大死因	18	229.04	145.17	0.90	18.2		其他非十大死因	20	279.64	67.88	0.80	28.2
11	帕金森病	4	26.65	7.71	3.00	2.4	11	加害(他殺)	2	25.45	59.02	46.62*	2.0	11	血管性及未明示之癱瘓症	2	27.96	3.27	1.11	2.8
12	蓄意自我傷害(自殺)	4	26.65	7.08	1.50	2.4	12	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	25.45	12.27	2.33	2.0	12	慢性下呼吸道疾病	2	27.96	3.27	0.68	2.8
13	加害(他殺)	3	19.99	40.41	42.09*	1.8	13	敗血症	2	25.45	10.16	1.33	2.0	13	加害(他殺)	1	13.98	19.34	35.86	1.4
14	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	2	13.32	6.65	1.25	1.2	14	主動脈瘤及剝離	2	25.45	8.84	2.88	2.0	14	病毒性肝炎	1	13.98	6.97	5.41	1.4
15	敗血症	2	13.32	4.96	0.61	1.2	15	帕金森病	2	25.45	8.48	3.29	2.0	15	慢性肝病及肝硬化	1	13.98	3.81	0.92	1.4

附 註：1. 彰化縣竹塘鄉年中人口數 計15,010.5人 男性7,859.0人 女性7,151.5人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計

# 彰化縣溪州鄉主要死亡原因

## 民國108年(2019年)

合 計							男 性							女 性						
順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %	順位	死 亡 原 因 (ICD-10分類)	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	標準化 死亡率	標準 死亡比	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	365	1,233.69	527.97*+	1.20*	100.0		所有死亡原因	212	1,372.70	693.38*+	1.23*	100.0		所有死亡原因	153	1,081.88	358.64	1.14	100.0
	十大主要死因	298	1,007.23	434.33*+	1.30*	81.6		十大主要死因	181	1,171.98	596.24*+	1.35*	85.4		十大主要死因	121	855.61	270.30	1.25*	79.1
1	惡性腫瘤	92	310.96	141.40	1.14	25.2	1	惡性腫瘤	58	375.55	192.94	1.13	27.4	1	惡性腫瘤	34	240.42	85.95	1.14	22.2
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	41	138.58	48.64	1.31	11.2	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	21	135.98	64.25	1.36	9.9	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	20	141.42	30.94	1.23	13.1
3	肺炎	33	111.54	33.39	1.09	9.0	3	肺炎	21	135.98	55.26	1.23	9.9	3	腦血管疾病	13	91.92	20.85	1.48	8.5
4	腦血管疾病	31	104.78	39.43	1.57*	8.5	4	腦血管疾病	18	116.55	56.28	1.62	8.5	4	肺炎	12	84.85	14.54	0.91	7.8
5	事故傷害	23	77.74	55.96*+	1.74*	6.3	5	慢性下呼吸道疾病	17	110.08	46.19	1.66	8.0	5	糖尿病	9	63.64	26.19	0.92	5.9
6	慢性下呼吸道疾病	22	74.36	24.78	1.49	6.0	6	事故傷害	16	103.60	71.21	1.66	7.5	6	高血壓性疾病	9	63.64	12.61	1.45	5.9
7	糖尿病	19	64.22	27.21	1.14	5.2	7	糖尿病	10	64.75	30.02	1.43	4.7	7	事故傷害	7	49.50	40.72	1.87	4.6
8	高血壓性疾病	16	54.08	16.37	1.55	4.4	8	慢性肝病及肝硬化	7	45.33	27.53	1.45	3.3	8	敗血症	7	49.50	12.18	2.59*	4.6
9	蓄意自我傷害(自殺)	11	37.18	26.94	2.19*	3.0	9	高血壓性疾病	7	45.33	19.35	1.66	3.3	9	蓄意自我傷害(自殺)	5	35.36	19.20	3.16*	3.3
10	慢性肝病及肝硬化	10	33.80	20.20	1.56	2.7	10	蓄意自我傷害(自殺)	6	38.85	33.21	1.70	2.8	10	慢性下呼吸道疾病	5	35.36	7.10	1.13	3.3
	其他非十大死因	67	226.46	93.64	0.88	18.4		其他非十大死因	31	200.73	97.14	0.82	14.6		其他非十大死因	32	226.28	88.34	0.86	20.9
11	敗血症	8	27.04	8.74	1.48	2.2	11	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	25.90	11.47	2.60	1.9	11	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	28.28	13.14	0.84	2.6
12	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	16.90	7.45	0.53	1.4	12	主動脈瘤及剝離	2	12.95	6.00	1.60	0.9	12	慢性肝病及肝硬化	3	21.21	11.97	1.65	2.0
13	原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	4	13.52	5.12	1.47	1.1	13	帕金森病	2	12.95	4.35	1.85	0.9	13	病毒性肝炎	2	14.14	9.11	6.35	1.3
14	病毒性肝炎	3	10.14	6.80	5.95*	0.8	14	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	6.48	4.35	17.78	0.5	14	胃及十二指腸潰瘍	2	14.14	2.86	3.75	1.3
15	主動脈瘤及剝離	3	10.14	4.80	1.72	0.8	15	病毒性肝炎	1	6.48	4.35	5.17	0.5	15	加害(他殺)	1	7.07	6.68	16.21	0.7

附 註：1. 彰化縣溪州鄉年中人口數 計29,585.5人 男性15,443.5人 女性14,142.0人。

2. 標準化死亡率(Standardized rate)係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。「\*-」表示標準化死亡率顯著低於彰化縣標準化死亡率；「\*+」表示標準化死亡率顯著高於彰化縣標準化死亡率( $\alpha=0.05$ )。

3. 標準化死亡比(Standard mortality ratio, SMR)。標準化死亡比=實際死亡數 / 期望死亡數。\*表示與彰化縣死亡率有顯著不同( $\alpha=0.05$ )。

4. 資料來源：衛生福利部死因統計檔、內政部臺閩地區人口統計